















L'HOMEOPATHIE

A

L'ACADÉMIE DE MÉDECINE DE BELGIQUE EN 1877 Digitized by the Internet Archive in 2010 with funding from Open Knowledge Commons and Harvard Medical School

L'HOMEOPATHIE

A

L'ACADÉMIE DE MÉDECINE DE BELGIQUE

EN 1877

RÉPONSE AU DÉFI DE M. LE PROFESSEUR CROCQ

PAR

le docteur GAILLIARD

BRUXELLES
LIBRAIRIE MÉDICALE DE MAYOLEZ
rue de l'Impératrice



LETTRE

Monsieur le docteur CROCO

Professeur de pathologie interne à l'Université libre de Bruxelles.

Monsieur et très-honore confrère,

Aujourd'hui, 30 août 1877, j'ai rempli les engagements que j'avais contractés envers vous, en terminant, pour être soumis à l'Académie de médecine de Belgique, un travail critique formant la matière d'un volume grand in-4° de près de 2,000 pages, sur deux des pathogénésies hahnemanniennes : l'arsenic et le phosphore. Ce travail sera déposé par moi au secrétariat de ce corps avant la fin des vacances, afin qu'il puisse être examiné dès la rentrée de l'Académie.

A vous, Monsieur, de remplir maintenant les engagements que vous avez pris vis-à-vis de nous.

Rappelons l'origine et les conditions de ce débat.

Il y a vingt mois, dans une leçon clinique donnée à l'hôpital St-Jean, à l'occasion de l'entrée d'une femme empoisonnée par le pétrole, vous vous êtes déchaîné avec violence contre la Matière médicale de Hahnemann et vous avez lancé aux homœopathes le défi « de venir » exercer, dans vos salles, leur talent sur les malades que vous vous char-» giez de leur fournir. » Vous avez été si satisfait de cette leçon, que vous vous êtes empressé de faire paraître votre philippique dans les colonnes de la Presse médicale belge. Il y eut, à ce propos, tant de bruit dans le Landernau médical, que les journaux politiques s'en émurent. « C'est une chose vraiment remarquable à voir, » fit observer l'un d'eux,

- « des médecins qui n'osent pas exprimer une opinion bien nette sur les » miracles et qui ont joué un rôle si piteux, à l'Académie, dans l'affaire de
- » Bois-d'Haine, se montrer si hautains et si haineux à l'égard d'une
- » doctrine scientifique qui a certainement bien le droit, autant que toute
- » autre, d'occuper sa place au soleil. Les allopathes ne se contentent plus
- » de traiter les homœopathes de charlatans; ils vont jusqu'à leur dire
- » qu'ils sont de malhonnètes gens. »

L'occasion vous a paru excellente et unique pour faire connaître *urbi et orbi*, par les mille bouches de la publicité, le défi que vous aviez lancé aux homœopathes. Dans deux lettres très-vives, écrites à trois jours d'intervalle, vous avez insisté tout particulièrement sur l'utilité humanitaire de cette provocation et vous avez pris l'engagement solennel de proclamer, le cas échéant, devant l'Académie royale de médecine de Belgique, les résultats de ces expérimentations.

Contrairement à votre attente, sans doute, j'ai relevé le gant, et malgré une juste désiance de moi-même, j'ai publié les conditions de la lutte (1).

Vous avez reculé.

Dès lors, il ne me fut plus permis de démontrer la vérité de la Matière

(1) Voici les termes de ma lettre:

J'ai été votre élève. J'écarte vos injures. Je réponds à votre défi. Mais vous voulez sans doute que l'épreuve soit loyale.

Voici les conditions qui me semblent essentielles à cette fin.

Vous désignerez les malades et vous établirez la nature de l'affection, son degré de gravité, la durée présumée du traitement et la médication allopathique que vous jugeriez devoir être mise en usage. Le procès-verbal mentionnant ces indications et ces prescriptions me sera transmis signé par vous, *ne varietur*.

Il sera mis à ma disposition une salle spéciale, dans un quartier séparé de l'hôpital, laquelle sera placée sous la surveillance exclusive de personnes désignées par moi, afin que nous ayons la certitude que toutes nos prescriptions seront strictement observées, aussi bien en ce qui concerne l'hygiène et le régime qu'en ce qui concerne le traitement.

Après examen de mes malades, j'accepterai votre certificat et le signerai comme sincère et véritable.

En cas que le diagnostic ou le pronostic ne concorde pas, deux médecins, une fois agréés, examineront le différend, et, s'ils sont d'accord, leur jugement fera foi. En cas de parité, le malade sera écarté.

Ni vous ni vos élèves n'auront accès dans la salle, si ce n'est à l'heure habituelle de votre clinique, ou bien en ma présence ou en présence d'un suppléant par moi désigné.

Vous aurez la faculté d'examiner mes malades chaque jour, mais vous vous abstiendrez loyalement d'exprimer une opinion quelconque sur leur état et sur la valeur du traitement suivi, dans la salle même ou en présence des malades.

Un journal régulièrement tenu indiquera les modifications survenues dans l'état du malade et les prescriptions diététiques et thérapeutiques que j'aurai faites. Ce journal sera à votre disposition à l'heure de vos leçons cliniques.

L'état du malade sera constaté par vous à la sortie de l'hôpital et renseigné au bas du journal. En cas de désaccord, les deux arbitres décideront.

L'épreuve aura une durée de trois mois et portera sur une moyenne constante de vingt malades au moins.

Si vous acceptez ces conditions, c'est à vous, monsieur, de faire auprès de la Commission des Hospices toutes les démarches nécessaires pour que l'épreuve, que vous nous proposez comme un défi, puisse être faite.

Agréez, etc.

Dr GAILLIARD.

Bruxelles, le 13 décembre 1875.

médicale de Hahnemann, sur le terrain absolument pratique, par l'application des remèdes au lit des malades d'après la grande loi des semblables. Il me restait pourtant la faculté de produire la justification théorique de cette *Matière médicale* devant l'Académie royale de médecine.

Outre mon honneur, les droits de la science et les intérêts de l'humanité me traçaient mon devoir. Incontinent, je résolus d'entreprendre ce travail ardu et vous en informai par la lettre qui suit :

- » Ainsi donc, après nous avoir insultés et provoqués à plusieurs reprises par la voie des journaux scientifiques et politiques, vous refusez l'épreuve offerte, de l'aveu de tout le monde, à « des conditions aussi facilement acceptables que parfaitement loyales. » Et cette étonnante résolution, vous l'avez prise après dix jours de voyage ou de réflexion.
- » Vous cherchez même à vous soustraire à tout débat sérieux. Mais au point où les choses en sont venues, vous n'en avez ni le pouvoir ni le droit. Sub judice lis est. L'opinion publique, que vous avez spontanément saisie de l'affaire, doit désirer que la lumière se fasse. Et la lumière se fera, sinon à l'hôpital comme vous l'avez proposé et comme je l'avais accepté, du moins à l'Académie royale de médecine où vous nous aviez également conviés
- » Je m'occupe d'une étude critique des pathogénésies hahnemanniennes, traitées par vous de rêves creux et de produits d'une imagination malade, et j'espère être en mesure, d'ici à un an, de soumettre ce travail à l'appréciation de la docte assemblée.
- » Nous verrons si dans cette enceinte vous fuirez le débat avec autant de désinvolture que vous le fuyez aujourd'hui dans la presse.

» Agréez, etc.

« Dr GAILLIARD. »

» Bruxelles, le 24 décembre 1875. »

J'ai suivi bien des tournois scientifiques, et je puis avancer, malgré tout le respect qui vous est dû et que je vous garde, que vous êtes bien le plus singulier adversaire qui se puisse rencontrer. Tout autre que vous, obéissant aux règles les plus élémentaires de la polémique, eût attendu, pour me combattre, la présentation du *Mémoire* annoncé à si courte échéance. Rompant avec ces habitudes traditionnelles, vous avez adressé au directeur de la *Presse médicale* une lettre de quatre colonnes, où, à côté des aménités dont vous êtes coutumier, se lisent des énormités trop prodigieuses pour n'être pas rappelées ici.

Vous avez voulu établir d'abord que c'est moi qui suis « le père du défi ». Or, votre cours a été publié le 28 novembre; votre première lettre à l'Étoile a paru le 10 décembre, et votre lettre aux Nouvelles le 13. Ce n'est que ce jour même que j'ai répondu à votre appel de plus en plus pressant. Et je serais, moi, le provocateur!

Vous ajoutiez:

- « Il y a quelque chose d'immoral dans le défi que me lance M. Gailliard,
- » ce dési proposant comme enjeu la vie et la santé d'hommes malades. La
- » différence entre nous deux, c'est qu'il ne paraît pas se donter de cette
- » immoralité, tandis que moi, j'en ai la conscience très-nette. Je l'ai telle-» ment, que je suis persuadé que l'acceptation de son défi aurait eu pour

résultat de me faire adresser par le Conseil des Hospices une semonce
 aussi verte qu'elle eût été bien méritée.

Ces sortes d'appréciations ne se discutent pas. On les rappelle ad perpetuam rei memoriam. Je puis faire observer cependant qu'il est singulier de voir le président de la « Fédération médicale belge » sacrifier — en haine de l'homœopathie — la plus sacrée des libertés, celle qui abandonne à la conscience du médecin la direction du traitement des maladies. C'est établir le veto médical au profit du Conseil des Hospices. Mais les flots et les hommes sont changeants. Que diriez-vous si demain vos adversaires allopathes — et ils sont nombreux, vous le savez — usaient vis-à-vis de vous des mêmes procédés, et appliquant vos principes, pesaient sur la Commission des Hospices civils et faisaient proscrire l'emploi des « fortes doses » qui vous sont si chères et qui ont tant contribué à votre réputation? Que diriez-vous le jour où les membres du Conseil des Hospices, revenus de Damas et convaincus de la supériorité de la méthode hahnemannienne, ne permettraient plus de traiter les malades que d'après la loi des semblables et au moyen de doses infinitésimales? Hodie mihi, cras tibi. J'entends d'ici vos protestations indignées et d'avance j'y applaudis et y souscris. Mais que n'y songiez-vous plus tôt? Ah! on l'a bien dit de tout temps: Quos vult perdere Jupiter dementat.

Vous ajoutiez:

« Une expérimentation établie sur les bases proposées par le Dr Gailliard fait » très-bon effet dans les colonnes d'un journal politique; elle y a bonne mine; » elle étale aux yeux du public l'assurance d'un de ces braves à trois poils qui » défient le monde entier et Dieu et le Diable, sans que rien les fasse sourciller. » Mais la science n'est pas si facile à contenter. A ses yeux tout ce beau fracas et » ces manières de capitan ne signifient rien, leur valeur est égale à zéro. En effet, » supposons un instant que M. Gailliard voie guérir tous ses malades, 100 pour » 100; peut-il exiger plus? S'en suivrait-il que l'homœopathie les aurait guéris? » Moi, je lui prouverai qu'elle n'y est pour rien, que ces guérisons se sont produites malgré elle, conformément aux lois de la physiologie pathologique. Tout » médecin au courant de la science sera forcé d'acquiescer à ma démonstration. A » quoi donc auront servi les expériences? A poser M. Gailliard devant le public » et aussi à le faire poser. Ceci n'est plus de la science. »

Je comprends maintenant pourquoi vous n'aimez pas que les journaux politiques s'occupent de vos discussions scientifiques. Si vous employiez souvent des arguments de cette force, c'en serait fait bientôt d'un prestige acquis au prix de trente années de travaux constants et d'études assidues.

Et cet autre passage:

« Je sais que tel malade aurait succombé s'il avait été traité conformément » aux règles de la thérapeutique hahnemannienne, tandis que moi, très-positive- » ment (sic), je l'aurais guéri ; je puis dire cela ici, puisque je parle à des méde- » eins. »

Oui, Monsieur le professeur, vous pouvez affirmer ces choses dans les colonnes de la *Presse médicale belge* où vous êtes assuré de ne trouver personne pour vous contredire; mais je vous engage à ne pas les répéter dans

d'autres recueils scientifiques, et surtout... à ne pas les raconter dans les journaux politiques. Outre qu'on trouverait le galimatias joli, on rirait longtemps de votre prétention.

Citons, pour terminer, la fin de votre épître :

« Puisque le docteur Gailliard m'a lancé un défi, j'y réponds en lui portant » un triple défi que j'énonce dans les termes suivants :

» 1º Je défie M. Gailliard de me démontrer, non par des phrases, mais expéri-

» mentalement, le principe des semblables, similia similibus curantur;

- 2º Je défie M. Gailliard de me démontrer expérimentalement l'action des doses
 infinitésimales ou homœopathiques, soit sur l'homme sain, soit sur l'homme
 malade;
- » 3º Je défie M. Gailliard de me dire quel médicament contient un globule
 » homœopathique quelconque que je lui ferai avaler ou que je ferai prendre à un
 » malade; ce qu'il devrait pouvoir faire si son système était vrai.
- » Si je m'énonce d'une façon si catégorique, c'est que d'autres ont expérimenté » ces choses, c'est que moi-même je les ai expérimentées bien longtemps avant » que M. Gailliard fût né à la vie médicale, et que le résultat de ces essais a » constamment été négatif. Je suis toutefois content de recommencer, pour » faire plaisir au docteur Gailliard, et pour l'édification de mes confrères et de » mes élèves.
- » Ce triple défi place M. Gailliard en face d'un dilemme auquel il ne saurait » échapper. Ou bien il viendra, ou bien il ne viendra pas. S'il vient, il verra » s'écrouler sous ses yeux les bases de son système. S'il ne vient pas, il recon- » naîtra par cela seul l'impossibilité de les démontrer expérimentalement. Or, il » ne viendra pas; à son tour de reculer, lui qui m'a accusé de me soustraire par » la fuite à ses provocations. Et il ne s'arrêtera plus dans ce mouvement en » arrière que je lui imprime; je le condamne à reculer définitivement devant ce » triple défi, jusqu'à ce qu'il aille s'engouffrer avec son système dans l'abîme sans » fond du Léthé.

» Ainsi soit-il. »

Le croirez-vous, Monsieur,

« Tous ces présages vains n'ont rien qui m'épouvante. »

Mais de grâce, par souci de votre dignité et par respect pour votre haute position, arrêtez-vous dans cette voie, car ces défis multipliés vont vous rendre légendaire.

Arrêtez-vous; non pas que je redoute vos provocations ou que je cherche à les éluder. J'y répondrai comme je me propose de répondre à toutes celles que vous pourriez m'adresser, a leur heure..., c'est-à-dire après que nous aurons entièrement épuisé le débat actuellement engagé. Rien ne nuit plus, vous le savez, à la solution d'un problème scientifique que l'introduction d'incidents étrangers à la cause.

Pourquoi d'ailleurs ces discussions intercurrentes?

Espérez-vous échapper par la tangente? Voulez-vous m'égarer dans un dédale inextricable, pour que, après avoir discuté pendant des mois, nous en soyons à ne plus nous retrouver ayant perdu de vue notre point de départ, c'est-à-dire la démonstration de la sincérité et de l'authenticité des expérimentations pures de Hahnemann?

Je ne me laisserai pas prendre à ce piége, et avec Martial, je vous dirai : « Jam die, Posthume, de tribus capillis ». Ne discutons pour le moment que les pathogénésies habnemanniennes.

Avant de descendre sur le terrain de la lutte, je tiens à écarter un mode d'argumentation dont je ne puis ni ne veux vous laisser le bénéfice et qui ne saurait être maintenu sans de graves inconvénients. Pour vous en faciliter l'écrasement, vous contestez toute science aux homœopathes. Mais n'avons-nous pas fait les mêmes études que les allopathes, ne sortons-nous pas des mêmes écoles, n'avons-nous pas subi les mêmes examens, n'avons-nous pas obtenu les mêmes diplômes et quelques-uns d'entre nous n'ont-ils pas obtenu ces diplômes toujours avec la plus grande distinction?

« Si vous voulez exercer la médecine homœopathique », dites-vous encore à vos élèves, « le plus grand succès vous est assuré. Seulement, » je m'empresse d'ajouter : jamais plus je ne regarderai celui de vous » qui agira de la sorte, car, à mon sens, il aura cessé d'être honnète » homme. » Ainsi donc, parce qu'en matière médicale, en thérapeutique et en posologie nous pensons autrement que vous, vous criez anathème! Vous lancez contre nous les foudres de l'excommunication majeure; vous décrétez ex cathedra que nos paroles et nos actions sont maudites! Voilà ce que l'intolérance scientifique fait professer par un libre penseur, dans une école de libre pensée! Non! nous ne sommes pas de malhonnètes gens! Nous sommes Galilée et vous évoquez le mur de la prison où nous écrivons sa parole immortelle : E pur si muove!

Et ce qui est infiniment plus grave de la part d'un professeur aussi savant et aussi érudit que vous, ce sont les attaques infamantes que vous dirigez contre la mémoire du vénéré fondateur de notre école. Hahnemann Était un faussaire, dites-vous. Il ne faut pas savoir ce que c'est qu'un honnête homme pour oser, de sang-froid, contester la véracité et l'honorabilité d'un médecin qui, pendant près de soixante années, a toujours exposé ses opinions au grand jour, en ne s'attachant qu'à mettre en lumière la vérité telle qu'il la voyait, quelles qu'aient pu être, pour lui, les conséquences.

Qu'était notre maître?

Fils d'un ouvrier peintre sur porcelaine, Hahnemann se rendit à l'âge de vingt ans, de Meissen à Leipzig, emportant pour toute ressource vingt ducats que son père lui remit à son départ. Pour subvenir à ses besoins et aux frais de ses études, il traduisit en allemand des ouvrages anglais et français. De Leipzig il se rendit à Vienne et à Erlangen, où il fut reçu docteur le 10 août 1779. Établi plus tard à Dresde, il publia à Leipzig, en 1786, un livre Ueber die Arsenikvergiftung, ihre Hülfe und gerichtliche Ausmittelung. Ce traité, qui est un chef-d'œuvre d'érudition, de symptomatologie, de thérapeutique et d'analyse toxicologique; qui devint classique en Allemagne; dont Harles dit dans sa monographie « De usu arsenici in medicina » : « Omnium uberrimœ, classicœque de veneficio

arsenicali commentationis»; qui fut cité à chaque page par Christison et d'autres célèbres toxicologistes, ce traité a été composé avec les observations personnelles de Hahnemann et ayec celles recueillies et publiées par ses devanciers (1).

(1) Voici l'Index des auteurs et des ouvrages mis à contribution par Hahnemann, dans sa monographie : Ueber die Arsenikvergiftung.

P DE ABANO, « De venenis ». — ABBAS PANORMITANUS. — Abhandl. der Kön. Schwed. Akder Wiss. » 1745. — « Acta erudit. » Lipsiæ, 1715. — « Act. nat. cur. » t. n, t. v, t. vi, t. ix. — « Nov. act. nat. cur. » t. iii. — Thom. Aetius, « De infirmis » — Alberti, « Jurispr. medic. » t. iii. — Albukases « 2 Alzarav. cap. de potu arsenici ». — Franz Alphanius, « De peste ». — Alsar. A Cruce, « De quœst. per epist. » — Amatus Lusitanus, V. Lusitanus. — Ambrosinus, « De modo form. process. informat. » — Amman, « Medic. crit. » — Ardoyn, « De venen. » Basil., 1562. — Ancante in « Hannov. N. Samml. » 1775. — A. Augenius « Epist. et cods. » — Avicenne, « iv. Canon.» cap. VI. — Ayrer, « De homicid. »

Baccius, « De venenis et autidot. » — Baldus. — Bartholin, « Acta Hafn. » t.v. — Baylies. — Becher, « Physica subterranea.» — Bergmann, « Abh. von Arsenik » Wien, 1785. — Bernhard, in « Samml. f. prakt. aerzte » t. vii. — Bertholin in Wepfer, « Histor. cic. aq. » 1755. — Bierling, « Thesaur. obs. et cur. » — « Advers. cur. » Cent. I. — Binninger. — Blasius, « Obs. anatom. » — Boehmer. — Nicol. Boerius, « Decis. cur. de gal. » — Boerhaave, « De morb. nerv. » — « Prælect. acad. » — Bohn, « De off. med.dupl. » — « Exam. vuln. lethal.» — Bonet, « Medic. septentr. coll. » — « Sepulch. anat. » Genevæ, 1679. — P. Borell, « Hist. et obs. rar. » Cent. III — Bossius, « Pr. erim. tit. de delict. » — Boucher, in « Journal de médecine » 1760. — Boyle, « Ut. phil. exp. » — « Breslauér sammlungen » 55 Bers. — ibid. 58. — Brocklesby, in « Philos. transact. » t. xliv. — Brun in Sandifort, « Thesaur. diss. » — Bruneman, « Process. de testibus in cur. » — Burchard in Wepfer, « Hist. cic. aquat. » — Buttner, « Unterricht für aerzte ».

Caballus, « De omni gen. homicid.» — Caels, « Ratio occurrendi morbis a mineral. abusu produci solitis » 1781. — E. L. de Capo. — Cardan, « Subtil. exerc.» — Carerius, « Prax. crim. » — M. Carpanus, « Ad. C. homicida nov. const. mediol. » — Carpzov, « Prax.crim.» — Cheyne, « Valetud. infirm. » — Classenius und Ludovici, not. at. c. c. c. — Codronchius « Meth. testific. » — Coesalpin, « Ars med. » — Ger. Colombus, « De febr. pestil. » — « Commercium litter. Noric. » 1733, 1734, 1737, 1738, 1743. — Diomed. Cornarius, « Consil. med. » Lips. 1599. — Covaruvias, « Var. resol. » — Alois. Cremarius, « De jur. crim. » Darlue, « Journal de méd. » t. iii. — Decius, « Ad. cap. prop. » — Degner, in « Acta N. C. » vol. V. — De la Force, « Nachrichten v. den wichtigsten Begeb. unter der reg. Ludwig xiv. » Leipzig, 1716. — Delphinus. — Demachy. — Densing, « De peste hist. » — Diemerbroeck, « Tractat. » — Dietnann, « Diss. examen thermar. austriaco-badensium. » Vienne, 1752. — Marc. Donatus, « Hist. mem. med. » — Duflos. — Durande, V. Morveau Eckel in Haller. — Ehrman, « Diss. de veneficio doloso » 1781. — « Ephem. nat. cur. » dec. 2, ann. iv, cent. 3 et 4; dec. 3 ann. ix et x. cent. 5 et 6. — Eschenbach, « Med. leg. » — Ettmuller, in « Eph. nat. cur.» Cent. 7 et 8.

Fabrice ab Hilden, «Obs. et cur. chirurg. » Cent. VI; — « De gangræna et sphac. » — Falkoner. — Farinacens, « Concil. » — Feltmann, « De cadav. inspic. » — Fernel, « Univ. med. »; — « Method. med. »; — « Part. morb. et sympt. » — Fort. Fidelis, « De relat. med. » lib. iv. — Forest, « Histor. et cur. » — Forsoek, in « Esprit des Journ. » 1785.— Fracastor, « De contag. morb. cur. » — Frick.

Gagliani, in « Weckherlins' chronologen », t. xii. — Gail. — Galien. — Gamez. — Garelli in Fr. Hoffmann, « Med. ration. system. » — « Gazette salutaire », 1762. — Geuns, « De morte corporea », in Sandiford, « Thesaur. diss. » — Gmelin, « Mineralgifte ». — Gohl. — Gram. — Guidott. — Guilbert, in « Recueil périodique de Van der Monde », t. iv. Haen, « Heilmethode », t. iv. — Hagedorn, « Hist. med phys. » — Haller, « Vorle-

sungen üb. d. ger. arzneikunde». — « Physiol. » — « Disput. », t. m. — « Hannover magazin », 1770. — HARDER, « Apiar. Observ. », Basil., 1736, in 4°. — HARTM-PISTORIUS.

Il publia, en 1787, un Traité sur les préjugés contre le chauffage par le charbon de terre; en 1789, un travail sur les Maladies vénériennes, et il

Hasenöhrl in Sandifort, « Thesaur. diss. » — Hebenstreit, « Anthropolog. for. » — Heberdeen, « N. Hamb. magazin ». — Heisters, « Mediz. chirurg. wahrnehm. » — Helmont, « Tumulus pestis ». — Henkel, « Kieshistoric ». — « Bergsucht ». — Henkici et Messer, « Dissert. de cholera », in Haller, « Disp. ad morb. hist. » — Hercul. Saxonia, « Prœlect. pract. » — Herissant, in « Philos. transact. », t. xlvii. — Heucher, « Opera omn. » — Heuerman. — Hillefeld, « Exper. circ. venen. » — Hippocrates. — Hippolyte de Marseille, « In proces. crimin. » — Hodges. — Fr. Hoffmann, « Med. rat. system. » — Med. consult. » — « Opusc. path. pract. », dec. II. — « Diss. de erroribus vulgaribus circa venena », Halle, 1718. — « Diss. de conversione benigni morbi in malignum ». — Lor. Hoffmann, « De vero usu et abusu med. chym. » — Holler, « Opera ». — Horst. — Huber, in « Nova Act. N. C. », vol. 3.

JACOBI. — « Journal économique », 1757.

KEYSLER, « Reisen », 57 brief. — Kirwan, « Mineralogie ». — Klökhof, in « Hollandsche Maatsch. d. W. te Harlem », t. viii. — Kornman, « Mirac. mort. » — Kresz. — Kunkel, « Opusc. chym. »

Joh. Lange, « Epist. med. » — Langrisch, « Practice. » — Lebret, « Magazin z. g. d. Staaten und Kirchengeschicht.», t. iv. — Lefebure, in « Samml f. prakt. aerzte » t. vii.— Lemery, « Cursus chym. » — Libav, « Comment. in alchim. » — Lieutaud, « Hist. anatom. med. » — Lindestolpe, « de venenis ». — Georg. Logan, « Versuche über die arsenikvergiftung. » Petersburg, 4783, 8°. — Lucas. — Ludwig, « Instit. med. for. » Lips., 1765. — Amatus Lusitanus, « Cur. med. » Cent. 2. — Zacutus Lusitanus, « Prax. admir. » — Fab. Lyceeus, « Expos. anim. nov. hisp. »

MACQUER, «Mém. de l'Acad. des sc. » 1776. — « Wortembuch. » Leipzig, 1781. — MAGNAN in « Ephem. N. C. » Cent. 3, Obs. 67. — MANGET, « Biblioth. med. pratic. » — MARAT, « Mém. sur l'électricité anim. » 1783. — MARCELLUS DONATUS, V. DONATUS. — MARET, V. MORVEAU. — MASCARDUS, « De probat. » — MASINI, « Abus aquœ gel. » — MASKOKY, « Ephem. nat. cur. » 1685, dec. 2. — MASSARIA, « De peste ». — MATHESIUS, « Sarepta. » — MATHAI, « Observ. med. » — MEAD, « Venen mechan. expositio. » — « Medical essays and obs. » Edinbg, 1747, t. iv. — Messer, V. Henrici. — Mezger, « Gericht. mediz. beobacht. » 1778 — Königsberg. — « Miscell. nat.cur. » 1671, an. 9, 40. — Molitor, in « Commerc. litt. noric. » 1737. — J.-B. Montanus, « Consilia ». — Morgagni, « De sed. et caus. m. epist. » — Morveau, Maret et Durande, « Anfangsgr. der theor. und prakt. chemie ». — Mouro. — Muscatellus, « Prax. crim. de vuln. leth. » — Musgrave, « Betracht. über die Nerven. — Mynsing.

NAVIER, « Gegengifte ». 1782, in-4°. — NEUMAN, « Chemie. » — « Chemische vorles. » ODIER. — OLDEKOPP, t. IV. « Obs. crim. »

PACIANUS, «De probat.» — PANAROLUS, « Penter. » — THEOPHR. PANACELSUS VON HOHENHEIM, « De morb. metall. » — PATIN, « Valetud. tuend. » — FEL. PLATER, « Obs. mantiss » — PLENCK, « Toxicologia ». — PURCELL, « Von der Kolik », Nordlingen, 1775. — PYL, « Aufsätze und beob. » — « Neues Magazin d. ger. arzn. »

QUELMALZ, in « Commerc. litt. Nor. », 1737, 1738.

MATH RAMLOW, «Von der Lähmung und den Zittern der Bergleute». — Réaumur, «Hist. de l'Académ. des scienc. de Paris», 1747. — Rejes, «Camp. clys. juc. obs. quæst.» — Rhases, «2 continent. cap. 2 et 8, Almanfor. cap. de Arsen. — Arsenico sublimato». — Rhodius, Cent. 2. — Riedlin, «Lineœ medic.», ann. 1695. — Ibid., 1698. — Ridan, «Anthropograph.» — Rod. de Castro. — Ronnow, «Schwed. Abh.», 1778.— Rouelle, «Chemie». — Rutg. Ruland.

Sage, «Élém. de minéralog. », Paris, 1772. — Angel. Sala, «Termar. Bezoard». — Salmuth, «Obs. medic. » — Felin Sandeus, «Ad. C. propos., X. de probat. » — Sandifort, «Thesaur. diss. » — Sans, «Esprit des journaux » 1785. — Scaliger, «Exercit.» — Scheele, «Abh. d. K. Schwed. Akad. d. wiss. » 37ter B. — « von Linft und feuer. » Leip-

collabora très-activement aux *Annalen* de Crell, au *Magazin* de Baldinger, à la *Bibliothek* de Blumenbach et aux *Archiv* de Scherf (1).

Et c'est à l'âge de trente-sept ans, au moment où sa réputation comme pathologiste, comme toxicologiste, comme physiologiste, comme hygiéniste et comme chimiste se trouvait déjà très-solidement établie; au moment où les sociétés savantes de l'époque, notamment la célèbre Société économique de Leipzig et l'Académie des sciences de Mayence, l'associaient à leurs travaux; c'est au moment où il s'était créé une clientèle étendue et

zig, 1782. — Scheffler, « Gesch. der Bergleute ». — « Gesundheit der Bergleute ». Chemnitz. — Schenck, « Obs.» — Schneider, « Catharr.» — Lor. Scholze, « Epist. med.» — Schöpfer, « De hemorr. vuln.» — Schreck. — Schrey, « Wolkensteiner. Badschatz.», Frankfurt, 1696. — Schröder, « Pharm. med., chym.» — Sennert, « Prax. med.» — « Instit. medic.» — Sikora, « Conspect. med. leg.» Prague, 1780. — Slevogt. — Smetius, « Miscell.» — Sperling, « Diss. de arsenico.» — Sprögel, « Diss. exper. c. veneno.». Gættingen, 1753; — « Hannover magazin.» 1770. — Stahl. — Stenzel, « De venen. acut...» — Störck, « Annal. med.» — Stryck, «De jure sens. disp. us. mod...» lib. 48. — B. Sylvaticus, « Cons. et respons.» — J.-B. Sylvaticus, « De morb. simulatis.».

TACKENIUS, « Hippocrates chym.»—TEICHMEIER, « Gerichtliche arzneikunde ».— « Instit. medic. leg.» — TIMOEUS A GULDENKLEE, « Cas. med.» — TISSOT, « Epist. ad. Zimmermann» in Sandifort, « Thesaur. diss.»

Valentini, « Pandect. med. leg.» — Valisneri, « Opera ». — Van der Monde, « Recueil périodique ». — Van Helmont. — Van Swieten, « Comment.» — Verzasch in Wepfer, « Hist. cic. aq.» — Val. H. Vogler, « Diss. de venenis ». — H. Von Heer, « Observ.»

Wedel, «Dissert. de arsenico» Jena, 1749. — Weckherlin, «Chronologen» t. xii. — Weigel in Navier, «Gegengifte, »Greiswald. 1782, in 4°. —Welsch, «Rat. vuln. lethal.» — Wepfer, «Hist. cic. aquat.» 1733. — Werlhof in Haller, «Disput.» t. ni.

TH. Young, " De lacte " in Sandifort, " Thesaur. diss. "

Zacchias, « Quœst. med. leg.» — Zacutus Lusitanus, V. Lusitanus. — Zittmann, « Medic. for. » Frankfurt, 1706. — Zorn. — Zuckert.

(1) Voici un aperçu de quelques-unes des publications de notre maître, alors qu'il était encore médecin allopathe :

En 1787, parut un Traité sur les préjugés contre le chauffage par le charbon de terre et les moyens tant d'améliorer ce combustible que de le faire servir au chauffage des fours; en 1789, Hahnemann publia une longue Instruction sur les Matadies vénériennes, avec l'indication d'une nouvelle préparation mercurielle. Dans le même temps, il insérait dans les Annalen de Crell plusieurs travaux d'une importance et d'une actualité incontestées. Ainsi, il indiquait les Moyens de vaincre les difficultés que présente la préparation de l'Alcali minéral par la potasse et le sel marin ; il recherchait l'Influence que certains gaz exercent sur la fermentation du vin; il publiait des Recherches chimiques sur la bileet les calculs biliaires; faisait connaître un Moyen puissant d'arrêter la putréfaction (1789), publiait une Lettre sur le spath pesant, annonçait la découverte d'un Nouveau principe constituant de la plombagine (1789), faisait paraître quelques Réflexions sur le principe astringent des végétaux (1789), donnait, dans le Magazin de Baldinger, le Mode exact de préparer le mercure soluble (1789), s'occupait de l'Insolubilité de quelques métaux et de leurs oxydes dans l'ammoniaque caustique; enfin, il enrichissait la Bibliothek de Blumenbach de réflexions judicieuses sur les Moyens de prévenir la salivation et les effets désastreux du mercure, et il insérait dans les Annalen de Crell une note sur la Préparation des sels de Gluber (1792) et dans les Archiv de Scherf une Addition aux moyens d'explorer la pureté des vins.

où il se voyait honoré de la confiance de ses confrères au point que, de l'assentiment des magistrats, il avait été chargé de remplir intérimairement les fonctions de médecin en chef des hôpitaux, c'est à ce moment que Hahnemann renonce brusquement à la pratique de la médecine allopathique... parce qu'il n'avait plus foi en elle! Ne voulant pas faire argent de son titre, il redevint traducteur!

C'est autre chose qu'Hippocrate refusant les présents d'Artaxercès!

Et l'homme qui a donné cet exemple d'abnégation, de conscience et de délicatesse, l'homme qui a fait taire son cœur d'époux et de père pour sacrifier honneurs et richesse au culte de la science vraie; qui s'est voué, lui et sa nombreuse famille, à une existence de privations, cet homme est gratuitement accusé d'infamie et de vénalité! Et par qui?... Par un ancien boursier, aujourd'hui sénateur censitaire!

Je m'arrête, Monsieur. J'ai besoin de me souvenir que j'ai été votre élève, car je pourrais être amené à me demander si, dans vos moments de défaillance, vous avez su vous montrer aussi grand que lui.

Hahnemann reprit donc l'ingrat métier de traducteur et occupa ses loisirs par des études de chimie auxquelles son goût et ses succès l'attachaient chaque jour davantage. Il traduisit entre autres ouvrages la Matière médicale de Cullen. Arrivé à l'endroit où le savant thérapeutiste anglais traitait du quinquina, il fut frappé des hypothèses multipliées et contradictoires par lesquelles on avait cherché à expliquer l'action de ce spécifique. Dans un de ces moments de subite inspiration qui illuminèrent Colomb et Newton, Hahnemann se demanda s'il n'était pas possible d'arriver à la connaissance exacte de l'action de ce médicament héroïque, par l'expérimentation sur l'homme sain. Il décida de vérifier cette action sur luimême. « Je pris à titre d'expérience, » dit-il dans une note à la page 109 du 2e volume de la Matière médicale de Cullen, « pendant plusieurs jours, » deux fois par jour, quatre gros de bon quinquina. D'abord aux pieds. » les extrémités des doigts se refroidirent; j'eus de la fatigue et de la » somnolence, le cœur commença à battre fort, le pouls devint dur et » accéléré, je fus saisi d'une inquiétude intolérable, et pris ensuite de » tremblements (mais sans frissons); j'eus une courbature de tous les mem-» bres, des battements dans la tête, de la rougeur aux joues, de la soif, » bref, successivement tous les symptômes caractéristiques connus de la » fièvre intermittente: affaiblissement des sens, une espèce de roideur dans » toutes les articulations, et surtout cette sensation sourde et désagréable » qui paraît avoir son siége dans le périostium sur tous les os du corps » entier, - tous parurent. Ce paroxysme durait chaque fois de deux à » trois heures, et ne se renouvelait que quand je répétais la dose. Je ces-» sai et je fus rétabli.... »

Vous assurez, Monsieur, avoir institué, sans résultat aucun, et bien longtemps avant que je fusse né à la vie médicale, les expérimentations de notre vénéré maître. Vous êtes-vous mis dans les conditions d'essai indiquées par Hahnemann? Si oui, ne tirez pas, je vous prie, des conclusions absolues de votre expériment; car si vous n'avez pas éprouvé cette action fébrigène, d'autres expérimentateurs allopathes l'ont observée. MM. Trousseau et Pidoux, vos classiques, assurent même « qu'aujourd'hui il n'est » point de médecin, un peu attentif, qui n'ait tous les jours l'occasion de » constater ces propriétés fébrigènes » de l'écorce du Pérou. Pesez bien cette opinion, Monsieur; elle est de grande valeur (1).

(1) Voici les preuves qu'en 4869, j'apportais à l'appui de l'expérience fondamentale de Hahnemann, dans mon ouvrage l'*Homœopathie vengée*:

« L'observation de chaque jour prouve que le quinquina donné à haute dose, » détermine, chez un grand nombre de sujets, un mouvement fébrile très-mar-» qué. Les caractères de cette fièvre et l'époque à laquelle elle se manifeste, » varient selon les individus. Le plus souvent des tintements d'oreille, la surdité » et une sorte d'ivresse précèdent l'invasion de cette fièvre, un léger frisson s'y » joint; une chaleur sèche, accompagnée de céphalalgie, succède à ces premiers » symptômes, s'éteint graduellement et se termine par de la moiteur. Loin de » céder à de nouvelles et à de plus fortes doses de ce médicament, la fièvre cau-» sée par l'absorption du principe actif du quinquina ne manque pas d'être exas-» pérée. » (Bretonneau, Journ. des connaiss. médic. et chirurgic., t. 1, p. 436.) « Ces effets fébrigènes du quinquina avaient été meconnus et niés par la plu-» part des médecins de notre pays; mais, depuis quelques années, des travaux » d'abord à l'étranger, et ensuite en France, ont été faits sur cette matière, et bien » que les auteurs se soient attribué l'honneur d'une découverte qui appartient » toute entière à M. Bretonneau - (lisez hardiment : à Hahnemann) - leur témoi-» gnage n'en est que plus précieux; et aujourd'hui il n'est point de médecin, un » peu attentif, qui n'ait tous les jours l'occasion de constater les faits sur lesquels » nous venons d'insister. » (Trousseau et Pidoux, Tr. de thérap. et mat. médic.). Le docteur Aubert écrit de son côté : « Un mot encore sur un fait particulier » d'observation, que nous ne voulons pas passer sous silence, parce qu'il se rat-» tache à des idées qui ont besoin d'être discutées dans l'intérêt de la science, bien » qu'elles aient trait à l'homœopathie que nous n'avons nullement l'intention de » défendre. M. Piorry nie formellement que le sulfate de quinine produit la fièvre » intermittente sur l'homme sain. Quelque singulier que paraisse cet effet, nous » pouvons assurer en avoir vu plusieurs exemples, et nous sommes heureux de » pouvoir citer à l'appui de notre assertion l'autorité de M. Hippolyte Gaudorp, » un des médecins militaires les plus distingués. Il résulte des expériences que ce » médecin a faites sur lui-même en 1828 que le sulfate de quinine provoque en » bonne santé de véritables accès de fièvre intermittente (a) ».

Le célèbre professeur Guislain confirme l'expérience fondamentale de Hahnemann quand il dit : « Ce qui est à l'appui de ce que je viens de dire, » c'est la propriété que j'ai reconnue aux fébrifuges de réduire l'aliénation à sa » plus grande simplicité possible, en faisant disparaître les phénomènes rémittents ou intermittents. C'est ainsi que le sulfate de quinine, administré à haute » dose, à l'époque où l'intermittence n'est plus sensible, rend non seutement le » type, de continu qu'il était, intermittent, mais fait, ce qui plus est, changer le » mouvement réactif en véritable fièvre intermittente, caractérisée par ses périodes » de froid, de chaleur et d'exhalation cutanée (b). » Le professeur de l'Université de Groningue, Ev.-J. Thomassen A Theussink, a reconnu également la propriété

Hahnemann répéta à plusieurs reprises sur lui et sur quelques personnes dévouées ses expériences pures avec le quinquina, et il observa que l'action physiologique de cette substance n'était pas constamment la même. Tantôt il y avait tel groupe de symptômes, tantôt tel autre, et les manifestations morbides variaient avec l'âge, le sexe, le tempérament, la constitution, les habitudes, les conditions spéciales, l'idiosyncrasie des expérimentaleurs. Ce résultat très remarquable de ses premières observations avait déjà été entrevu par Caels : « Non in omnibus omnia eademque occurrunt » symptomata; verum hæc pro ætate, temperie et viribus ægri, aut quan-» titate veneni assumpti in variis varia sunt (1). »

fébrigène du quinquina (¿), ainsi que Ozann (d), Hirschel (e), Withmann (f), DIETL (q), MÉRAT et DELENS (h), DUMÉRIL, DEMARQUAY et LECOINTE (i).

Ce qui confirme singulièrement l'assertion de Hahnemann concernant l'action fébrigène du quinquina, ce sont les accidents qui atteignent les ouvriers dans les fabriques de sulfate de quinine. M. ZIMMER, propriétaire d'une fabrique à Francfort s/M. où l'on produit jusqu'à 250 kilogrammes de sulfate de quinine par jour, assure que ses ouvriers « sont sujets à deux maladies : la première consiste en un » exanthème cutané, la deuxième en une fièvre qu'il désigne sous le nom de fièvre » de quinquina... Cette dernière ne frappe que les ouvriers qui sont employés au » moulin et qui sont par conséquent très-exposés à la poussière produite par le » broiement de l'écorce.... D'après ce qu'il a vu, cette fièvre arrive à terminaison » par un vif accès spontané, sans qu'on ait employé aucun remède dans le but de » soulager le malade.... Cette fièvre frappe presque tous les ouvriers qui respi-» rent la poussière de cette écorce (k). » Le docteur Guerard rapporte avoir reçu dans une de ses salles, à l'hôpital Saint-Antoine, un ouvrier qui travaillait dans une fabrique de sulfate de quinine, et qui fut atteint dans la fabrique même d'une fièvre intermittente tierce contre laquelle le sulfate de quinine échoua complétement (l).

Mon savant ami, M. le docteur CH. DE MOOR, d'Alost, dont les travaux de thérapeutique et de matière médicale sont universellement estimés, a rassemblé d'autres observations assez nombreuses qui confirment cette action fébrigène du quinquina. Il se propose de les publier dans son Étude sur l'action physiologique du sulfate de quinine, étude très-intéressante qui va être mise incessamment sous presse.

- a. « Revue médicale », mars 1840, p. 461.
- b. « Traité sur les phrénopathies », Bruxelles, 1835, p. 49.
- c. « Geneeskundige waarnemingen », Groningen, 1826.
- d. « Hufeland's Journal », t. LXI.
- e. « Rhein-Wesph-Journal ».
- f. « Le sulfate de quinine étudié dans son action médicinale », Mayence, 1827.
- g. « Wien-mediz. Wochenschrift », 1852. h. « Supplément au Dictionnaire de matières médicales », 1846.
- « Recherches expérimentales sur les modifications imprimées à la chaleur animale », in « Gazette médicale de Paris », 1852.
- k. « Comptes-rendus de l'Acad. des sciences de Paris », t. xxxı, p. 547. l. « Comptes-rendus de l'Acad. des sciences de Paris », t. xxxıı, p. 940.
- (1) Théod.-Pierre Caels est un médecin helge qui jouissait d'une certaine célébrité dans la seconde moitié du siècle dernier. « Il ne nous est connu que par ses travaux, » dit Beaugrand, dans le Dictionn. encyclop. des Sc. médic., Sér. 1,

Si réellement vous avez expérimenté le quinquina sur vous-même et sur un groupe de fidèles, il n'est point admissible que tous vous avez échappé à toute manifestation maladive. Quels sont donc les lésions anatomo-pathologiques et les troubles physiologiques que vous avez notés? Communiqueznous les procès-verbaux de ces expérimentations. Nous ne devons évidemment pas nous en tenir à votre simple affirmation. En médecine, il faut pouvoir toucher du doigt. Ce n'est pas absolument de la méfiance de notre part. Nous voulons voir vos observations, nous voulons les peser et les juger : l'honneur de la science se trouve lésé lorsque nous avons pour l'opinion des autres une déférence si aveugle qu'elle nous empêche de nous servir de notre propre jugement et d'exposer avec liberté le résultat de nos études. Qui sait si, comme les expérimentateurs de M. le professeur Andral, de joyeuse mémoire, vous n'avez pas « éprouyé, sous » l'influence du quinquina, quelque malaise que l'ignorance eût pu qua-» lifier de fièvre intermittente? (1) » Vous avez tout au moins dû éprouver quelque chose. Quoi? Voyons les pièces.

Hahnemann dut nécessairement se demander si la faculté de produire des troubles morbides était un fait isolé, propre au quinquina, ou bien s'il était commun à toutes les autres substances médicamenteuses. L'expérience pouvait seule résoudre ce problème. Aussi Hahnemann se mit-il résolûment à l'œuvre et expérimenta-t-il successivement le mercure, la belladone, la digitale, la coque du Levant; et partout il obtint une seule et même réponse : Le médicament produit sur l'homme sain des effets pathocénétiques !

Hahnemann remarqua en même temps combien étaient variés les effets des substances qu'il expérimentait. C'est que dans l'acte médicamenteux il y a deux agents: l'un, le médicament, toujours identique, sauf la dose; l'autre, l'individu, facteur se décomposant en une foule de moments ou circonstances qui sont autant d'éléments de combinaisons multiples. Aussi Hahnemann a-t-il pu dire avec raison: « Medicamenta simplicia vires edunt in corpus sanum sibi unumquodque proprias, non tamen omnes simul vel in una et constanti serie, aut cunctas in singulis hominibus, sed hodiè forsan has, illas cras, hane primam in Caio, illam tertiam in Titio, ita tamen ut et Titio aliquando usu veniat quod Caius inde sensit heri (2). » Cette polyphénoménie médicamenteuse est aujourd'hui universellement

t. xi, p. 487, « et Broeckx lui-même, dans son *Histoire de la médecine belge*, ne nous donne aucun renseignement sur son compatriote ». On a de lui :

De Belgii plantis, qualitate quadam hominibus cæterisve animalibus nociva seu venenata præditis (Dissert. cour. en 1773 par l'Acad. des belles-lettres de Bruxelles), Bruxelles, 1774, in-4°. — Ratio occurendi morbis a mineralium abusu produci solitis, Amsterdam et Bruxelles, 1781. — Rome, 1783. — Traduction française intit.: La cure des maladies produites par les minéraux, Amsterdam et Bruxelles, 1787.

^{(1) •} Bulletin de l'Académie royale de médecine de Belgique, » t. VIII, p. 711.

^{(2) «} Fragmenta de viribus medicamentorum positivis, » 1805, p. 5.

reconnue. Non-seulement on admet que les symptômes sont sujets à de grandes variations et à de multiples combinaisons, mais on ne s'étonne même plus que certaines manifestations de l'action du remède expérimenté, regardées comme constantes et comme pathognomoniques par tels praticiens, n'aient jamais été signalées par d'autres.

Hahnemann établit donc expérimentalement l'action pathogénétique des substances médicamenteuses.

Pour qu'un médecin, après tant d'hommes éclairés et illustres, pensât tout-à-coup plus juste que ses devanciers, sur un fait d'une importance si capitale, il fallait un esprit organisé pour les inspirations exceptionnelles et doué de cette originalité de vues qui a constitué le génie dans tous les temps.

Et c'est à ce génie que vous avez essayé, Monsieur, de lancer l'insulte et l'outrage! Telum imbelle sine ictu.

Nous venons d'indiquer les origines de la Matière Médicale de Samuel Hahnemann.

Comment ces travaux furent-ils développés?

D'après vous, Monsieur, la Matière Médicale hahnemannienne, comme autrefois Minerve, sortit tout d'une pièce du cerveau du « prophète allemand ».

En étudiant l'historique de ces pathogénésies vous verrez que vous avez fait, avec une grande légèreté, une très-grosse erreur.

Depuis la découverte de l'action physiologique des médicaments, Hahnemann ne discontinua pas un instant ses recherches sur les propriétés symptomatiques des remèdes et, pourtant, ce ne fut qu'en 1805 qu'il rassembla ses documents et les publia en deux petits volumes sous le titre de: Fragmenta de viribus medicamentorum positivis, sive in sano corpore humano observatis. Dans ces Fragmenta, Hahnemann décrivait l'action physiologique de vingt-six substances, d'après les données de l'expérimentation pure sur lui et sur d'autres personnes saines, et aussi d'après des observations d'empoisonnements et d'accidents relatés par les auteurs à la suite de l'administration des remèdes à doses inconsidérées. Les expériments purs furent obtenus principalement avec des doses uniques et massives de chaque substance. C'est dans ce premier ouvrage homœopathique que notre maître définit, avec une remarquable précision, ce qu'il faut entendre par le mot médicament et qu'il établit la Matière Médicale sur une base inébranlable. Ecoutons-le:

Quæ corpus merè nutriunt, alimenta; quæ vero sanum hominis statum (vel parvâ quantitate ingestâ) in ægrotum, ideoque et ægrotum in sanum mutare valent, medicamenta appellantur.

Tout corps, tout agent susceptible de nourrir un être vivant est un aliment; tout agent administré à l'homme sain et capable de développer en lui un état morbide et de ramener à la santé un homme malade, est un médicament. Dans cette définition du médicament, il y a tout un monde, une ère nouvelle pour la thérapeutique. Elle identifie le poison et le médi-

cament. Elle élève un mur d'airain, une séparation désormais infranchissable entre le médicament et l'aliment.

Le médicament une fois défini, à quelles sources le médecin doit-il puiser pour acquérir la connaissance des propriétés que possède chaque substance? Hahnemann répond d'un mot: A L'EXPÉRIMENTATION PURE SUR L'HOMME SAIN.

Instrumentorum artis suæ habere notitiam quam maximè perfectam, primum artificis est officium, medici vero esse, nemo, proh dolor! putat. Quid enim medicamina per se efficiant, id est, quid in sano corpore mutent, perscrutari, ut indè pateat quibus in universum morbis conveniant, nemo hucdùm medicorum, quantùm scio, curavit.

Que trouvez-vous à reprendre, Monsieur, à ces définitions et à ces remarques formulées il y a trois quarts de siècle? Ont-elles été entamées par les immenses progrès de la physiologie expérimentale et des autres branches accessoires de la médecine? Singulières rêveries que celles qui sont ainsi respectées par les conquêtes de la science moderne! Et comme il serait heureux que vous pussiez longtemps et beaucoup rêver comme cela! Les fastes de la Belgique compteraient en vous une nouvelle illustration médicale! Vésale, Van Helmont, Crocq.... On voit d'ici l'effet.

Après la publication des *Fragmenta* (1805), si modestement présentés au monde médical, Hahnemann poursuivit ses études pathogénétiques et prépara ses *Reine Arzneimittellehre* ou *Matière médicale pure*. Cette œuvre si importante, comportant six volumes in-12, commença à paraître seulement en 1811, et ne fut achevée qu'en 1821. Mettre plus de seize années à publier six volumes de « rêveries creuses », c'est vraiment n'avoir pas «l'improvisation facile». Vous devez être de cet avis, Monsieur, vous qui écrivez et parlez si abondamment sur des sujets très-nombreux et très-variés.

A cette date avait paru la pathogénésie de soixante-et-un médicaments, dont vingt-deux avaient déjà pris place dans les *Fragmenta*. Ces tableaux pathogénétiques représentent les troubles physiologiques et les lésions anatomo-pathologiques observés :

1º Par Hahnemann:

- A. Dans des expériences pures sur lui-même à doses massives (une seule le plus souvent) ou à doses atténuées (jusqu'à la quatrième atténuation inclusivement) répétées jusqu'à production de quelques symptômes;
- B. Dans des expérimentations faites sous sa direction sur des membres de sa famille et sur d'autres personnes saines, également à doses massives et à doses atténuées;
- C. Dans des cas observés par lui d'intoxication accidentelle ou provoquée, volontaire ou involontaire, aiguë ou chronique, sur des sujets sains ou sur des personnes malades, par voie gastrique, par voies respiratoires ou par voie cutanée;
 - 2º Par des disciples de Hahnemann, dans des expériences à doses mas-

sives ou à doses atténuées faites sur eux-mêmes ou sur des personnes bien portantes placées sous leur direction (1);

Et 3° par des allopathes, ses devanciers ou ses contemporains, dans des empoisonnements aigus ou chroniques, chez des sujets sains ou chez des personnes malades, par voie gastrique, par voies respiratoires ou par voie cutanée (2).

Une deuxième édition des *Reine Arzneimittellehre*, notablement augmentée, parut de 1822 à 1827. Les additions se composent de symptômes nouveaux recueillis aux mêmes sources et dans des expériments à doses plus

Alberti, «Jurispr. med.», tom. II, p. 257; tom. III, 533. — Amatus Lusitanus, cent. II et III.—Baylies, in «Samml. Abhandl. f. pr. Acrzte», VII, 2 —Bernhardi, «Annal. d. Heilk», 1811, Jan. p. 60.—Bonetus.—Borellus, «Hist. et obs.» Cent. III, Obs. 36.—Borges, in Kopp's «Jahrb.».—Bucholz, «Beitr. z. ger. Arzneik.», IV, in Hufeland's Journal. -- Buttner, « Unterr. ub. d. Tödtl. d. Wunden ». -CORDANUS, « De ven. »—DAN. CRUGER, « Misc. N. C.» Dec. II, ann. 4.—EBERS in HU-FELAND'S Journal, 1813. Oct. — Van Eggern, « Diss. de vacill. dent.» Duisb. 1787. - « Ephem. N.c.» Cent. X, app. p. 463.—Feldmann in « Comm. litt. Nor.» 1743, p. 56. — Fernelius — Forestus, lib. 17. Obs. 13. — Th. Fowler, « Med. rep. of the eff. of Arsen.»—Friedrich in «Hufeland's Journ.» V, p. 172—Gabezius—Gerbitz in «Ephem. nat. cur.» Dec. III, an. 5,6, Obs. 437.—Goritz in «Bresl. Samml.» 1728 —J. G. Greiselius in « Misc. Nat. Cur.» Dec. I.—Grimm, in « Misc. N. C.» Dec. III.— Guilbert, «Med. chir. Wahrnehm.» Vol. II, Altenb.—«Hall. allg. liter. zeit.» 1815, Nº 181.—Hammer in «Comm. litt. Nor.» 173. — Hartmann, «Dissert. Aeth. Ant. et Ars.» Halle, 4759.—Hargens in «Hufeland's Journ.» IX, 1.—Heimreich in «Act. N. C.» II, Obs. 10; Arsen. als Fiebermitt. — Heinze, in Ebers — Henning in «Hufeland's Journal», X, 2. — Heun, «Allg. med. Annal», 1805. — Huber, « N. Act. n. c. » III, Obs. 400. — ISENFLAMM-STEIMMIG, «Diss. de rem. susp. et ven. » Erlangen, 4767. — Joh. Jacobi und Rau, in «Acta N. C.» — Justamond, «On canc. dissord.» London. 4750.—Kaiser in Hartlaub und Trinks « Arzneimittellehre ».— Kellner in «Breslauer Samml.» 1727.—Klinge in «Hufeland's Journal», VI, p. 904 - Knape « Annal. der Staatsarzneik. » I, 1.-Kopp, « Jahrb. der Staatsarzneik. » II, p. 482-La Motte, «Journ. de Méd.» LXX. - Löw in Sydenham, Op. II S. 324. -Majault in «Samml. br. Abhandl. f. pr. Aerzte», VIII, 1. 2. Marcus, «Ephem. d. Heilk.» Heft. III.—«Misc. N. C.» Dec. III, an 9, 40. p. 390—M. N. Zeit, 4798. Sept. - J. B. Montanus, in Schenk, lib. 7, Obs. 200. - Morgagni, « De sed. et caus. morb. » LIX. §. 8. - J. Mat. Muller in « Ephem. N. C. » - Myrrhen, « Misc. Nat. Cur.»—«Neue. med. chir. Wahrnehm.» Vol. I, 1778.—Pearson in « Samm!. br. Abhandl. f. prakt. Aerzte », XIII, 4.—Pet. de Appono, « De ven. », c. 47; — in

⁽¹⁾ Ainsi, par exemple, les observateurs qui expérimentèrent l'arsenic sous la direction de Hahnemann, et dont les travaux furent mis à profit par lui dans l'« étude pathogénétique » de ce médicament, sont : Bahr, Fréd. Hahnemann, Hartlaub, Trinks, Hering, Hornburg, Langhammer, Meyer et Stapf.

⁽²⁾ La liste qui suit indique les noms des auteurs allopathes et des ouvrages consultés par Hahnemann pour l'élaboration de sa pathogénésie de l'arsenic :

atténuées (12° dilution). Une troisième édition amplifiée fut commencée en 1830 pour s'arrêter au second volume en 1833. Les symptômes ajoutés ont été observés en partie dans des expériments avec la 30° dilution.

Hahnemann publia en quatre volumes, de 1828 à 1830, la pathogénésie d'une série de médicaments nouveaux, au nombre de dix-sept, destinés principalement à combattre les affections chroniques. Cet ouvrage intitulé Die chronischen Krankheiten, thre eigenthumliche Natur und homöopatische Heilung, est le résultat d'observations recueillies sur l'homme sain et sur des personnes malades, après l'usage de doses massives et de doses atténuées (de la troisième atténuation à la douzième dilution) de ces substances médicamenteuses.

La seconde édition des Chronischen Krankheiten, en cinq volumes, parut de 1835 à 1839. Outre les vingt-deux médicaments de la première édition, elle en contenait vingt-cinq autres, dont treize étaient nouveaux, et dont douze avaient déjà eu place dans les Reine Arzneimittellehre. Les matériaux nouveaux de cette édition étaient empruntés à diverses sources, telles que les expériments de Jörg, Hartlaub, Trinks, Hartmann, Haubold, Stapf, etc., etc. Beaucoup de ces expériments sur l'homme sain ont été institués avec des globules de la 30° dilution.

Pour donner une idée du mode d'expérimentation des auxiliaires et des disciples de notre maître, je ne puis mieux faire que de rapporter cet extrait d'une leçon faite par le savant docteur R. Hughes aux élèves de l'Hôpital homœopathique de Londres (1):

« Le premier, dit-il, qui se présente dans le champ des expériments médicinaux après Hahnemann, n'était pas un de ses disciples, mais un professeur de l'université de Leipzig, le docteur Johann-Christian-Gottfried Jörg. Sa position académique lui donnait des élèves pour l'aider, et vingt-et-un d'entre eux, avec lui-même, ses deux fils et trois femmes (âgées de 48, de 18 et de 12 ans) formèrent sa troupe d'expérimentation. Il publia à Leipzig, en 1825, un premier volume des résultats obtenus, sous le titre de : « Materialien zu einer hünftigen Heilmittellehre durch Versuche der

Schenk, hb. 47, Obs. 244.—Pfann, « Samml. merkw. Fälle. » Nürnb. 4750. — Preussius, « Eph. N. C. » Cent. III, Obs. 45. — Pyl., « Samml. » VIII, p. 98. — Quelmalz, in «Commerc. litter.», 4737.—Richard, in Schenk, lib. VII, Obs. 241.— « Salzb. med. chir. zeit.» — Siebold, in «Hufeland's Journal», IV.—Schlegel in « Hartlaub u. Trinks Arzneimittellehre ». — Stahl, « Opusc. chym. phys. med. » — Störck, «Med. Jahrg.» 1, p. 207.— O. Tackenius, « Hipp. chym. », cap. 24.— Sennert, « Prax. med. », lib. VI. — J. C. Tenner in Simons, « Samml. d. n. Beob. f. d. J. 1788. » — Thilenius in Richter's, « chir. Bibl. », V, p. 540. — Thomson, « Edinbg. Versuche », IV. — Tim. a Guldenklee, « Opp. » p. 280. — Bernh. Verzasch, « Obs. med. », Obs. 66. — Vicat. — G. W. Wedel, « Diss. de Arsen », Jena 1719. — S. Ph. Wolff, « Act. Nat. c. », V, Obs. 29. — Et autres encore.

^{(1) «} British journal of Homeopathy », 1877.

Arzneyen an gesunden Menschen. Ce volume contenait l'essai des remèdes suivants :

- « Acide prussique, arnica, asa fœtida, camphre, castoreum, digitale pourprée, senega, iodium, moschus, nitre, opium, serpentaire et valériane.
- » Toutes ces substances étaient prises à doses moyennes répétées (et augmentées au besoin) jusqu'à production d'effets marqués. Les essais de chaque expérimentateur étaient relatés *in extenso*, tels qu'ils avaient été faits et avec l'ordre d'apparition des symptômes. En tête, un tableau de l'âge, du tempérament, de la constitution des expérimentateurs, et l'assurance que tous étaient en bonne santé. »

Voilà comment Hahnemann édifia sa matière médicale. Il expérimenta pendant un demi-siècle sur lui-même et sur d'autres personnes bien portantes; il surveilla les expérimentations dirigées par ses élèves et ses admirateurs; il profita des symptômes d'empoisonnement observés, trop souvent hélas! chez les malades à la suite de l'administration de « fortes doses » allopathiques ; il étudia les caractères de certaines maladies professionnelles, il scruta les données de la toxicologie! Et c'est avec ces matériaux réunis qu'il composa son œuvre ære perennius.

En lisant vos attaques si violentes et si injustes contre cette œuvre herculéenne, on se rappelle involontairement le Serpent et la Lime.

Pourquoi critiquez-vous ces travaux pathogénétiques? Oue critiquez-vous dans la *Matière médicale*?

Pour résoudre ces questions, examinons ce que vous disiez dans votre leçon clinique du 18 novembre 1875 :

« Une femme, atteinte de cette forme particulière de manie désignée par les » auteurs sous le nom de mélancolie avec tendance au suicide, avale toute une tasse » de pétrole et peu d'heures après est admise d'urgence dans vos salles à l'hôpital, » sur la déclaration du médecin appelé à lui donner des soins. Immédiatement » après l'ingestion du poison, dites-vous, la malade a ressenti une sensation de » chaleur le long de l'œsophage et à l'épigastre. Elle a éprouvé un peu de vertige » et des douleurs de tête, mais tout cela a disparu promptement, de sorte qu'elle » ne se plaint aujourd'hui que d'être éloignée de sa famille et de ses enfants; elle » demande avec instance de la nourriture. Le médecin qui a été appelé lui a » aussitôt ordonné un vomitif; elle a vomi alors, mais plus du tout depuis. Cepen-» dant, l'on ne niera pas qu'elle se trouve encore actuellement sous l'influence du » pétrole, puisque, même à distance, son haleine répand cette odeur pénétrante » que vous connaissez tous. Il y a pourtant plus de 24 heures que ces faits se sont » passés. Le pétrole a donc pénétré en grande quantité dans l'appareil de la circu-» lation, dans le sang, avec lequel il circule encore actuellement. Que conclure » de là, messieurs, c'est que le pétrole est un poison qui n'est pas bien violent. » Je dirai plus : c'est même un poison bon à conseiller, car s'il rend celui qui l'avale » suffisamment malade pour lui ôter toute envie de recommencer, après 24 heures » tout est rentré dans l'ordre. C'est, si vous le voulez, un vrai poison d'opéra-» comique. »

Le pétrole, un poison d'opéra-comique! Ecoutez donc ces deux histoires :

« Je fus appelé à la hâte, » dit le Dr Buffière, dans le Journal de médecine et de chirurgie pratiques, 4873, t. xlv, p. 45, « auprès du sieur R..., un ivrogne, qui, en buvant une gorgée de pétrole, était tombé roide, comme foudroyé. Je trouvai cet homme couché sur un lit, les bras éloignés du corps et ballants; les jambes étendues, flexibles et inertes; la face grippée, cyanosée, cadavéreuse; les yeux atones à demi-convulsés en haut, les pupilles un peu dilatées exprimaient la stupeur; la langue ratatinée ne pouvait sortir de la bouche; le malade comprenant obscurément, essayait en vain de parler ou d'agir. La respiration lente, stertoreuse, exhalait l'odeur du liquide ingéré; la peau froide et visqueuse gardait l'empreinte des doigts qui la pinçaient; le pouls était misérable et filiforme; tout, en un mot, faisait songer au choléra indien de la période algide. »

Le second cas d'empoisonnement par le pétrole sur lequel je veux appeler votre attention, est rapporté par M. Personne dans le *Bulletin général* de thérapeutique, 1869 :

- « Le sieur Paret, plâtrier, a bu par mégarde une certaine quantité de pétrole rectifié et presque immédiatement il a été pris d'inflammation à la gorge, de coliques violentes avec envie de vomir; un instant après, des *crises tétaniques* affreuses à voir sont survenues.
- » Le malade se tordait dans des souffrances horribles, bientôt suivies d'une roideur générale accompagnée de cris et de hurlements épouvantables. Après un repos relatif de dix minutes, cet état recommençait à nouveau avec plus de violence encore. Pendant l'accès nul liquide ne pouvait passer et c'étaient d'effroyables efforts pour vomir. Quatre et même six hommes avaient peine à contenir le patient. »

Pour le coup, voilà le pétrole, de poison d'opéra-comique, devenu un poison de mélodrame!

Mais un observateur qui ne tiendrait compte que du fait qui se présente à lui, pourrait nier l'action intoxicante du poison le plus violent. Il est connu que si l'acide cyanhydrique appliqué sur la muqueuse d'un animal ne tue pas d'une manière foudroyante, tout trouble pathologique aura disparu après quelques heures, et tout sera rentré également dans l'ordre.

On a maintes fois observé qu'il ne survenait aucun symptôme d'intoxication à la suite même de l'ingestion d'une quantité excessive d'arsenic. C'est ainsi que les docteurs Bergeron et Geoffroy rapportent dans le *Journal de médecine et de chirurgie pratiques*, 4835, t. vi, p. 385, l'observation d'un certain Fouquet qui avala, en deux fois, environ deux gros d'acide arsénieux, sans éprouver le moindre symptôme d'empoisonnement.

Il y a mieux encore. L'arsenie peut être un poison bienfaisant pour qui connaît la pratique des arsenicophages de la Styrie et du Tyrol. J. de Tschudi raconte dans le *Wiener medizinische Wochenschrift*, 1853, qu'un homme « avait avalé trois ou quatre grains d'arsenic, avec grande régularité, depuis sa vingt-septième année jusqu'à l'àge de 63 ans, huit à dix fois par mois. » D'après un calcul approximatif, cet individu avait pris pendant trente-cinq ans, de 20 à 22 onces d'arsenic sans que cette quantité

effroyable de toxique métallique eût produit d'autre trouble qu'une raucité de la voix. Je me trompe : cet individu a joui pendant tout le temps de ce teint frais et rosé, de cet embonpoint agréable et de cette grande facilité de respiration pendant la marche ascendante, dont jouissent tout particulièrement les mangeurs d'arsenic.

Ce ne sont pas seulement les « petites doses » d'arsenic répétées fréquemment qui donnent lieu à ces avantages physiques. Remarquez ces deux observations :

On lit dans le *Journal de médecine de Bruxelles*, 4854, p. 408, la relation d'une tentative d'empoisonnement chronique qui déjoua complétement les projets de son auteur. Au lieu de présenter des phénomènes d'intoxication, la victime « gagua de l'embonpoint, un air frais et de la gaieté. »

On lit d'autre part dans le compte-rendu de la séance du 2 février 4832 de la Société de Sciences médicales et naturelles de Bruxelles: « Quant à l'observation de M. Lesoille (empoi« sonnement par l'arsenie), elle contient des choses remarquables, curieuses. Il y a là un même
a surtout qu'à coup sûr vous n'avez pas vu, un même qui est précieux, qui est très remar« quable, un même qui en dit plus qu'il n'est gros: même leur constitution est meilleure
« qu'auparavant, dit l'anteur en parlant des empoisonnés! Pouvons-nous imprimer de telles
« choses? Pouvons-nous laisser dire qu'il faut prendre du poison pour se bien porter? »

Vous étiez rapporteur de la commission chargée par la « Société des sciences médicales » d'examiner la très-intéressante communication de M. le docteur Lesoille. Vous n'avez manifesté à cette époque aucun étonnement de voir l'arsenic produire une action bienfaisante aussi inattendue. Si vous relisiez aujourd'hui ce travail, vous retrouveriez sans doute votre belle humeur et peut-être diriez-vous à vos élèves qu'au même titre que le pétrole est « un poison d'opéra-comique », l'arsenic doit être considéré comme un poison de vaudeville ou de féerie.

Mais l'arsenic n'est pas toujours un poison si anodin. Les annales de la toxicologie et de la médecine légale en font foi, malheureusement.

Il peut y avoir âbsence complète, absolue de tout symptôme d'empoisonnement, chez un patient qui meurt quelques heures après l'ingestion du poison. Le Dr Jennings rapporte une observation de ce genre dans le Medical and physical Journal, 1831, t. Lxv, p. 295.

Dans d'autres cas d'empoisonnement arsenical, la mort est à peine précédée de quelques troubles fonctionnels. Ainsi, Macaulay, de Leicester, a vu la mort survenir à la suite de symptômes purement narcotiques, en deux heures. La jeune fille dont parle Ettmuller, dans les *Ephemerides Acad. Cœsareæ Leopoldinæ*, 1815, t. cxxvi, mourut en douze heures sans avoir vomi et sans avoir proféré une plainte.

Dans des cas mortels d'intoxication arsenicale, on peut constater une absence presque complète de troubles physiologiques en même temps que des lésions anatomo-pathologiques presque nulles. Au rapport de Chaussier (Bulletin génér. de thérapeutique 1869, t. exxvii p. 52), un homme robuste et d'âge moyen avala de l'acide arsénieux en gros fragments; il mourut sans avoir éprouvé d'autres symptômes que de légères syncopes. A l'autopsie, il n'y avait pas la plus légère apparence d'érosion ni de phlogose du tube digestif. Alph. De Vergie raconte le cas d'un individu qui, neuf

heures après l'empoisonnement, succomba dans la prostration et sans avoir présenté d'autres phénomènes morbides. Le tube digestif offrait l'aspect naturel, il était sans ulcération. Lombard (de Liége) publia l'observation très-curieuse qui suit dans le Bulletin de l'Académie royale de médecine de Belgique, 1849, p. 724.

« Une dame atteinte de monomanie suicide s'empoisonne à onze heures et demie; le médecin arrive à midi; elle a la face décomposée, pâle, froide; sans pouls; la respiration fréquente, il n'y a eu ni vomissements, ni selles. Elte meurt dans le quart d'heure. A l'autopsie le médecin retire de l'estomac deux onces d'acide arsénieux pulvérisé. Cet organe ne présentait aucune altération. »

Et l'observation de Gérard de Beauvais dans le Bullètin de la Société médicale d'Émulation, 1821, et celle de Sallin, dans le Journal de médecine, t. LVIII, p. 476!

En voulez-vous beaucoup d'autres du même genre?

Dans l'intoxication arsenicale, tantôt on observe des symptômes fonctionnels à peine marqués, en même temps que des lésions cadavériques considérables; tantôt, au contraire, des troubles morbides très-nombreux et très-graves avec une absence presque complète de lésions matérielles. Laborde rapporte, dans le Journal de médecine, de chirurgie et de pharmacie, t. lxx, p. 89, le cas d'une jeune fille qui, pendant le cours de l'empoisonnement, ne présenta qu'un peu de somnolence, et à l'autopsie on découvrit des lésions très-graves de l'estomac. Le docteur Missa raconte d'autre part dans les Archives générales de médecine, 1825, t. vii, p. 14, un cas d'intoxication dans lequel, pendant la vie, se rencontrèrent les manifestations les plus graves, tandis qu'à l'autopsie on observa une intégrité absolue de tous les organes, même de ceux qui étaient en contact direct avec le poison.

Il est impossible d'admettre qu'un homme de votre science, de votre érudition, de votre expérience, ignore cette variété d'action des agents pathogénétiques. C'est l'alphabet de la toxicologie, c'est l'a b c de la physiologie expérimentale. Pourquoi, dès lors, méconnaissez-vous cette vérité élémentaire et universelle dans votre enseignement universitaire? Pourquoi laissez-vous ignorer à vos élèves que les substances les plus actives peuvent, dans des circonstances données, être sans action sur l'économie? Pourquoi enseignez-vous qu'un poison est nécessairement « un poison d'opéra-comique, bon à recommander même, » parce que dans le cas d'intoxication qui se présente à votre observation, vous ne constatez que peu de troubles morbides?

Pourquoi? Je puis le dire sans vous offenser, vous êtes un « homme à idées », à la façon d'Émile de Girardin. Ce jour-là, votre idée était de tomber l'homœopathie et d'anéantir la Matière Médicale de notre maître. Et cette idée, vous l'avez soutenue avec une sorte de furie aveugle, per fas et nefas. Si vous aviez défendu cette thèse dans un travail académique ou dans un écrit quelconque, il n'y eût eu que demi-mal:

cette erreur nouvelle serait allée rejoindre d'autres erreurs.... aujourd'hui parfaitement oubliées par tous et par vous-même peut-être; mais vous avez commis une action autrement grave en exposant cette opinion au lit des malades, en présence d'un cas qui était en apparence la confirmation de votre thèse. Ce jour-là, n'avez-vous pas perverti le jugement de vos élèves, de propos délibéré, pour faire pièce aux homœopathes et pour avoir l'occasion de débiter des diatribes contre eux?

Votre taçon d'exposer l'action pathogénétique des médicaments est originale, je le reconnais; mais vous m'accorderez qu'elle est bien peu conseiencieuse. Voici comment vous procédez :

- « ... Cela dit, nous étudions Petroleum,
- » Vous vous étonnez, je le vois, de ce que, dérogeant à mes habitudes, je sois obligé d'avoir
 » recours à un ouvrage, tandis que, dans mes autres leçons, j'improvise ou ne me sers que
 » de quelques notes succinctes.
- » La raison en est simple ; c'est que, toute fidèle que soit la mémoire dont la nature m'a doué, il m'est impossible de reproduire ici les 776 symptômes que Hahnemann éaumère sur la pathogénie de *Petroleum*.
 - » Écoutez bien, Messieurs, je lis textuellement :
- " Le matin, abattement, taciturnité, morosité, propension à s'effrayer, à pleurer pour des riens..."

Et après avoir rapporté, à peu de choses près, les sept cent soixanteseize symptômes, vous ajoutez :

«Je vous fais grâce du reste, Messieurs, et par ce qui précède, vous pouvez juger de ce qui » doit suivre. »

Mais non, Monsieur; dans la question que vous traitez, vos élèves ne peuvent juger de rien, pas plus de « ce qui précède » que « de ce qui doit suivre. » Sur quoi voulez-vous qu'ils fondent leur appréciation? Bien plus, sur quel objet doivent-ils former une appréciation? Est-ce sur la multiplicité ou la singularité des symptômes? Est-ce sur la méthode d'exposition de ces symptômes? Est-ce sur la difficulté de coordonner et de retenir ces symptômes? Est-ce sur l'impossibilité où vous vous êtes trouvé de les réciter par cœur? Vous n'en dites absolument rien. Vous constatez seulement que « vos élèves s'étonnent de ce que, dérogeant à vos habitudes, vous soyez obligé d'avoir recours à un ouvrage » pour faire une citation. Je crains que vous n'ayez exagéré cet étonnement, car les professeurs dans leurs cours, aussi bien que les avocats dans leurs plaidoiries, et les conférenciers dans leurs entretiens, ont l'habitude de lire les citations, et nullement de les rappeler de mémoire. En général, les élèves n'aiment pas les récitateurs.

Vous expliquez l'intervention de ce malencontreux ouvrage par l'insuffisance de votre mémoire. Mais, « toute fidèle que soit la mémoire dont la nature vous a doué, » il vous serait impossible de reproduire dans une improvisation, suivant un ordre analytique donné, les symptômes multiples qui *peuvent* se rencontrer dans une maladie naturelle. Pour vous acquitter de cette tache ardue vous auriez également besoin d'un livre et j'établis que pour n'importe quelle maladie naturelle l'énumération des symptômes serait plus longue et, *en apparence*, plus ridicule que pour n'importe quelle substance médicamenteuse. Du reste, ces récitations de perroquet n'apprennent rien à personne et ne peuvent servir de base à aucun jugement. Mais pour ridiculiser Hahnemann et pour jeter le discrédit sur sa doctrine, tous les moyens vous semblent bons. Vous ne considérez que la fin.

Vous critiquez les pathogénésies hahnemanniennes parce que votre malade n'a pas présenté les 776 symptômes inscrits par Hahnemann dans la pathogénésie de *Petroleum*. Avez-vous jamais constaté dans une maladie naturelle, simple, spéciale ou spécifique, aiguë ou chronique, l'ensemble des manifestations pathologiques indiquées par les auteurs? Dans vos cliniques, vous constatez chez vos patients des groupes de symptômes extrêmement variés, et il est très rare que vous rencontriez des cas présentant absolument la même physionomie, la même expression. Vous représentez-vous un syphilitique ou un scrofuleux offrant l'ensemble des accidents primaires, secondaires et tertiaires de ces terribles maladies? Vous représentez-vous un typhoïde affligé de tous les troubles physiologiques et anatomiques observés par les cliniciens dans cette affection?

Vous ajoutez:

» de mensonges et d'illusions. »

- « Interrogeons la femme sur ses moindres sensations, examinons-la en détail; que trou-» vons-nous? Pas un, mais pas un seul de ces bizarres phénomènes. Où sont les prétendues
- » vésicules du nez et les excoriations derrière les oreilles, les saignements de nez, les selles, etc..., etc...; il n'y a pas de toux, le ventre est plat; bref, ou bien nous n'avons
- » pas de chance, ou bien tout ce que je viens de vous lire, n'est que de la farce et un tissu

C'est aussi sensé que si vous disiez qu'un tuberculeux qui ne présente pas de caverne n'est pas un phthisique, qu'un syphilitique sans exostoses ou carie n'a pas de syphilis, qu'un typhoïde sans perforation intestinale n'a pas de fièvre typhoïde, qu'une chlorotique sans ulcération de l'estomac n'a pas de chlorose. A quoi tiennent cependant les destinées d'une science! Si votre malade avait seulement présenté quelques petites « vésicules sur le nez » ou quelque peu d' « excoriation derrière les oreilles », votre campagne contre l'homœopathie était peut-être indéfiniment reculée.

Les pathogénésies hahnemanniennes sont « de la farce ou un tissu de mensonges et d'illusions ». Les médicaments ne produisent pas sur l'homme sain les symptômes indiqués par Hahnemann.

Telle est la proposition dont vous avez fait le thème de votre leçon du 18 novembre 1875.

Nous venons de voir à propos de quel fait vous avancez cette proposi-

Je crois avoir établi que ce fait ne constitue pas une preuve à l'appui.

Comment défendez-vous cette proposition ?

Sapiens nihil affirmat quod non probet. Mais pour vous, il s'agit bien de préceptes sages, quand il est question d'attaquer la doctrine de Hahne-

mann! Vous affirmez votre proposition; j'ai le droit de dire que vous ne la prouvez pas.

A une affirmation brutale, je pourrais opposer une négation catégorique. Mais si j'agissais ainsi, la question scientifique n'aurait fait ni un pas en avant, ni un pas en arrière.

Le devoir me commande donc de réfuter votre proposition calomnieuse. La tâche que j'assume n'est pas aisée. En cette matière, il n'y a qu'une sorte d'arguments à faire valoir, les faits.

Quels faits?

Les faits observés et publiés par Hahnemann? Vous récusez le témoignage de ce « faussaire ».

Les faits observés et publiés par les disciples et les collaborateurs de notre maître? Vous considérez ces travaux comme des « rêveries d'hypocondriaques » ou comme « des conceptions d'imaginations en délire ».

Les faits observés et publiés par les homœopathes, nos contemporains? Mais tout ce qui sort de la plume d'un homœopathe est suspect pour vous. Vous l'avez dit, Monsieur, les homœopathes sont « des ignorants, des charlatans, des illuminés, » et par-dessus tout... « des malhonnêtes gens, que de la vie vous ne voudriez regarder ni saluer! » (1)

Il ne nous reste, dès lors, que les faits observés et publiés par les allopathes, nos adversaires.

Ab hoste doceri! De tout temps, la bonne et loyale discussion a emprunté des arguments à ses adversaires!

Mais je ne sache pas que, dans une polémique scientifique, on ait jamais réduit quelqu'un à ne se servir que d'arguments fournis par la partie adverse.

C'est pourtant à cela que vous nous condamnez.

Bien plus, vous voulez que je vous démontre la vérité de la Matière médicale hahnemannienne «sans phrases», parce que c'est là, dites-vous, la seule méthode vraiment scientifique. En vérité, un peu de pudeur ne vous mésierait pas, Monsieur. En même temps que vous énoncez une proposition erronée sans l'appuyer sur une ombre de preuve, vous osez me prescrire les procédés scientifiques à suivre dans la polémique que j'avais acceptée.

N'importe! Je me soumets à vos ordres... et les exécuterai à la lettre. Vous serez d'autant mieux acculé, et en cas de reculade nouvelle, j'aurai le droit de ne vous lâcher que quand vous crierez merci! Car il faut que ce débat ait une solution.

Mon étude critique des pathogénésies hahnemanniennes sera donc basée sur des faits observés exclusivement par des allopathes (2).

⁽¹⁾ M. Crocq a trouvé mieux encore, tant il est vrai que son génie créateur ne se repose jamais. Dans une discussion académique toute récente, il a déclaré que les homœopathes étaient « des machines. » Voir « Bulletin de l'Académie de méd. de Belgique, » 4877, p. 76.

⁽²⁾ J'excepte une dizaine de faits publiés pour la plupart dans des journaux de médecine

Et ces faits seront exposés « sans phrases », c'est-à-dire dans toute leur nudité, sans y ajouter la moindre réflexion, sans les renforcer par le moindre commentaire.

Les faits, en un mot, dans leur éloquence native!

Si dans votre réplique vous vouliez suivre rigoureusement les conseils que vous avez cru devoir me donner, si vous pouviez vous contenter d'analyser impartialement, froidement, sans parti pris, les faits que j'ai invoqués et d'autres que je n'ai pas eu le temps de recueillir, si vous vous départiez un instant de vos violences habituelles à l'égard des hommopathes, et apportiez dans le débat le calme qui est l'apanage de l'homme convaincu et consciencieux, j'imagine que le problème serait bien vite résolu, et que vous vous inclineriez devant l'œuvre monumentale de l'immortel Hahnemann.

Pour démontrer dans des conditions si désavantageuses pour moi la sincérité des pathogénésies de notre maître, j'ai fait choix de l'arsenic et du phosphore : de l'arsenic, parce que ce médicament compte un grand nombre de monographies antérieures aux écrits de Hahnemann, lesquelles ont été mises à profit par lui; du phosphore, parce que les allopathes avaient trèspeu écrit sur cette substance avant notre maître (1) et que la plupart des

allopathique et observés par mon excellent ami, M. le professeur Imbert-Gourbeyre, de Clermont-Ferrand, parce que ces faits ont été recueillis par ce savant confrère dans les salles de l'hôpital de cette ville, en présence de ses élèves et d'autres médecins..... allopathes. Dans ces conditions, le témoignage de M. Imbert-Gourbeyre ne saurait être suspect à M. Crocq.

(1) A l'époque de Hahnemann, on n'avait presque aucune notion de l'action physiologique du phosphore.

Voici à quoi se résumait à peu près l'emploi de cette substance s'il faut en croire le professeur Macquer, dans son « Dictionnaire de Chimie » (1789) : « On fait avec le phosphore une » foule d'expériences amusantes... C'est une de ces substances au moyen desquelles les » magiciens tels que Comus peuvent faire des opérations capables de surprendre beaucoup de » ceux qui ne sont pas dans le secret. »

En 1833, des hommes considérables en étaient encore, en France, à se demander si le phosphore était une substance dangereuse. Voici une communication faite à l'Académie des sciences de Paris, dans la séance du 18 février 1855:

« M. Tiilois, ayant lu l'annonce d'essais faits en Allemagne sur l'administration à l'in
térieur des préparations de phosphore, voulut s'assurer par lui-même si l'ingestion de cette

substance dans le tube digestif d'un animal vivant, était aussi dangereuse qu'on le disait.

Pour cela, il fit avaler deux grains de phosphore à un chat. Le phosphore n'éprouva aucune

décomposition; il parcourut tout le tube intestinal sans causer dans les fonctions aucun

trouble appréciable. Le lendemain, la substance ingérée fut rendue avec les excréments qui

manifestèrent une phosphorescence très-marquée. Ces excréments, traités par l'eau chaude,

donnèrent une quantité de phosphore presque égale à celle qui avait été ingérée. » Encore

un poison d'opéra-comique pour M Crocq! Cette note de M. Tillois qui semble ignorer

l'adage corpora non agunt nisi soluta, a été reproduite sans commentaires et sans remarques

dans le « Journal de Chimie médicule » 1re série, t. IX, p. 248, rédigé alors par Chevallier,

Dumas, Guibourt, Julie-Fontenelle, Lassaigne, Orfila, Payen, Pelletan, Pelouze et Ro-

binet!

travaux sur lesquels je m'appuie, sont postérieurs à l'œuvre du chef de notre école. Mais j'aurais pu tout aussi bien choisir d'autres médicaments soit organiques, soit inorganiques, la belladone, l'aconit, le mercure, le soufre. J'aurais même pu choisir le pétrole, car cette huile pyro-bitumineuse n'est pas connue que d'hier comme vous l'insinuez quelque peu, et elle a eu depuis l'antiquité d'autres usages que de servir à l'éclairage (1). Dioscoride lui attribue un grand nombre de vertus médicales très-importantes, et Koenig, Ettmuller, Schroeder, Boecler et quelques autres médecins allemands et italiens vantent ses propriétés dans le traitement d'un grand nombre de maladies. (2) Les cas d'empoisonnement par le pétrole sont d'autre part assez nombreux.

Les faits sur lesquels je baserai mon étude pathogénétique de l'arsenic et du phosphore sont au nombre de près de onze cents.

J'y ajoute environ cinq cents extraits d'ouvrages indiquant des données générales sur l'action physiologique de ces deux substances (3).

Plus près de nous, l'action physiologique du phosphore semble tout aussi ignorée des médecins. Valleix et ses continuateurs, MM. les professeurs Racle et Lorain, dans leur travail sur les intoxications, décrivent tous les empoisonnements, mais oublient de traiter... de l'intoxication phosphorée.

Giacomini néglige de parler de cette substance, tout aussi bien que MM. Trousseau et Pidoux.

C'est peut-être à une circonstance toute fortuite — la parenté qui lie M. Constantin Paul à M. W. Rommelaere — que nous devons d'avoir cette lacune comblée dans la 8° édition (1876) du Traité de thérapeutique et de matière médicale de MM. Trousseau et Pidoux. Pour pouvoir rapporter les cas d'intoxication phosphorée observés et si bien décrits par M. W.Rommelaere, M. Constantin Paul a eu besoin de consacrer un article à l'étude de ce précieux médicament. Habent sua fata... observationes.

- (1) Le pétrole existe dans presque tous les pays du monde. On le trouve à la surface des eaux de quelques fontaines ou découlant de certains rochers aux Indes, en Asie, en Amérique, en Hongrie, en Angleterre, en Sicile, en Italie et en France. Dès le commencement du dix-huitième siècle, on avait coutume, en quelques endroits d'Italie, de se servir des pétroles grossiers pour s'éclairer à la place d'huile. En 4802, M. Mojon proposa d'en tirer parti pour l'éclairage de la ville de Gênes. Nil novi sub sole.
- (2) Vossius a écrit une savante dissertation sur le pétrole ancien et moderne. D'après le chevalier de Jaucourt, c'est Jacques Oligerus qui a le premier publié en 1690, à Copenhague, les brochures du médecin François Arioste sur le pétrole de Modène *De oleo montis Zibinii seu l'etroleo agri Mutinensis*. Ramazzini l'a redonnée plus correcte et plus étendue dans le recueil de ses œuvres.

Parmi les auteurs qui ont écrit des monographies sur le pétrole, il convient de citer : Wedel, G. W., « De Petroleo », Jena, 1709 ;

TEICHMEYER, H. F., « De Naphtha », Jena.

TEICHMETER, II. P., " De Naphtha ", scha.

HOEFFEL, J. Th., « Hist. balsam. miner. alsatici seu petrolei » Argent. 1734. Reichel, Chr. C. « Naphthæ, petrolei et inde productorum historia », Wittemb., 1746.

- (5) Voici l'index des auteurs et des ouvrages que j'ai mis à contribution :
- A. Pour la pathogénésie d'Arsenic:

«Acta regiæ Societatis medicæ Hauniensis», t. 111. — John Adams, in « Annal. société medic.-chirurg. de Bruges», 1862. — Agulhon, in « Bull. Acad. médec. de Paris», 1840, t. v. — Alquié, « Recueil de mémoires de médecine militaire», 1818. — Alquié, Benoit, Bourely, Bouliche et Pergez, in « Journal société médec. de Montpellier», 1814. — J.

Si les chiffres de ces observations et de ces travaux sont respectables, les noms des auteurs ne le sont pas moins. J'invoque l'autorité d'Orfila, Delpech, Devergie, Belloc, Bouley, Tardieu, Charcot, Trélat, Gubler, Sée, etc., parmi les français; de Christison, Biett, Fowler, Anderson, Taylor, Pereira, etc., parmi les anglais; de Casper, Billroth, Virchow, Bibra, Bôhm, Hoffmann, Hermann, Naunyn, etc., parmi les allemands; des

ALQUIER, in "Lyon médical", 1874, t. xvu — Anderson, in "Edinby med. and. surg. Journal", 1854 — Andral, in "Gazette médicale de Paris", 1833; Voir Raymond. — "Annales hygiène publiq. et de médec. lég.", t. xxix, xxxii, xxxvi, xxxvi. — Ansiaux, "Clinique chirurg.", Liége, 1829. — Ansroul, in "Gazette médicale de Paris", 1840. — Apoiger, in "Journal des connaiss. médic. pratiq.", Paris, 1845. — D'Ardiege et Lepage, in "Journ. des connaiss. médic. pratiq.", Paris, 1846, t. xiv. — Ardoini, in "Dict. encycl. des scienc. médic.", Paris, 1867, t. vi. — Armand, in "Gaz. médic. de Paris, 1851. — Arnaud de Villeneuve, in "Gaz. médic. de Paris", 1862. — Asteury, in "Edinby. med. and surg. Journal", 1819. — Augouard, in "Gazette médicale", 1845. — A. V......, "Lettre au D' Imbert-Gourbeyre", in "Art médical de Paris", 1875. — J.-H. Aveling, in "Lyon médical", 1872, t. x. — Avicenne cité in "Gaz. méd. de Paris", 1862.

BACHMANN, « Einige auserlesene med. gerichtl. Abhandlungen », Nurnberg, 4813.—Barbier, in «Gazette des Hôpitaux», 1843. - BARELLA, in «Journal de médecine de Bruxelles,» 1863; in « Annal. Soc. médec. d'Anvers », 1864; « De l'emploi thérap. de l'arsenic », 1866. — BARRIER, in «Journ. de médec. », 1783. — Jules Barse, in «Journ. médec. de Bruxel. », 1846, t. iv. — Barwell, V. Julius. — Baudouin, in A. Fouquier, « Causes célèbres », 1865. t. vii. - Baudry, V. Boutigny. - Baumgartner, in «Casper's Vierteljahrschr.», 1863, t. xxiii. - Bayard, in « Annal. hyg. publ., » 4re série, 1845, t. xxxiii. - Bayard et Chevallier, in « Annal. hyg. publ. », 4re série, 1846, t. xxxvi — Begrie, in « Edinbg med. Journ. », 1858; ibid, 1859. — Béнier, in « Bull. Acad. méd. Paris », 1870, t. хххv. — Венгенд, in « Pyl., Magazin ». - Beissenhirtz, « De Arsenici efficacia periculis illustrata », Berolini, 1823. - Belloc, « Médecine légale », t. iv. - Benoist (d'Amiens), in « Gazette des Hôpitaux », 1846 — Benoist de Sançois (Cher), in «Journ. de médec. et de chir. pratiq. », 1835, t. vi. — Benoit, V. Alquie. — G. Bergmann, in « Hygœa », 4873; «В. láck. sallsk. förb.» — Bertrand, in «Journ. génér. de médecine», décembre, 1813; - « Manuel médico-légal des poisons », Paris, 1817. — Biett, in « Journ. hebdomad. », 1828; — in « Gaz. méd. Paris », 1838; - in Cazenave, "Dict. de médec.", 2º édit., t iv. - Bijon, V. Mayet. - Bineau et Majesté, in « Journ. des connaiss. médico-chirurg. », novembre 1835. — Bird, V. Julius. — Военнамие, «De morbis nervorum», t. i. — Вони, in «OEsterr. med. wochenschr », 1843. — Böhm et Unterberger, « Beiträge zur Kenntniss der physiol. Wirkung der arsenigen säure », in «Archiv. f experim. pathol. u. pharmakol », II, H. 2 u 5, S. 89. — Bohnius, « De officio medici », 1701. — Boillet, in « Journal d'hygiène »; in L. Figuier, « Année scientifique », 1876. — Boissarie, V. Margontier. — Bonjean, in « Gaz. des Hôpit. », 1843. — Borelli, «Historiarum et Observationum centuriæ, » Parisiis, 1653. — G. Borelli et C. Demaria, « Repertorio medico-chirurgico del Piemonte », marzo 1835. - Borneque, « Thèse de Strasbourg », 1856; — in « Gaz. médic. de Paris », 1862. — Boudin, « Traité de géograph. et de statist. médic., » t. n; — « Traité des fièvres intermittentes », 1842. — Bouley jeune, in « Gaz. méd de Paris », 1835. — Bouliche, V. Alquié. — Bourdel, in «Revue thérap. du Midi», 1830. — Bourely, V. Alquié. — Bourneville. in «Progrès médical », 8 mai 1874. — Boutelle, in « Journ. de médec. », 1783. — Bouti gny et Baudry, in « Annal. hyg. publ. », 1re série, t xvII. — Bouvier et R. Leroy (d'Etiolles), in « Gaz. hebdom. de méd. et de chir », 1857 — Bramer, in « Casper's Wochenschrift », 1840. — Brenner, in "Med. Jahrb. cest. statt", 1857. — Brettschneider, V. Schmidt. — Briquet, in « Bull. Acad. médec. », 1870, t xxxv. - Brisken, in « Vierteljahrschr. f. gericht. u. öffentl. Medicin.», Berlin, 1864, t. xxv. — Brocknann, « Die metallurgischen Krankheiten desOber harzes », OEsterode, 1851. - Brode, «Philosophical transactions », ann. 1812, 27 february; cité par Orfila, in «Toxicolog. », 1, 421; V. Earle. - Bruté, in A. Fouquier,

Thiernesse, de M. W. Rommelaere et de M. Crocq lui-même parmi les belges. *Tu quoque!* Et pourquoi pas, s'il vons plaît? N'êtes-vous pas un observateur sagace, judicieux, patient, persévérant, infatigable, parfait en un mot, dès qu'il n'est pas question... d'homœopathie?

Représentez-vous qu'aucun de ces savants auteurs n'a eu l'idée de rapporter ces faits à l'appui des écrits de Hahnemann; représentez-vous que je laisse à tous ces faits leur langage propre, que je ne leur fais dire que

« Causes célèbres », 1865, t. vii. — Buchner, in « Journ. de médec. », 1863, t. 1 — « Bulletin général de thérapent. médic. et chirurg », publié par J.-E Miquel, 1843. — Butler, in « Atlante me 1. and. surg. Journal », sept. 1858. — Buzorini, in « Gaz. med. de Paris », 1835.

CADET DE GASSICOURT, in « Dictionn. des sc. médic. », Paris, 1812, t. 11; in « Journ. de médec. de Bruxelles », 1848, t. vi. -- CAELS, « Ratio occurrendi morbis a mineralium abusu produci solitis », Amstelodani, 1781. — L. CAGNAT, in « Gazette des Hôpit. », 1853. — Cahen, in «Arch. génér. de médec.», 1863. — Cardan, «De venenum differentiis», 1564. — L. Casper, « Traité de médec. légale », t. 11. — Castanel, V. Plater. — Caussé (d'Alby) et Orfila, in « Mémoir. Acad. médec. de Paris », 1841, t. ix. - Cauvet, in a Annal. hyg. publ. », 1875, t. xlin; V. Amrroise Paré. — Caventou, V. Ollivier (d'Angers); V. Chapeau. — Cersoy (de Langres), in «Bull. génér. de thérap. », 1869, 1. LXXVII. - Champouillon, in a Gaz. des Hôpit. », 1850. - Chapeau et Parisel, Chevallier et CAVENTOU, in « Bull. Acad. médec. de Paris », 1840, t. v. — Chappuis, in « Johrn. de chim. médic.», oct. 1843. — Charcot, « De l'anaphrodisie arsenicale », in « Journ. des connaiss. médic. pratiq. », 1864. — Снагует, «Étude sur une épidémie chez les ouvriers travaillant la fuchsine », thèse de Paris, 1863. — Chatin, in « Gaz. des Hôpit. », 1843; in « Toxicolog. d'Orfila», 1832, t. 1, p. 378. — Chauffard, V. Herard. — Chaussier, in «Bull. génér. de thérapeut. », 1869, t. LXXVII. — A. CHEVALLIER, in «Ann. hyg. publ. », 1re série, 1850, t. xlii; ibid., 1852, t. xlvii; V. Celivier; V. Bayard; V. Chapeau — Chevallier, Orfila et Ollivier (d'Angers), in "Annal. hyg. publ.", 1re série, 1812, t. xxviii. -CHOULANT, in "HENKE'S Zeitschr.", 1841. — CHRISTISON, "A treatise on poison". — A. Colter, « Hom. med. directory », London, 1873. — « Commercium litt. noricum », 1735 et 1737. — A. Cooper, « OEuvres chirurg.» — Coppée, V. de Plasse. — Coqueret et Orfila, in « Bull. Acad. médec. de Paris », 1838-39, t. 111; in « Toxicolog. d'Orfila », 1852. — Cramer, in "Hufeland's Journ", 1837. — Cramoizy, in "Bull. de la soc. hom. de France », mai 1863. — Croco, in « Journ. de médec. de Bruxel », 1852; V. Joly. — CRUGER, in «Acta nat. cur. », 2 à 4. — CURLING.

Damaschino, V. Henri Roger. — Danger, V. Flandin. — Daumerie, in «Journ. méd. de Bruxelles », 1852, t. xiv. - Decaisne, in « Bullet. Acad. roy. médec. de Belgiq. », 1854, t. XIII; - ibid, 1855, t. XIV. - DECAISNE et LEROY (d'Etiolles), in « Bull. Acad. royale médec. de Belgiq. », 1855, t. xiv. — Degner, in «Acia Nat. cur. » — De Haen, « Ratio medendi », pars IX, Paris, 1767. — Dehenne, in « Journ. de médec. », 1759. — G. de JAEGHERE et Van Meenen, in « Annal. méd.-légal. belges », Bruges, 1842, t. 1. — Delafond, in « Bullet. Acad. médec. Paris », 1842-43, t. vm. — Delarue, in « Bullet. de thérapeut. », 1857; in « Gazette des Hôpit. », 1858; in « Gaz. médic. de Paris », 1868. — Delioux DE SAVIGNAC, in « Dict. encycl. des sc. médic. », 1867, t. vi; in « Gaz. des Hôpit. », 1873. —A. Delpech, in « Annal. hyg. publiq. », 2° série, 1870, t. хххии.—С. Demaria, V. Borelli. — Demarquay, in « Gazette des Hôpitaux », 1866. — L. De Plasse et J. Coppée, « Rapports judiciaires au parquet de Charleroi », 4876. [Inédit.] — Desgranges, in « Recueil périodiq. de la société de médec. de Paris », an VII, t. vi. - Devergie, « Médecine légale », 5° édit., t. ш; in «Annal. hygiène publiq », 2° série, t. хын; in «Bullet. général de thérapeut.», Paris, 1869, t. LXXVII; V. ORFILA. — DEVERGIE et ORFILA, in « Gaz. des Tribunaux », 4850; in « Toxicologie d'Orfila», 1852, 5º édit., t. 1 — Devergie in Wahu, in « Journ. des connaiss. médical. », 1865 — Deville, in « Journ. de médec. et de chirurg. pratiq. », 1833,

ce qu'ils disent réellement, que je ne les torture pas pour les besoins de la cause, ni ne les commente, ni ne les habille..... Toutes les autorités que je cite ont justifié les observations de Hahnemann, à leur insu, sans le vouloir et sans le savoir, absolument comme M. Jourdain. Ces constatations seront peu agréables pour vous, Monsieur, j'en conviens; mais aussi qu'alliez-vous faire dans cette galère?

Mon travail comporte quatre parties bien distinctes:

1º L'étude analytique de l'action physiologique de l'arsenic et du phosphore ;

2º L'étude synthétique de l'action physiologique de l'arsenic et du phosphore ;

3º L'étude comparative de l'action physiologique de l'arsenic et du phosphore, et

4º Les applications thérapeutiques homæopathiques de l'arsenic et du phosphore.

t. ix. — Diberder, in A. Fouquier, « Causes célèbres », 1865, t. vii. — Dieberg, in « Vierteljahrschrift f. gericht. u. öffentl. Medicin. », Berlin, 1864, t. xxv. — Diemerbroeck, in « Art médic. de Paris », sept. 1865. — Dieu, in « Annal. hyg. publiq. ». 1854. — Dioscoride, cité par Duband, V. Durand. — Dorien, in « Casper's Vierteljahrschrift », 1862, t. xxii. — Dukerley et Eichinger, « Recueil de mémoires de médecine militaire », 1868. — Dupuy, in « Journ de médec. et chir. pratiq. », 1868, t. xxxix — Dupuytren, V. Orfila. — Duband-Fardel, in « Compte-rendu des séances de la société de médecine du département de la Seine », séance 20 févr. 1857. — Durant, « Thèse de Montpellier », 1852. — Durant, in « Communication de Gaultier de Claubry », in « Annal. hyg. publ. », 2° sér., 1856, t. v. — Marcellin Duval, « Dissertat. sur la toxicologie », Paris, 1806. — Dymock, in « Edinbg. medic. and. surg. Journal », 1843.

Earle, cité par Brodie, «Philosoph. trans.», ann. 1812. — Ebers, in «Hufeland's Journal», 1813. — J.-W Edwards, in «Medical and Physical Journal», 1823, vol. xlix. — Eichinger, V. Dukerley. — Emery, in «Bullet. Acad. médec. Paris», 1838-39, t. iii. — «Ephemer. nat. curios.», dec 3, ann. 9 et 10 — Errard, in «Journ. de médec et chir. pratiq.», 1843, t. xiv. — Espezel, in «Journ. médec. de Brux », 1844. — Ettmuller, in «Ephemer. nat. cur.», cent. III et IV.

D' F...... [DE LYON], in "Art médical de Paris", t. XXXII. — FABRICE D'AQUAPENDENTE. — FABRICE DE HILDEN, Cent. VII, Obs. 80.—Faculté de Giessen, in "Art médical de Paris", XXXIII. — FALCONER, « ESSAY ON PULSY", in "Gazette des Hôpit.", 1866. — FERNEL, "De methodo medendi". — FIELITZ, "Neues Magazin von Baldinger", 1789. — Fr. Fischer, in "Friedr. Bl. f. gericht. Med.", 1873, p. 309. — Flandin et Danger, in "Séance Acad. des sciences 9 janv. 1843; in "Annal. hyg. publ.", 1843, sér. I, t. XXIX. — Flechner, in "Verhandl. der K. K. Gesell. Ziu Wien", 1843. — Fodéré. — Forestus, "Opera", l. 30, obs. l. — Forget, in "Gaz. des Hôpit.", 1850. — Fourcade-Brunet, "Dissertat. inaugur. sur l'oxyde blanc d'arsenic", t. un, Paris, 1865; in "Art médical de Paris", 1872, t. XXIV. — Franque, in "Medic. Jahrb. f. d. Herz. Nassau, "1846. — Fristo, in "Journ. de médec. et de chir. pratiq.", 1830, t. 1. — Fuster, in "Gaz des Hôpit.", 1855, p. 302; in "Union médicale", 1855, t. ix, p. 312; in "Revue thérapeutique du Midi", 1850. — Fuster et Girbal, in "Union médicale", 1855, t. ix, p. 191.

Gailleard, cité par Ch. Bouchien, in « Annal. hyg. publ. », 2° série, 1874, t xlih. — Gailleton, in « Mémoires et Comptes-rend. des séances de la soc. médic. de Lyon », 1870, t. ix, p. 181; in « Journ. médec. de Lyon », 1° déc. 186°. — Gairdner, in « Art médic.

1º ETUDE ANALYTIQUE DE L'ACTION PHYSIOLOGIQUE DE L'ARSENIC ET DU PHOSPHORE.

Une pathogénésie comporte « l'étude des effets simples produits » par chaque substance, prise individuellement, dans l'organisme humain. » Ainsi s'exprime Hahnemann dans son « Essai sur un nouveau principe pour découvrir les vertus curatives des substances médicinales », publié en 1796 dans le Hufeland's Journal.

Tracer une pathogénésie, c'est donc faire toute l'histoire physiologique d'une substance, en démontrant, par la tradition et des expériences directes, la série de ses nombreuses actions électives sur les divers organes et appareils de notre économie.

de Paris », août 1873. — Garbiglietti, in « Bullet, génér, de thérap. », 1848, t. xxxv. — GAULTIER DE CLAUBRY, V. DURAND. - ARM. GAUTIER, in « Archiv. génér de physiol. normale et patholog. », Paris, 1875, 2º série, t. 11; V. Scolosuroff. — « Gazette des Hôpitaux », Paris, 1853 et 1860. — « Gazette hebdomadaire », Paris, 1871. — « Gazette médicale », Paris, 1862. - Gendrin, in « Recueil périodique », 1828; in « Journ. génér. de médec., de chirurg. et de pharm. », juillet 1828. — Geoffroy, « Matière médicale », 1741; — in « Journ. de médec. et de chir. pratiq. », 1835, t. vi, p 385; — in « Gaz. médic. », 1862, p. 173. — Geoghegan, in « Dublin quaterly journ. of. med. », februar. 1851. — Gérard de BEAUVAIS, in « Bullet. de la société médic. d'émulation », décembre 1821. — GERMAIN, in « Gazette hebdomadaire », 1860. — Giannelli, in « Gazette des Hôpit. », 1844, p. 404. — GIBB, "Transactiones of the pathol. society of London", 1860. — GIESSEN [FACULTÉ DE], " in « Art médical de Paris », t. xxxIII. — GIRBAL, in « Gaz. méd. de Paris », 1852; V. FUSTER. -GIRDLESTONE, in a Edinby. med. and surg. Journal », 1806. - GNELIN, in a MURRAY, Apparatus medicaminum », vn, Gættingue, 1795. — Godard et Ollivier, in « Archiv. génér. de médec. », 1829, t. xix. — L. Goffart, « Des paralysies appelées dynamiques..... », Liége, 1842. - Göthgens et Kossel, « Zur Kentniss der Arsenikvergift. », in « Centralbl. f. med. Wissenschaften », XXXII. — GRAVES, in « Art médical de Paris », 1865. — GREGORY, in «Liebic's Annal. f. Chemie u. Pharmacie », t li. — Greiselius, cité par Manget, « Biblioth. pharm. med. » - Grohe et Mosler, in « Gaz. médic. de Paris », 1867. - Gubler, « Comment. thérapeut. du Codex »; in « Bullet. de la Société anatom. », 1848, t. xxin; in « Bullet. Acad. médec. Paris », 1870, t. xxxv. — Guilbert, V. Van der Monde. — Guyot, in « Annal. de médec. physiolog. », 1834; in A. Fouquier, « Causes célèbres », 1865, t. vii; V. VINCENT.

Haffter, in a Schweizerische Zeitschrift von Pommer. », 1839. — Hallopeau, in a Nouv. dictionn. de médec. et de chir. pratiq. », t. xxn, Paris, 1876. — Hannon. in a Presse médic. belge », 1849. — Hardegg, a Dissert. inaugur. sistens observat. quasdam de vario arsenici in animalia effectu », Tubingæ, 1817. — Harder et Peyrr, a Exercitationes medicæ », Basileæ, 1682. — Hardy, in a Gazette médic. de Paris », 1862; in a Bullet. Académ. médec. de Paris », 1870, t. xxxv. — Harles, a De usu arsenici », Norimbergæ, 1811. — Hausmann, in a Oesterreichische Zeitschrift für Hom. », 1845. — Heberdeen, in an Hamb. Magazin », 97° livr. — Hein, in a Vermischten med. Schriften », 1836. — Heimich, in a Acta natur. cur. », 2. — Henckel, a Von der Bergsucht und Hüttenhatze », Freyberg, 1728. — Henke, in a Ceitschrift f. d. Staats Arzneik. », 1, 32. — Henzell et Taylor, in a Gaz. médic. de Paris, 1858. — Herard, Louis et Chauffard, in a Gazette hebdom. », 1868. — Hermann, a Lehrbuch der experimentellen toxicolog. », Berlin, 1874. — Heyfelder, a Med. ann. », 1858. — Hirsch, V. Virchow. — Hirt, in a Journ. de médec. Bruxelles », février 1877, 192; a Die Krankheiten der Arbeiter » Leipzig, t. III, 1875. —Hirtz, in a Nouv. dict. de méd. et chirur. prat. », t. III, Paris, 1865. — E. E. Hoffmann, a Arsenikvergift. u. cholera », in

Cette base de la Matière Médicale hahnemannienne est aujourd'hui reconnue et acceptée comme absolument scientifique et seule rationnelle par les allopathes de toutes les nuances. C'est ce que M. le professeur Gubler, atteint malheureusement comme vous de monomanie homœopathophobique, a établi de la manière la plus nette dans une discussion à l'Académie nationale de médecine de Paris en 1870. « Dans cette enceinte où je vois » tant de maîtres à côté de mes condisciples, » dit-il dans ce beau langage dont il a le secret, « nous avons tous à peu près les mêmes idées sur l'utilité » de l'anatomie, de la physiologie et des autres sciences fondamentales ; » journellement nous faisons de ces sciences des applications rationnelles à » la médecine proprement dite. Tous nous estimons l'observation au lit du » malade et l'expérimentation sur les animaux. Le moins organicien » fait de l'anatomie pathologique et fonde la connaissance d'un agent médi-

lmbert-Gourbeyre, in « Annal. médic. de la Flandre Occid.» 1857-58, t. v.; in « Moniteur des hôpit.», 1858; in « Gazette médic. de Paris », 1858; ibid., 1862; ibid. 1864; in « Art médical de Paris » xxx,xxxн, — 1864; 1865; 1872; 1873. — Isnard, in « Lyon Médical » 1875, t. хн.

C James, in « Gaz. médic. de Paris » 1839.— C. James et Orfila in « Bullet. Acad. médec. de Paris, » 1838-39, t. ii. — Jennings, in « Medic. and physic. Journal » 1851, t. lxv. — Joeger, « Dissert. inaugur. de effect. arsen. in var. organism. » Tubingæ, 1808. — Johannsohn, in « Lyon médical » 1874, t. xvii. — Joly et Crocq, in « Journ. de méd. de Bruxelles » 1852.— B. Jones, in « Prov. med. Journ. » 1845.—«Journal de chimie médicale », 1846, 1847.—«Journal of cutaneous medicin.», oct. 1867.—«Journal univers. hebdom,» 1832 in Devergie, « Médecine légale ». Paris, 1852. — Am. Joux, in « Gaz. des hôpitaux. » 1854. — Julius, Bird, Todd, Barwell, in « Gazet. hebdom. de méd. et de chir. » 1859.

KAISER, in « HENKE'S Zeitschrift », 1827. — DE KARAJAN, in « Wochenblatt der Aerzte in Wien » 1865, nos 20 à 27. — Keber, in « Casper's Vierteljahrschrift » 1859, xv; 1863, xxIII, 1863, t. xxiv. - Kellermann, in « OEsterreich. Jahrb. » 1840. - Kellie, in « Edinbg med. a. surg. Journ. 4808. -- Kersten, in a Deutsche klinik 4851. -- Kesteven, a Associat. und Journal 4856. - Kircher, « Mundus subterraneus » 4578, t. n. - Kleinert, « De arsenico atque reagentium in id usu ». Lipsiæ, 1824. — Klose, in « Henke's Zeitschrift » 1842 - Knape, « Krit. Annalen der Staatsarzneikunde », Berlin, 1804. - Knapp, « Ueber Arsenikesser » in « Allg. Wiener med. Zeitung », XXXIII, XL. — KOCH, in « RUST'S Magazin » 1857. - Köffler, in «Allg. Wien. med. Zeitung», 1863. - Kopp, in R. Leroy (d'Etiolles), in « Gaz. hebdom. de médec. et chir. » 1857, IV. — W. KOPPITZ, « Folgen der Arsenikfütterung bei pferden » in « Med. veter. u. Oesterr. B.» 1872. — Kortun, in « Henke's Zeitschrift » 1833. - Kossel et Göntgens, « Zur Kenntniss der Arsenwirkungen » in « Archiv für experim. Pharmakol. » 1875, vol v. — Krans (père) in G. Krans, « Des paralysies sans lésions matérielles appréciables » Liége, 1862. — Gustave Krans, « Des paraly_ sies» Liége, 1862. — Küchler, in « Medicinische Annalen von Puchelt, Chelius u. Noegele, » t. 1, nº 5, 1855.

Laborde, in « Journ. de méd. chir. et pharm. » 1787, t. lxx. — Lachèse (fils), in « Annal. hyg. publiq. », 4re série, t. xvii. — Lados, V. Mareska. — Langendorff, in « Henke's

[«]Virchow's Archiv», 1870, vol. L, série IV, t. x. — Fr. Hoffmann, « De metallurgica morbifica», 1705; «Opera». — Hohnbaum, in «Henke's Zeitschr. », 1821; ibid., 1828. — Hoogeweg, in «Casper's Vierteljahrschr. », 1859, t. xv. — Hooper, in « Medical Times », 1847. — Horand, in « Mémoires et comptes-rendus des séances de la société de médec. de Lyon», 1870, t. ix. — Horn, in « Archiv f. medic. Erfahrungen », 1816. — Horst, in « Medic. Zeitung vom Verein in Preussen», 1840. — Hubert, « Nova acta nat. cur. », V, III. — Huchard, V. Scolosuboff. — Hunt, « Practical observat. on the pathol. a treatment of certain diseases of the Skin», London, 1847. — Hutchinson, in « Medic. Times », 1868.

» CAMENTEUX SUR LES MODIFICATIONS QU'IL IMPRIME A NOS ORGANES ET A LEURS » FONCTIONS......» Et M. le professeur See, placé aux antipodes de M. Gubler, confirme ce jugement dans le cours de cette discussion, comme antérieurement il l'avait déjà fait dans ses leçons de clinique.« Les médicaments n'ont d'action » dit-il, « que sur les organes et les tissus...; ils n'ont pas de » vertu immanente qui soit antagoniste des maladies; mais ils ont une action » physiologique sur les organes et les tissus élémentaires, et cette action » se traduit soit par une augmentation ou une diminution de la nutrition des » tissus, soit par un trouble fonctionnel. Or, ce qui a lieu à l'état normal se » retrouve de tous points à l'état pathologique, et, pour passer dans un organisme malade, le remède ne change pas ses propriétés physiologiques. » Il n'y a donc pas de moyens spécifiques, mais il y a des modificateurs de » la texture et des fonctions des organes élémentaires ou composés. »

Zeitschr. » 1857. — Langevin, in « Journ. de méd. et de chir. pratiques » 1859, t. x. —

LASSAIGNE, in « Séance de l'Acad. de méd. de Paris », 19 janv. 1841. — LASSALAS, in « Art médic. de Paris » XXXII. — LAURE, in « Mémoires et ctes-rendus de la société des sciences méd. de Lyon » 1870, t. ix. — Lecanu, V. Ollivier (d'Angers). — Lehman, « Het arsenigzuur als geneesmiddel by diabetes mellitus ». Amsterd. diss 1873. — Leipzig (Faculté de), V. Faculté. — Léonard de Capoue cité par Cahen in « Archiv. génér. de médec. » 3º série, 1863. - LEPAGE (pharmacien), V. D'ARDIÈGE. - LERICHE, in « Journ. de méd. de Lyon » 1er nov. 1866. — Lenoux, « Cours sur les généralités de la médecine pratique » 1826. — R. Leroy (d'Etiolles), in « Gazette des tribunaux », 1850; in « Gazette des hôpitaux » 1857 in « Gazette hebdom. de médec. et de chirurg. », 1857, t. ıv; in « Gazette médicale » 1861. V. DECAISNE. V. TROCHON. - LESOILLE, in « Journ. de médec. de Brux. », 1852. - LESPINAS et ORFILA, in « Mémoir. Acad. méd. de Paris » 1841, t. IX. - LESTRADE, in «Annal. hyg. publ. » 1re série, 1850, t. XLIV. — LESUEUR, V. ORFILA. — LETHEBY, in «London med. gaz. » januar. 1847. — Leuret, in « Recueil périodique », 1826. — Lipp (de Gratz), in « Bullet. génér. de thérapeut. », 1870, t. LXXVIII. -- LODIBERT, in « Bullet. Acad médec. de Paris » 1833-39, t. III. — J. Lolliot, « Thèse inaugur. » Paris 1868; in « Gazette hebdom.» 1868; in « Art Médical de Paris », 1872 — Lombard, in « Bullet. Acad. méd. Belgiq. » 1849. — London pharmacentical Journal. — Lorain, V. Tardieu. — Lordat, « Note communiquée à la société de médecine de Montpellier » 1805. — Louis, V. Hérard. — Lucas, in « Journ, des conn. méd. prat.», 1849, 2º série, t. III. — AMAT. LUSITANUS, Cent. 2 cur 34. MACAULAY, cité par L. Orfila, in « Dict. encycl. des sc. méd. » Paris, 1867, t. vi. -MACLAGAN, in « Art méd. de Paris » 1865. — Mac Leon, in « Edinb. med. and surg. Journ. » 1819. — Magnus Huss, « Chronische alcoholikrankheit. » Stockholm, 1852. — Манівих, in « Bullet. société anatom. » 1853. — Манон, «Médec. légale », 1801. — Маньот, in « Séance Acad. médecine de Paris » 17 sept. 1850. — MAJAULT, cité par IMBERT-GOURBEYRE, in « Art médic.», Paris, 1873. — Majesté, V. Bineau. — Malmsten, in « Hygœa, 1873, B. läck. sallsk, förh.» - Mangor, in « Act. societ. medic. Hauniens. » t. III. - Marc (traduction de Rose), « Manuel d'autops. cadav.» — Marchand, in « Annal. médic. de la Fland. Occid.» 1851; ibid. « Second mémoire », 1854. - Mareska et Lados, in « Gazet. hôp. » 1846. - Margontier et Boissarie, in Orfila, in «Mémoir. Acad. médec. Paris » 1841. - Marmé « Vergleikende Versuche über d. Wirkung der arsenige Saür. » in « Göttinger Nachtricht. » XXIII. - MARSHALL, in « Edimbg. med. Journ. » XII. - MARTINEAU, in « Bull. et Mémoir. sociét. médic. des hôpit. » 1873. — Maschka, in « Casper's Viertelj. » 1859 et 1863. --MASSARIA, in « Art médic. Paris » 1865. — MASSART, in « Gaz. hebdom. » 1863. — MASSART, SELOT, « Et. sur les fièvr. intermitt. » in « Arch. génér. de médec. » 1846. — MAYER, in « Annal. soc. méd. d'Anvers » 1864 — Mayet et Bijon, in « Journ. de mèdec. de Brux. » 1874. — MEAN, in « Biblioth. médic. » 1821. — « Medical (the) Press and circular » 1875. - Merbach, in « Viertellahrsch. f. gericht. u. öffentl. Sanit. » 1875. - Merunowicz, C'est une simple variante des idées que M. Gubler avait déjà développées, dans son Mémoire sur le choléra de 1865 et dans la préface de ses Commentaires thérapeutiques du Codex (1868), où il dit : « Les agents théra» peutiques n'agissent pas en vertu d'autres lois chez un malade que chez » un sujet sain. Dans les deux cas, ils n'atteignent que nos organes pour » en modifier la composition et la structure, ou les actes sécrétoires, » moteurs, sensitifs, nutritifs ou plastiques. Très-rarement ils s'adressent » à une cause pathologique, jamais à une de ces entités morbides qui ne » sont que des conceptions de notre esprit, des abstractions de symptômes » sans réalité matérielle. »

Mettez en regard de ces déclarations ce que Hahnemann écrivait en 1840 dans son immortel « Organon der rationnellen Heilkunst » : « ... Il n'y a » donc pas de moyen plus sûr et plus naturel, pour trouver infailliblement » les effets propres des médicaments sur l'homme, que de les essayer » séparément les uns des autres, et à des doses modérées, sur des personnes » saines, et de noter les changements, les symptomes et les signes qui » résultent de leur action primitive, surtout sur l'état physique et sur le

NAUNYN in Von Ziemssen's, « Handbuch der speciellen Pathologie...» Leipzig, 1876. — Nedermeyer, « Beitrage zur Naturgeschichte von Moll. » Salzbourg, 1787. — Newman, in « Horn's Archiv » 1811. — Nissen, in « Nord Archiv von Pfuff», 1799. — Noack et Trinks, « Mat. médic. » — Nonyt, V. Mojon. — « Nonnulla de arsenici effectu in organismum per experim. in canibus » Berlin, 1829 — Nothnagel, « Handbuch der Arzneimittellehre ». Berlin, 1870. — Novati, in « Repertorio delle scienze mediche del Piemonte » 1838; V. Plater.

OGSTON et Ryan, « London med. gaz. » 1831. — Ollivier (d'Angers), V. Chevallier. V. Godart. V. Orfila. — Oilivier (d'Angers) et Caventou, in « Bull. Acad. médec. Paris. » 1839-1840. — Ollivier (d'Angers), Chevallier et Le Canu, « Rapport sur les expériences de Delafond in « Bull. Acad. médec. Paris. » 1842-1843. — Ontyd, in « Bull. Acad. médec. Paris. » 1838-1839. — Oppler, in « Med. Zeit. in Preussen. » 1841. — Orfila. « Toxicologie », 5° édit. 1852; in « Mémoir. Acad. de médec. » 1840-1841; in « Archiv. général de médec. » 1825, 1841; in A. Fouquier, « Causes célèbres » 1858, t. 1; in « Gaz. d. hôpit. », 1857; in « Gaz. d. tribunaux » 1850; in « Dict. encycl. scienc. médic. » 1867; in « Bull. Académ. médec. » t. III; in « Annal. hygièn. publiq. » t. xxxi, xxxii; V. Chevallier; V. Coqueret; V. Devergie; V. Const. James; V. Lespinas; V. Raymond; V. Smith. — Orfila, Dupuytren et Petit, in « Archiv. génér. médec. » 1823. — Orfila, Ollivier, Devergie et Lesueur, in « Mém. Acad. médec. » 1841. — Jos. Ossieur, in « Annal. méd. de la Fland. Occid. », 1858, t. vi.

Pansa, « De peripneumonia metallicorum » 1614. — Lucien Papillaud, in « Gaz. méd. de Paris » 1865; in « Journ. des connaiss. médic. » 1865. — Рарреннеім, « Handbuch der Sanitaetspolizei » 1858. — А. Рабе in Art. de Cauvet, in « Annal. hyg. publ. » 1875. — Parisel, V. Chapeau. — Paris in Rayer, « Dict. en 25 vol. » — Paris et Taylor, in « Art

[«] Przeglad lekarski » in Oettinger (de Cracovie), in Virchow u. Hirsch. « Jahresbericht », Berlin, 1875. — Metzger, « Med. gericht. Abhandlung. », Kænigsberg, 1804; « Ger. med observat. » 1~78, Kænigsberg. — А. Millet (de Tours), « De l'emploi thérap. des préparat. arsenicales », Paris, 2° édit. 1865.—Missa, in « Archiv. génér. de mèdec. » 1825.— J.-E.-M. Miquel, « Bullet. gén. de thérap. médic et chirurg. », 1843. — Mojon et Nonat, « Société médicale d'émulation ». Séance des 5 et 19 sept. 1839. — Morganti, in « Gaz. médicale » 1852. — J. Morley, in « British medical Journal ». jan. 1873. — Mosler, V. Grohe. — Moutard-Martin, in « Gaz. hebdom. de méd. et de chir. » 1869. — Murray, in « Edinbg. med. surg. Journal ». vii, xiii, xviii. — Myrrhen, « Act. nat. cur. », dec. 3.

» moral, c'est-à-dire les éléments de maladie que ces substances sont

- » capables de produire; car, ainsi qu'on l'a vu plus haut, toute la vertu » curative des médicaments est fondée uniquement sur le pouvoir qu'ils ont
- » de modifier l'état de l'homme, et ressort de l'observation des effets qui ré-

» sultent de l'exercice de cette faculté. »

Ces professions de principes ne vengent-elles pas suffisamment la mémoire de Hahnemann des mépris et des injustices des allopathes ? Mais qu'advient-il de vos accusations, M. Crocq, en présence de ces déclarations et de ces aveux arrachés aux plus grandes illustrations des écoles médicales modernes? A moins que vous n'alliez à Canossa, je ne vois pas comment vous vous tirerez de ce mauvais pas.

Et comme s'il ne suffisait pas aux allopathes de toutes les écoles d'enlever ou..... d'emprunter à Halmemann le principe fondamental de sa Matière Médicale, voici que M. le professeur Gubler reconnaît, toujours sans citer le nom de notre maître, que le procédé d'analyse pathogénétique de celui-ci peut seul conduire à la connaissance des effets véritables des substances pharmaceutiques.

méd. de Paris » 1872. — PARKER, in « Edinbg. med. Journ. » 1864. — CONST. PAUL, V. TROUSSEAU. — PEARSON, in « Art médic. de Paris » 1873. — PEREIRA, « Elem. of mat. med. " London, 1839. - R.-B.-M. PEREIRA, in « Corresp. medic. " London, 1872. -Pergez, V. Alguié. - Perrine, in «Americ. Journ. of the medic. scienc. » vol. xi. -Petit, V. Orfila. — Peuch, in « Mém. et ctes-rend. de la société des sc. médic. de Lyon » 1868, t. vii. — Peyer, 1682. — Peyrr, V. Harder. — Pfann, « Samml. versch. merkw. Fall. » Nurnberg, 1750. — Pidoux, V. Trousseau. — Pinault, in A. Fouquier, « Causes célèbres » 1865, t. vii. — Plater, Castanei et Novati, in « Omodei ann. » 1856. — Por-TALEZ, « Journ. de médec. de Corvisart, Leroux et Boyer », 1803. — Preussius, « Act. nat. cur. », 1715. — A. Proust, « Traité d'hyg. publiq. et privée ». Paris, 1877. — Puchelt, in « Heidelb. klin. annal. » 1839. — PYL, « Aufsaetze u. Beobachtung. aus d. gerichtl. Arzneiwissenschaft. » Berlin, 1784; in « Sammlung » t. m; « Magazin »; « Neues magazin », t. m.

Quarin, « Animadversationes practicæ in diversos morbos », 1787.

RABUTEAU, in « Gaz. hebd. » 1868. — RAMAZZINI, « De morbis opificum», 1795. — RAM-LOVIUS, « Von der Lähmung u. dem Zittern der Bergleute ». - RAMSEY, in « Americ. Journ. of the medic. science » 1834. — RAPP, in « Annal. hyg. publ. » 1875, t. XLIII. — RAYER, in Tardieu. - Raymond, Rouget, Andral, Orfila et Tardieu, in « Annal. hyg. publ. » XXXVIII. - REMER, « Lehrbuch der Chemie », Hilnest, 1812. - RENAULT, « Nouv. expér. sur les contre-poisons de l'ars. », an IX. — REUTER, in « Medic. Jahrb. f. d. Herz. », Nassau, 1846. — Robert, in « Journ. de médec. et de chir. pratiq. » 1830, t. 1. — Robson, in « Lond. med. gaz. » 1837. — Roger, in « Lond. med. chir. trans. » н. — Henri Roger et Damaschino, in « Dict. encycl. des sc. médic. » Paris, 1877, t. v, (art. Roséole). -- Romberg, « Klinische Ergebnesse », 1846; « Klinische Wahrnehmungen und Beobacht. » Berlin, 1851; « Lehrbuch der Nervenkrankheiten ». Berlin, 1857, t.:. -ROGNETTA, in « Annal. de thérap. » Mars, 1845. — Roth, in Scheulen in « Casper's Medic. Wochenschr. », 1868; in « Hom. Vierteljahrs. », XII.—ROTHAMEL, in « HENKE's Zeitschrift, 18.1. -ROUGET, V. RAYMOND. - J.-PHIL. ROUX, « NOUV. élém. de médec. opérat. », Paris, 1813. - RYAN, V. OGSTON.

SAIKOWSKY, «Ueber die Fettmetamorphose der Organe nach innerl. Gebrauch von Arsenik, Antimon. u. Phosphor Präparaten », in « Virchow's Archiv. », septemb. u.octob. 1835; in W. Leube, d'Erlangen; in Journ. de médec. de Bruxelles. - Sallin, in « Recueil périod. de la société de médec. Paris , t. vII, an VIII; in « Journ. de médecine », t. LVIII. Nous reproduisons la profession de foi qu'on peut lire à ce sujet dans le Bulletin de l'Académie nationale de médecine de Paris, 1871, t. XXXV:

- « La doctrine physiologique des médicaments en est encore à sa période » embryonnaire. Les conceptions idéales ne manquent pas, mais la base
- » expérimentale n'est pas suffisamment solide. Il faut avant tout recueillir
- » DES FAITS, LES ANALYSER RIGOUREUSEMENT ET LES COMPARER POUR EN DÉDUIRE
- » DES FAITS, LES ANALISER RIGOTREUSERLAT ET ELE COMMUNICATION PROPERTY » CE QUI EST GÉNÉRAL, et s'élever enfin à leur systématisation régulière,
- » logique, acceptable par tous les bons esprits, sinon absolument défini-
- » tive. »

C'est bien là précisément ce que nous comptons faire, suivant les préceptes de Hahnemann, pour connaître l'action physiologique de l'arsenic et du phosphore. Nous « analyserons rigoureusement les faits qui ont été recueillis » en dehors de tout esprit de système; « nous comparerons ces faits pour en déduire ce qui est général, » ce qui est caractéristique; nous étudierons le groupement des symptômes, leur marche, leurs caractères différentiels, leur durée, leur terminaison, « pour arriver ainsi à une systématisation

Takenius, « Hippocrates chymicus » Cap. 24. — A. Tardieu, « Et. sur l'empoisonn. », 1876; in « Bull. société anatom. », 1848, t. xxiii; V. Raymond. — A. Tardieu et Lorain,

[—] Salmuth, cité par Stahl. — Saurel (de Montpellier), in a Bibl. hom.» Mars, 1877. — Schaeffer, in " Hufeland's Journal " 1816 - Schaefer, in " Wiener Zeitschr., neue Folge" 1858, t. x. - Schaeffner, « Versucht einer diagnost, und therap. Darstellung der Arsenikvergiftung ». Berlin, 1817. — Schaper, « Beitrage zur Lehre von der Arsenikvergiftung » 1846. — Schedel, «Lettre du 26 mars 1840, citée in «Toxicolog. d'Orfila» 1852. — Scheffer, « Gesundheit der Bergleute », Chemnitz, 1770. - Scheulen, in « Casper's Medic. Wochenschrift », 1844; ibid., 1868. — Schlegel, in « Henke's Zeitschrift », 1821; in « Hufeland's Journ. », 1827. — Schmidt et Bretschneider, « Beitrage z. Lehr. von den Arsenikwirkungen » (Moleschott's Untersuchungen, 1859) — Schnidt et Sturzwage, «Einfluss der arsenigen Saür. auf den Stoffwechsel (Moleschott's Untersuchungen, 1859). -SCHMITT, in « Annal. hyg. publ. » 1847, t. XXXVII. — SCHNEIDER, in « Wiener Wochenschrift » 1853. — Schreyer, in « Henke's Zeitschr.» 1852. — J. Schroeder, « Pharmacopeia medico-chimica » 1641. — Schulze, in « Annal. der Staatsarzneï von Knape », 1803. — C. Schwabe, in "Casper's Vierteljahrschrift " 1862, t. XXI. - Schweickhard, in "Guy's hospital reports » 1837. — G. Sée, in « Dict. de médec. et de chirurg. pratiq. (art. Asthme)», 1864, t. m; in « Bull. Ac. méd. Paris », 1870, t. xxxv; in « Gaz. hebdom. », 1871. — SENNERT. — SERPH, in « Gaz. médic. » 1840. — SERRE, in « Journ. de médecine » 1846. - Siedamgrotzky, « Arsenikvergiftung bei Hirschen » in Sachs. B. s. 31. 1872. - Sistach, in « Gaz. médic. de Paris » 1861, t. xvi. — J.-T.-B Skillmann (de New-Brunswick), « Americ Journ. of the medic science » vol. xviii, 1836. - Sklarek, « Archiv f. Anatom. u. Physiol. » 1866. - Skrzeczka, « Ueber die giftige Wirkung der arsenigen Saür a. d. Menschen »; in «Königsberg. medic. Jahrb. » Kænigsberg, 1, 4859. — Sмітн, « Dissertat. inaugur. sur l'usage et l'abus des caustiques ». Paris, 1815; in « Journal hebdomad. (observation) », 1832; in « Toxicologie d'Orfila », 1852, t. I. - Sonderland, in « Rhein-Jahrbuch. von Harles », 1820. - Spengler, in «Henke's Zeitschrift », 1848. - Sperling, « Dissertat. inaugur. » 1685. — Sprögel, « Dissertat. sistens experimenta circa varia venena ». Gættingen, 1753; Recus. in Haller, collect. disput. practicar. experim., xxxi, t. vi. - Stachow, in « Henke's Zeitschrift », 1833. - Stail. - Stevenson, in « Jahresbericht über Leistungen u. Fortschritt. in der gesammt. Medicin.» 1876. — Stilli, eite par TAYLOR, « Amer. med. Journal » 1848. — Stokvis, in « Journ. médec. Brux. » 1876, t. II. - Störck, « Annus medicus » t. 1. 1779. - Sturzwage, V. Schmidt.

régulière, logique, acceptable par tous les bons esprits, » et après, nous établirons les applications thérapeutiques rationnelles de ces substances; car, comme le fait observer avec infiniment de raison toujours le même M. Gubler: « Quand l'action physiologique des médicaments sera parfaite- « ment connue, la thérapeutique ne sera plus qu'un corollaire de la « physiologie. »

Plus d'un demi-siècle avant M. Gubler, Hahnemann disait dans son « Organon der rationnellen Heilkunst » : « On a besoin de connaître dans

- » tout son développement la puissance morbifique de chaque médicament.
- » En d'autres termes, il faut que les symptômes et changements (lésions ana-
- » tomiques) qui sont susceptibles de subvenir par l'action de chacun d'eux
- » sur l'économie, surtout chez un homme sain, aient été, autant que possi-
- » ble, tous observés avant qu'on puisse se livrer à l'espoir de trouver
- » parmi eux, des remèdes contre la plupart des maladies naturelles ».

in « Gaz. médic. de Paris » 1865. — Tardieu, élève en pharmacie, in « Art médic. de Paris » t. xxxii. — Tardieu, élève en médecine, in « Art médic. de Paris » t. xxxii. — Taylor. « On poisons », 1859; V. Henzell; V. Paris. — Tessier, in « Revue méd. chirurg. de Paris ». Août 1848. — G. Thilenius, « Med. chir. Bemerkungen ». Frankfort, 1809. — Thomson, « Medical essay. and obs. » 1747, t. iv. — Timœus a Guldenklee, « Casus med. », 1, 7, cas. 2. Lipsiæ, 1662. — Todd, V. Julius. — Tonnelier, in « Journ de médec. chirurg. et pharmac. par Corvisart, Leroux et Boyer, an X, t. iv, p. 15. — J. Toogood, in « Provincial medical and surgie. Journ. » 1842, t. 1. — Trapani, in « Gaz. méd. de Paris » 1859. — Trincks, V. Noack. — Trochon et R. Leroy d'Etiolles, in « Gazette hebdom. » 1857. — Trousseau, in « Gazette médicale de Paris » 1862. — Trousseau et Pidoux, » Tr. de mat. médic. » 2° édit. et 8° éd., t. 1. — Trousseau, Pidoux et C. Paul, « Tr. de thérap. et de mat. médic. » 9° édit. Paris, 1875, t. 1. — J.-J. de Tschudi, in « Wiener medic. Wochenschrift » 1851, 1853. — Tubbes, cité par Taylor. — John Twaites, « Edinbg. med. Journ. » 1834.

UNTERBERGER, V. BÖHM.

Van den Dale, in Frank « Manuel de toxicologie ». Anvers, 1803. — Van der Monde, « Journal, » 1756, t. iv. — Van Meenen, V. De Jaeghere. — Vaudey, « Thèse de Strasbourg « 1870. — Vergely, in « Société de médecine de Bordeaux » 1871. — Vincent et Guyot, in A. Fouquier, « Causes célèbres » 1865, t. vii. — Virchow u. Hirsch, in « Jahresbericht über die Leistungen u. Forts. in der gesamm. Med. » Berlin, 1875. — Vogt, « Arzneimittellehre » t. i. — Von Veiel, in « Schmidt's Jahrbuch. » 1860.

Wagner, « Preuss. med. Zeiting » 1839. — Wanu, in « Johrn. des connaiss. médic.» 1865. — J.-J. Waldschmidt, « Opera medica practica » 1767. — Walther, in « Casper's Vierteljahrschr. », Berl. 1862, t. xxii. — Ward, in « Edingb. med. Johrn. » 1850 et 1835. — Watson, in « The Lancet » 1857. — Wedel, « De arsenico ». — Weichard, « Thesaur. galeno pharmaceut. » 1626. — Wepfer, « Cichtæ aquat. hist » Basileæ, 1679. — Werner, « Arsenikvergiftung einer Mastheerde in Oester. B. 57. » — Whalley, in « Med. Times and gaz. » 1866, t. 11. — Wibmer, « Die Wirkungen der Arzneim. u. Gifte », München, 1831-1840. — Wibmer-Schaper, « Beitrage zu der Lehre von der Arsenikvergiftung ». 1846. — Wurtz et Willm, « Diet. de chimie pure et appliquée ». 1869, 1.

YSIGMONDY, « Uber Arsen. u. sein Missbrauch in der zahnärtzlichen Praxis », in « Deutsche Vierteljahrschrift f. Zahnheilkunde, t. n. — Yvan, in « Gaz. d. hôpitaux » 1855.

Zacchias, « Quæst. med. leg. » 1630. — Zenoni, in « Deutsche klinik » 1852., etc., etc.

B. Pour la pathogénésie de Phosphore :

Touchante harmonie dans les principes et dans les modes d'application et de recherches! Et M. Gubler, qui devrait marcher avec Hahnemann, la main dans la main, trouve pourtant plus convenable de se parer de ses plumes, tout en faisant chorus contre lui avec tous les allopathes bon teint. Il y trouve d'ailleurs toutes sortes d'avantages: ainsi il n'est « excommunié » par personne, ce qui lui permet d'aspirer à toutes les fonctions et à tous les honneurs; de plus, pour ceux de ses lecteurs qui ignorent l'œuvre hahnemannienne, — et c'est la presque unanimité! — il est bel et bien le père de ces principes et de ces procédés d'investigation scientifique. Tulit honores! Mais gare au Sic vos nou vobis. Le jour où justice sera rendue à Hahnemann, M. Gubler essuiera un afiront proportionné à la gloire qu'il a usurpée.

Et ce jour est proche! Il n'en saurait être autrement quand on peut faire entendre devant un corps académique aussi savant que le nôtre, et sans

John Adams in « Med. Times and Gaz. » 1862. — Adrian in « Arch. génér. de médec. , » 6° série, 1871, t. xviii. — « Allgemeine Wien. medic. Zeit.», 1861. — E. Ancelon in « Gaz. des hôpit. » 1869. — P. E. Andant in « Annal. hyg. publ. », 2° sér., t. xl.; in « Bull. gén. de thérap. médie et chirurg. » Paris, 1871, t. lxxxl. — Annales hyg. publ. et de médec. lég., 1853, t. in; 1856, t. vi; 1865, t. x; 1869, t. xix; t. xxvl. — Annales société médicochirurg., 1847. — Archiv. génér. de médec. 1845, t. ix. — W. Arnold ii « Hygea Zeitschrift für Heilkunst, » t. xxiii. — Austie «Slight poisoning from the medicinal usu of phosphorus » Practitioner, Aug. 1873.

BAMBERGEB in « Würzburger medicinische Zeitschrift », 1866, t. vn, lib. 1; in «Archiv. génér. de médic. » 6° sér., 1867, 1 ix. - Barajan in « Wiener Zeitschr. der Aerzte » 1863. — BAUD in « Gaz. méd. de Paris, » 1858. — BAUER V. VOIT. — E. BEAUGRAND in « Journ. des connaiss, medic, pratiq., » 1849. — Bednar « Actions et emploi thérap, du phosph., » in « Wien. medic. Wochenschr., » 1855. — Bemer in « Soc. méd. des Hôpit., » 1863. — Bellini in « Journ. de médec. de Brux., » 4836, t. i. — Bernhardt in « Virchow's Archiv, » 1867, t. 39; in « Gaz. hebdom. de méd. et chir., » 1837. — Bichrig in « Deutsche Klinik » 1850. — Biermer « Præparat, von Phosphorvergif, » in « Correspondenzbl, der schweizer Aerzte, " 1873, x. — Bigelow in " Americ. Journ. of the medic. scienc. " 1852. — Billroth in Haltenhoff, V. Haltenhoff. — Bingley in « The lancet », 1857. — Birkner, de Postdam, in « Casper's Vierteljahrschr » t. xIII. — Blandin V. Broca. — C. Blix « Hygga » in « Dublin med. Presse » 1863. — Blumhardt in « Journ. des connaiss. medic. pratiq. » 2° sér , 1849, t пп. — Воиспарат in « Gaz. des Hôpit., » 1853. — Boudin in « С tes Rdas Acad des Sc. », 1854, l. xxxxx. — Franz Bouttatz: « Ueber den Phosphor als Arzneimittel ». Goettingen, 1800. - Boys de Loury, J.-B. Chevallier et Personne in «Annal. hyg. publ.», 2º série, l xl; V. Bricheteau —Brera: «Rifless oni medico-pratiche sull' uso interno dell' fosforo, particolarmente nell' Emiplegia " Pavia, 1798. — M. J. Breyton: « Thèse sur l'empoisonn, aigu par le phosph. " Paris, 1833. — Bricheteau. — Bricheteau, Boys de Loury et Chevallier : « Mémoire à l'Académie, » 1847 ; et in U. Trélat : « De la nécrose...» --BROADBENT: « Further illustrations of the therapeutic usus of phosphorus, » Practitioner, 75. - Broca in « Bull Acad, méd. Paris » xxv. - Broca et Blandin in « Union médic. » 1848. - Broca et Trélat in « Gaz. des Hôpit. » 1871. - Brullé : « Empoisonnt aigu par le phosphore (thèse) », Paris, 1860. — Jos. Buchner: « Jahrbuch der Pharmakodynamik, » 1844. - Bucquoy in « Séance soc. médec. des Hôpit. » 10 juin, 1863; « ibid. » 12 juin, 1868; in « Gaz. hebdom. de médec. et chirurg. » 1863; « ibid. » 1868; in « Union médicale », 1838, 3° sér., t. vi. — « Bullet. Acad. méd. de Paris », xxiv, xxv. — « Bull. génér. de thérap. médic. et chirurg.», 1875, t. 84. — Bünau in « Casper's Vierteljahrschr.» 1859, t. xvi. CASSE, V. THIERNESSE. — J. L. CASPER « Vierteljahrschr. f. Gericht...... » 1862, t. xxi 1865, 1; « Klinische Novellen»; « Handbuch der gerichtl. medizinisch Leichen Diasoulever la moindre protestation ni la plus petite objection, ce langage que "Hahnemann certes ne désavouerait pas : « La _connaissance complète de » l'action physiologique des médicaments est la seule base scientifique » réelle de leur emplor! » (a)

Vous-même, M. Crocq, — et personne ne s'en étounera — vous partagez de tous points les opinions de M. le professeur Gubler sur la valeur de la

gnost. » Berlin, 4857. — Causé in « Ost. Deutsche post » in « Gaz. des Hôpit. » 1859. — Causé (d'Alby) in « Journ. de chim. médic., » sér. in, t. x; ibid, sér. iv, t. 1. — Séverin Causé et A. Chevallier fils in « Annal. hyg. pnbl. » 4855. — A. Cazenave in « Dict. de méd. » en 30 vol , 1841, ½ édit., t. xxiv. — Max. Chariner: « Die acute Phosphorvergift. », Berlin, 1867. — Chassaignac in « Gazette des Hôpit. » 1875. — Chauffard in « Société méd. des Hôpit. » 1835. — A. Chevallier, fils, V. Sév. Causé. — J.-B. Chevallier, V. Boys de Loury; V. Bricheteau. — Chevallier, Duchesne et Réveil in « Journ. de chim. médic.», sér. 4, t. iv. — Chevallier, père et fils, Duchesne et O. Henry in « Annal. hyg. publ. » 2° série, t. vii. — Cornet et d'Hauw in « Annal. soc. méd.-chir. de Bruges » 1857. — Coulon in U. Trélat : « De la nécrose... » — Coutaret (de Roanne), Fuchet et Deschastelus in « Journ. de chim. médic., » 1859. — Cusco et Jobert de Lamballe in U. Trélat : « De la nécrose... »

Dassier in « Journ, de médec, de Toulouse » nov^{bre} 1851. — Dechambre in « Gaz. hebd. méd. et chir. » Paris, 1863. — Dujardin-Beaunetz in « Journ, de médec, de Bruxelles » 1868, t. 1; in « Gaz. des Hôpit. » 1868. — Delpech in « Annal. hyg. publ. » 1863, t. ix. — Demarquay V. Duméril. — Depaire V. Thiernesse. — Derlon in Gubler in « Bull. génér, de thérap. » 1873. — Deschastelus V. Coutaret. — Despoetes et Ferrus in « Bull. Aead. méd. Paris, » xxiv. — Deyeux in « Annal. de Chimie, » t. xxvn. — Ch. E. Dieffenbach, in « Biblioth. médic. » 1829, t. n. — Dietz in Von Bibra u. Geist: « Die Krankh. d. Arbeit, in Phosph. » Erlangen, 1847. — Dionis (d'Auxerte) et Sallé in Tardieu: « Ét. sur l'empoisonni ». — Dubarry in « Annal. hyg. publ., » 2° sér. 1869. — Duchesne V. Chevallier. — Ducom in « Gaz. des Hôpit., » 1863. — Aug. Dumeril, Demarquay et Lecointe in « Gaz. méd. de Paris » 3° sér., 1852, t. vii. — Dupasquier: « Mémoire à l'Acad. des scienc. » 1846; et in « Bull. Acad. méd. Paris, » xxv. — L. Dusart in « Jour. de médec. de Brux. » 1874. — Dyrkowsky in « Medicinische-chemische untersuchungen » von Hoppe-Seyler, 1866.

Eames in a Bull. génér. de thérap », 1873, t. 83. — W. Ebstein in a Archiv der Heilkunde » II, IV, X — Eurle : a Characteristik der acuten Phosphorvergiftung » Tubingen, 1861.

Ferrari in a Gaz. médic. lombarde ». — Ferrus V. Despoetes. — Flachsland : a Annal. f. ges. Heilk. der Badischen sanitäts Commiss. » Jahrg. I, Heft, 2. — Fleckles in a Wochenblatt der Zeitschr. der k. k. Gesellschaft der Aerzte in Wien », 12 nov 1862. — Flüßel in a Casper's Vierteljahrschr. » t. IX. — Fonssagnives in a Gaz. hebdom. » 1868. — Julia de Fontenelle in a Annal. hyg. publiq. » 2° sér , 1855, t. III. — Forget in a Gaz. des Hôpit. » 1873. — Foucher in U. Trélat : a De la nécrose...... » — A. Fournier et A. Ollivier in a Gaz. hebd. de médec. et chirurg. » 1868; in a Union médic. » 1868, t. vi. — Frutz, Ranyier et Verliac in a Archiv. génér. de médec. » 1863, 6° sér., t. III. — Fuchet V. Coutaret.

Gallard, Mascarel et Malapert in « Journ. de chim médic., » sér. IV, t. VII. — Gallavardin: « Les paralysies phosphoriques »; et in « Gaz. médic. de Paris » 1854. — Gazelte des hôpitaux, 1860, 1863, 1866, 1868, 1870, 1872, 1873, etc. — Gazelte hebdom. de méd. et de chir. le Paris 1854, 1864, 1866, 1869, 1872, etc. — Gazelte médicale de Strasbourg, 1845. — Geist V. Von Bibra. — Gendrin in « Gaz. des Hôpit. » 1846. — Gerdv in « Gaz. des Hôpit. » 1872. — Giulio in « Dict. univ. de mat. médic. » Paris, 1833,

 ⁽A) Professeur Noêl, in « Bulletin de l'Académie royale de médecine de Belgique », 1876,
 p. 799.

thérapeutique et de la matière médicale allopathiques, et sur la nature des réformes qu'elles doivent subir. N'est-ce pas vous qui avez proclamé ces principes en pleine Académie de médecine de Belgique, dans la séance du 17 avril 1861 : « La thérapeutique n'est point une science; c'est une » science qui est encore à faire. Cette assertion vous paraîtra hasardée en » présence des innombrables et volumineux écrits dont elle a fait l'objet, » mais c'est précisément parce qu'on a trop écrit que c'est devenu un » fatras, un salmigondis indigeste, quelque chose de tout différent de la » science réelle. C'est une science à faire en ce sens qu'il faut élaguer » considérablement de ce qui a été fait, en retrancher la presque tota-» lité et refaire le reste, conformément à des principes dont, dans l'état » actuel, l'absence saute aux yeux. »

t. v. — Glenard in « Gaz. méd. de Lyon » 1856. — Gourier (de Niort) in « Séance Acad. des se.» 13 août 1860; in « Gaz. des Hôpit.» 1860. — Groebenschnetz in « Medicinische Zeitung der Vereins f. Heilkunde in Preussen » 1843. — Gueneau de Mussy in « Gaz. médic» de Paris » 1869. — Gueniot in « Gaz. des Hôpit. » 1845. — Guérin in « Gaz. des Hôpit.) 1871, 1872, 1873. — Guersant et Ratier in « Gaz. des Hôpit. » 1845. — Gueler: « Commentair. thérap. du Codex; » in « Archiv. génér. de médec. » 1871, t. xvii; in « Bull. génér. de thérapeut. » 1873. — Guillabert (de Toulon) in « Gaz. des Hôpit. » 1863, 1865. — Gualt. Gutsmuths: « De Phosphorismo » (Diss. inaug.). Berolini, 1862.

HAAS in « Lyon médic. » 1874, t. xv. — G. HALTENHOFF: « De la périostite et de la nécrose phosphorique » Zurich, 1866. — HARDY ET TRÉLAT in « Gaz. des Hôpit. » 1870. — HARTROST in « CASPER'S Wochenschrift » 1846. — HAUFF in « Wurtemb. Corresp. Blatt. » 1860. — D'HAUW V. CORNET. — HECQUET in « Gaz. hebd. médec. et de chir. » Paris, 1863. — D'HEILLY in LANCEREAUX: « Traité sur la dégénéresc. graiss. des éléments actifs du foie, des reins et des muscles » Juillet, 1863; in « Gaz. des Hôpit. » 1865. — O. HENRY V. CHEVALLIER. — HÉRARD in « Bull société médic. des hôpit. » 1859. — HERTWIG: « Praktische Arzneimittelschref. Thierarzte » Berlin, 1847. — HERVIEUX in « Union médic. » 1848. — HIRT in « Journ. de médec., de chir. et de pharm. de Bruxell. » 1877. — HOFFMANN (de Berlin) in « Journ. de médec. de Bruxell. » 1871, t. 1. — HORN in « CASPER'S Vierteljahrschr.», t. xii. — HUBEANER in « Medicin. Corresp. Blatt. » . — HUBERT in « Journ. de chim. médic. » ser. iv, t. iv. — HUFELAND'S Journal, vn, xv. — HUBERT in « Handbuch der Toxicologie » Berlin, 1862. — L. HIRT, « Die Kraukheiten der Arbeiter », Leipzig, 1875.

Jacobsonn in « Deutsche Zeitschrift f. pract. Mcd. » 49, p. 467. — Jageb : « Contribut. à l'étude de la néerose phosphor. » Paris, 1874; in G. Hayem: « Rev. des sc. médic. » Paris, 1874, t. 1. — Jobeb (de Lamballe) in « Bull. Acad. imp. médec. de Paris, » 1859, t. xxv; V. Cusco. — Journal de chimie médicale, 1844, 1847, etc. — Journ. des connais. médic.-pratiq., 1851. — Journal de la société gallic. de médec. homœop., 1855, t. vi. — Journal de médec. de Brux., 1873, t. n; ibid. t. 1.

DE KARAJAN in « Gaz. hebdom. de méd. et de chirurg. » Paris, 1865. — Klebs in « Virchow's Archiv » 1865, t. xxxii. — Koch « in Correspondenzblatt », t. xxxi. — Fr. Koechling in « Horn's Archiv.... », t. x. — Köhler in « The british and for medic. a. surgic review, » 1872. — Koehler in « Berliner klinische Wochenschr. » 1870; in « Medic. chirurg. Monatsheften, » 1861; « Wurtemb. medic. correspondenzblatt, » 1861; in « Renz Toxicologische Versuch. ub. Phosphor... » Tubingen, 1861. — Köhler v. Ehrle: « Charakteristik der acuten Phosphorvergift. » Tubingen, 1861. — Kopf in « Allgem. wiener med. Zeitung, » 1859. — Kraus in « All. wiener med. Zeit. von Kraus u. Pichler. » Wien, 1857. — Kuvenenagel in « Berliner klin. Wochenschr. » 1839, nº 16.

A. LAROULBÈNE in « Gazette hebdomadaire », 1874. — E. Lyfargue in « Union médic. de la Gironde » 1859. — Lailler in « Soc. médic. des Hôpit. » 12 juin, 1868; in U. Trèlat: « De la nécrose.... » — E. Lambert: « Nécrose phosph. du maxill. supér. droit. »

Oui, Monsieur, vous avez raison: la Matière médicale allopathique est en ruines! Le temps, poursuivant son œuvre, réduira bientôt ces restes eu poussière. Et les savants des générations futures n'en retrouvant qu'à peine les traces, pourront dire: Etiam periere ruinæ! L'expérimentation physiologique dont l'impérieuse nécessité a été établie par Hahnemann, (a) aura été le « Mane, Thecel, Phares » de cette pseudo-science. Soyez donc assez loyal pour reconnaître tout haut ce que vous devez penser tout bas.

Dans mon Étude analytique de l'action physiologique de l'arsenic et du

(A) « Aucun médeciu, à ma connaissance », dit Hahnemann, « autre que le grand et immortel A. Haller, n'a, dans le cours de vingt-cinq siècles, soupçonné cette méthode si naturelle, si absolument nécessaire et si uniquement vraie, d'observer les effets purs et propres de chaque médicament, pour conclure de là quelles sont les maladies qu'il serait apte à guérir. Haller seul, avant moi, a compris la nécessité de suivre cette marche (Voir préface de sa Pharmacopæa Helvet., Bàle, 1771, in-folio, p. 12): « Nempe primum in corpore sano medela » tentanda est, sine peregrina ulla miscella; odoreque et sapore ejus exploratis, exigna illius » dosis ingerenda et ad omnes, quæ inde contingunt, affectiones, quis pulsns, quis calor, quæ » respiratio, quænam excretiones, attendendum. Inde adductum phenomenorum, in sano » obviorum, transcas ad experimenta in corpore ægroto, etc. ». Mais nul médecin n'a profité de ce précieux avis, personne même n'y a fait attention!!! »

— Lancereaux in « Gaz. des hôpit. », 1863. — Langenbeck. — J. L. Lassaigne: « Observ. sur les caract. chimiq. de l'empois par le phosph. » in « Gaz. des Hôpit., » 1850. — Lecointe V. Dumeril. — Lescalogne in « Mémoire de Bricheteau, Boys de Loury et Chevallier. » — Alp. Leroy in « Mém. de la soc. médic. d'émulat. » Paris, 1797, t. 1. — Leube in « Correspondenzbl d. Thüringen. Artzl. » t. v. — E. Leudet in « Arch. génér. de méd. » série v, 1857, t ix. — Leudet et Rayer in U. Trélat: « De la nécrose... » — Levieux in « Bull. Acad. médec. de Paris », t. xxv. — Lewin in « Virchow's Archiv f. pathol. Anatom. u Physiol. » 1861, t. xxi; in Brullè: « De l'empoisonnement par le phosphore ». — Leyden V. Munk. — Liedbeck in Griesselich's Hygœa, « Zeitschr. Heilkunst, » t xx; in « F. W. Oppenhem's Zeitschrift fur die gesammte Medicin » 1848, t. xxxvii. — P. Lorain et Z. Roussin in Tardieu: « Et. shr l'empoisonnement. » — Lorinser in « Mediciuische Jahrbuch der Oesterreich. Staats. » Wien, 1845; in « Journ. médec. de Brux. » 1845. — Luwinsky in « Zeitschrift der Gesellschaft der Aerzte zu Wien » 1858.

W. Mac Evan in « Glasgow med. Journ. » 1873. — Magitot in « Séance Acad. des seienc. » 26 8bre 1875. - Magnus Huss: «Chronische alkoholkrankheit, » Stockholm, 1852 — MAISONNEUVE in Ul. Trélat : « De la nécrose phosphorée... » — MALAPERT V. GAILLARD. - MALTHYSENS in « Journ. des conn. médic. pratiq. » 1847, 1848. - MANDL in « Gaz. des Hôpit. » 1860. — MANNKOPF in « Wiener med. Wochenschr.» 1862, 1863. - Marchan: in « Journ. de méd. et de chir. de Toulouse », décembre, 1855. - Ем. Marchand (de Ste-Foy, Gironde) in « Gaz. des Hôpit. » 1855. — Marrotte in « Bull. Acad. médec. de Paris », t. xxxv. — Martin Solon in Geisolle in « Journ. des connais. médic.-pratiq. » 2º série, 1847, I. 1. - MASCAREL in TARDIEU : « Et. sur l'empoisonnement »; V. Gaillard. — Mauriac in Ul. Trélat : « De la nécrose... » — Meding in « Vereinte deutsch. Zeitschrift f. die Staatsarzneikunde » 1849. — Mège-Mouries in « Gaz. médic. de Paris » 1858. -- Menard in « Archiv. génér. de médec. » 6º série, 1871, 1. XVIII. -- METZ: "Acute Phosphorvergiftung u. fettleber " in " Casper's Vierteljahrschr." 1863. — Meyer-Hoffmeister: « Die Phosphorzündhölzehenfahriken der kt. Zurich » in « Schweiz Zeitschrift, f. Med. Chir. u. Geburtsch. » 1847. — L. Meyer (de Hambourg) in « Archiv für pathologische Anatomie » 1865. — Meynet in « Mémoir et Ctes Rs de la société des sc. médic. de Lyon », 1866. — Mialhe in « Union médicale », 1863, t. 1; in « Annales hyg. publ. », 2e sér., 1869; in « Archives génér. de méd. » 1871, 6e sér., t. xvm. -

phosphore, j'exposerai donc « les effets simples produits par ces substances, prises individuellement, dans l'organisme humain. »

J'exposerai les « effets simples » de l'arsenic et du phosphore, car lorsqu'un médicament est administré en même temps que d'autres substances actives, les troubles physiologiques ne ressortent pas suffisamment pour pouvoir être différenciés les uns des autres. Ainsi, j'ai élagué toutes les observations où l'action de l'arsenic et du phosphore n'était pas seule en jeu et se trouvait confondue avec l'action d'autres agents.

Contrairement à ce qui se pratique toujours dans l'école allopathique, je

Millard in « Gaz. hebdomad. » 1863. — Moigno in « Gaz. des Hôpit. » 1859. — Monneret in « Archiv. génér. de médec. » 1858, t. xii. — Montaudon in « Annal. byg. publ. » 2° série, 1855, t. mi. — Munk et Leyden in « Vircilow's Archiv.; » in « Berlin klin. Wochens. » 1864.

Nasse, « De l'act. du phosph. sur le sang », in « Gaz. des Hôpit. » 1860; in « Dict. de Wagner », art. Blut. — Nelaton in « Gaz. des Hôpit. » 1860. — Netz. — Neumann ; « Die Necrois der Kieferknochen bei phosphorzundholzarbeitem » in « Preuss. ver. Zeit. » 1846.

OLLIVER V. POLLARD. — A. OLLIVIER: « Essai sur les albumin, produit, par les subst. toxiq, » 1863; V. A. Fournier. — Orfila in « Bull. Acad. médec, Paris » xxiv.

Papillon in « Journ. d'anatom. et de physiol. » 1867, t. iv. — Parent in « Ctes R^{dus} de l'Institut » 1869. — Patrouillard in « Bullet. génér. de thérap. » 1873. — Const. Paul in « Gaz. des hôpit. » 1860; in « Journ. de chim. médic. » série iv, t. vi. — Pelletier in « Mémoir de la société de médec. d'émulation » 1797, t. i. — Joh. Pereira : « The elements of materia medica and therapeutics », London, 1842. — Personne in « Journ. de médec. de Brux. », 1869, t. i; V. Boys de Loury. — Pestel in « Union médicale », 3° série, t. iii. — Fr. Pilger in « Annal. cliniq. de Montpellier », xxxvii. — Poggiale iu « Bull. Acad. médec. de Paris » xxiv; in « Gaz. hebd. », 1859. — Luigi Poggio in « Journ. de chim. médic. » sér. 4, t. vii; in « Gaz. hebdem. », 1869. — Pollard et Olliver in Saint-Ames : « Medic. and. Surgic. Journ. », 1854. — Poulet in « Gaz. médic. de Paris », 1872; in « Bullet. génér. » 1873, t. lxxxiii. — Puchstein in « Casper's Vierteljahrschr. » 1863, xxi.

L. Ranvier in « Archiv. génér. de médec. », 1863; in « John. d'anatom. et de physiol. » t. iv, 1867; in « Gaz. médic. de Paris », 1867; V. Fritz. — Raoulx: « Empoisonnemt de Mile Renard». — Ratier in « Gaz. des hôpit. », 1845; V. Guersant.—Rayer V. Leudet.—Renz: « Toxicologische Versuche über Phosphor. » Tubingen, 1861.—Réveil in « Annal. hyg. publ., » 2° série, t. xii; in « Bull. Académie de méd. de Paris, xxiv; V. Chevallier. — Richer in « Gazette des Hôpitaux» 1872. — Richer in « Gaz. des Hôpit. », 1846. — Roessing: « Bydrage tot de leer der acute phosphorvergifting», Groningen, 872. — O. Rollinger in « Deutsch. Archiv f. kl. Medic. », 1868.— Rommelaere in « Bull. acad. médec. de Belgiq. » sér. III, 1871, t. v; ibid. 1874. — Rond in « Journ. de chim. médic. », série iv, t. ii. — Roucher in « Annal. hyg. publiq. » 2° sér. 1869, t. xxxi. — Roussel in « Revue médicale » 1846, mai. — Z. Roussin V. P. Lorain; V. Tardieu. — Rudal in « the Lancet » 1844, i.

Sachs: « Dissertatio de phosphoro, » Argentor., 1751.— Saint-Ames (de Montgomméry) in « New-Orleans medical and surgie. journal », 1854. — Sainowsky in « Virchow's Archiv », t. xxxiv. — Salle V. Dionis (d'Auxerre). — Schiller in « Gaz. médic. de Strashourg » 1859, n° h. — Schiff in « Archiv für experim. Pathol. », 1874. — L. Schneider: « Vereinte deutsche Zeitschr. für Staatsarzneik. » 1837, t. x.—J. Schoeffer: « Sammlung gerichtsarztlicher Gutachten » Berlin, 1852. — B. Schichardt: « Untersuchun. über acute Phosphorvergiftungen » in « Henle und Pfeif R's Zeitschrift, » 1856; in « Union médic. » 1856. — Schwarz in « Clin. hom. de Beauvais » Paris, 1863, i. — Sédillot in « Gaz. médic. » 1846. — J. Shepart in « The Lancet », 1843, t. xlv. — Simon et U. Trélat in « U. Trélat: » De la nécrose..... » — Hugo Sinftleben in « Virchow's Archiv » 1863, 1866. — Skrzeczka: « Ueber die giftige Wirkung der arsenigen Säure auf der Menschen » in

n'ai pas amalgamé dans un même creuset les [troubles pathogénétiques propres à l'arsenic et au phosphore avec les troubles pathogénétiques propres aux dérivés de ces substances. J'examinerai les symptômes fonctionnels et les lésions anatomo-pathologiques produits par l'administration de l'arsenic blanc, et je laisserai de côté les puissances morbifiques de l'arsenic proprement dit, de l'hydrogène arsénié, des arséniures, des arsénites et des arséniates; j'examinerai l'action du phosphore métalloïdique et non celle de l'acide phosphoreux, de l'acide phosphorique, des hypophosphites, des phosphites, des phosphites et de l'hydrogène phosphoré. Quelle analogie peut-on établir a priori entre le mode d'action

« Königsberger medic. Jahrbucher » Königsberg, 1859. — Société de médecine de Bordeaux, 1862. — Société des sc. médic. de Gannat in « Journ. des conn. médic-pratiq. », 1851. — Sorbets in « Journ. médic. de Brux.» 1869, t. n, vol. xlix; in « Gaz. des Hôpit. », 1869. — W. Sorbet « Der Phosphor » Leipzig, 1862. — Am. Sourboulle in « Bull. génér. de thérap. médic. et chirurg. » 1872, t. lxxxn. — Spengler in « Henke's Zeitschr. » 1848. — Stanlev in « The Lancet » 1849. — Strohl: « Note sur une nécrose partic. des maxill., » in « Gaz. méd. de Strasbourg » 1845. — Strumpf: « Handbuch der Arzneimittellehre » Berlin, 1855; « De l'emploi du phosphore dans certaines amauroses » in « Gaz. des Hôpit. », 1855. — Stueve (thèse) cité in « Huffland's Journ. » xv.

A. Tardieu: «Et. sur l'empoisonnement », 1876; in «Annal. hyg. publ. » 2° sér. 1856, t. vi. — Tardieu et Roussin in « Annal. hyg. publ. » 2° série, 1869. — Tavignot in « Gaz. des Hôpit. », 1833 — M. Taylor in « The Lancet » in « Ul. Trélat : « De la nécrose ...», 1857. — Thiernesse et Casse in « Bull. Acad. médec. de Belgiq. », 1874, sér. 5, t. viii, — Thiernesse et Depaire in « Bull. acad. médic. de Belgiq. » 1874, sér. 5, t. viii. — Tillaux in « Gaz. médic. de Paris, » 1875. — Trasbot in « Gubler : Comment. thérapeut. » — Ul. Trélat : « De la nécrose causée par le phosphore » Paris, 1867; in « Lyon médic. » 1814, t. xv. — V. Broca; V. Hardy. — Tungel : « Klinische Mittheilung. v. d. med. Abtheil. des allgem. Krankenhauses in Hamburg », 1861; in « Virchow's Archiv », 1864.

Van Hauff: «Wintemb. medic. Correspond.», 1860.—Van Lair in «Bull. Acad. médec. de Belgiq.», 1874.—Vannaque in 4 Journ. de chim. médic. » série iv, t. in.—A.W. Varges in «Zeitschr. der Mcdic., Chirurg. und Geburtshülfe » xv.— Velpeau in «Gaz. des hôpit.», 1846.— Verliac, V. Fritz.— Verneuil in «Gaz. des Hôpit.», 1862; ibid. 1875; in «Lyon médic.» 1874, t. xv.— Virchow in Ul. Trélat: «De la nécrose...»; in J. Wolfs: «Einiges ub. d. Pathol. Anatom... Berlin, 1868; «Handbuch der spec. Path. und Therap., t. 1; «Archiv f. Physiol., t. xxi; «Gesammelte Abhandlungen».— Vito Giuseppe in «Il Morgagni giornale», 1872.— Voul in «Deutsche Klinik,» 1866.—Voit et Bauer in «Med. Tim. and Gaz. » in «Union médic.» 5° sér., t. xii.—Von Bibra und Geist: «Die Krankh. der Arbeit. in Phosphorzündholzfabriken» Erlangen, 1847; in «Annal. de la soc. méd. chir. de Bruges», 1862.— Von Bunau in «Vierteljahrschr. f. Gerichtl. u. off. Med. herausg. van Wilhelm Horn», Berlin, 1864, 2° série, t. 1.—Von Mering in «Deutsch. Zeitschr. f. prakt. Med.», t. xll.

Wagner in « Archiv f. Heilk.», 1862, t. п.—Wald: « Handbuch der gericht! Medicin.» — O. Weber in « Berliner klin. Wochenschrift » 1864 (uber septicæmia). — Georg. Wegener in « The British medic. Jou n », 1872; in « Archiv l Pathol.. Anatom., u Physiol., u. f. klin. Medec. 45 Bd 2 Heft, 1872; » Der Einfluss der Phosphor. auf den Organismus » in « Virchow's Archiv » Lv, 1872 — A. Weickard in « Vermischte medic. Schriften » 1780, t. 1. — S. Wolfs: « Einiges ub. d. pathol. anatom. Befund in dem Organism. hei d. acut. Phosphorvergift. » Berlin, 1868 — Worde in « Edinbg. med. and surgic. journ. » xxviii. — Wunderlich in « Archiv der Heilkunde » 1863, t. 1v. — Wyss in « Schweizerische Zeitschrift f. Heilkunde », 1864.

ZEIDLER in « Annal. der Berlin. Charity », 1860, t. x; 1861, t. 1.

du phosphore et celui du phosphate de chaux par exemple? L'admets parfaitement que de grandes analogies d'action puissent exister entre un métal ou un métalloïde et les dérivés de ces substances. Mais cette analogie ne pourra être établie qu'après « qu'une étude complète des effets simples » produits par chaque substance prise individuellement » aura permis d'établir quelles sont les puissances physiologiques communes et quelles sont les puissances physiologiques différentielles.

La manie de tout généraliser d'emblée, abruptè, est un mal invétéré, héréditaire chez nos confrères allopathes. Cet esprit systématique les rend injustes et intraitables pour ceux qui, plus modestes et plus pénétrés des intérèts de la science et de l'humanité, s'appliquent à tout analyser et à tout individualiser avant de généraliser d'une manière absolue, certaine et seule scientifique. C'est suivant ce système que les allopathes confondent aujourd'hui encore l'action du phosphore métalloïdique avec l'action du phosphate de chaux, comme ils confondent l'action de l'iode et de ses dérivés, l'action du mercure et des mercuriaux, l'action du fer et des préparations martiales.

Et pourquoi établissent-ils ou maintiennent-ils cette confusion que Hahnemann repoussait si énergiquement et qui doit avoir causé de nombreuses et funestes méprises ?

« Parce que, » disent MM. Trousseau et Pidoux, « toutes les préparations d'une substance n'agissent que par un principe commun » (1).

Et cette manière de voir est partagée par la presque unanimité des allopathes (2).

⁽¹⁾ Trousseau et Pidoux, « Traité de thérapeutique et de matière médicale » 1858, t. 1, p. 314.

⁽²⁾ La réintroduction de l'acide salicylique dans la pratique allopathique nous a permis de constater que M. le professeur Sée persiste dans les anciens errements et confond encore l'action de l'acide salicylique avec l'action de ses dérivés : le salicylicate de soude, de quinine, de lithine, de méthyle, etc

Rien ne montre mieux l'incroyable légèreté de nos adversaires dans l'application des remèdes les plus toxiques, que l'histoire de cette « nouveanté médicale » plus habilement exploitée que la Revalenta. Ecoutons ce que M. Sée disait à l'Académie de médecine de Paris, dans la séance du 26 juin 1877 :

^{«} Comme l'acide salicylique dérive de l'acide phénique, on a été porté à rechercher s'il » parlageait avec lui les propriétés désinfectantes et antiputrides; les résultats ne se sont pas » fait attendre et ont confirmé les prévisions théoriques.

 [»] Ainsi on a appris qu'une petite quantité d'acide salicylique ajoutée à un mélange d'amyg » daline et d'émulsion d'amandes douces s'oppose au développement de l'odeur d'essence
 » d'amandes amères.

[»] d'amandes amères.

» ... Si l'acide salicylique jouit de la propriété de neutraliser les ferments et de retarder

l'apparition des champignons microscopiques, on pouvait espérer qu'il serait tout puissant
 contre les intoxications attribuées aux développements d'organismes inférieurs et qu'en

[»] annihilant ces substances toxiques encore peu connues, qu'on a désignées sous les noms de

[»] sepsine et de zymase, il deviendrait l'antiseptique par excellence

^{»} Les médecins s'emparèrent dès lors (1874) de ce moyen nouveau et en firent l'appli» cation à toutes les maladies septiques, putrides, zymotiques ou dues à des ferments, à des
» parasites.

[»] Les applications devinrent pour ainsi dire innombrables, et les journaux scientifiques

Si je puis établir que la majeure du syllogisme imaginé ou rappelé par MM. Trousseau et Pidoux est une proposition absolument erronée, j'anrai démontré que la conclusion qu'ils en tirent n'est qu'une affirmation dénuée de toute certitude. Quelle est cette majeure? « Les diverses préparations D'UNE SUBSTANCE N'AGISSENT QUE PAR UN PRINCIPE COMMUN. » Mais l'acide carbonique, le sulfure de carbone et le gaz d'éclairage ou n'importe quel autre carbure hydrique, renferment du carbone. A qui fera-t-on accroire que ces trois substances n'agissent que par le carbone et comme le carbone, c'est-à-dire comme le diamant qui n'est que du carbone pur? A qui fera-t-on accroire que les combinaisons de ce carbone avec l'oxygène, avec le soufre ou avec l'hydrogène, n'en modifient pas les propriétés physiologiques au même titre que les propriétés physiques et les propriétés chimiques?

Il n'est pas étonnant que les conséquences qui se déduisent de pareilles

prémisses soient erronées. Un exemple :

« L'arsenic blanc produit les mêmes troubles physiologiques que l'iodure » d'arsenic, parce que ces substances n'agissent que par un principe com-» mun, l'arsenic proprement dit. »

Mais en vertu du même principe l'iodure d'arsenie produirait les mêmes troubles physiologiques que l'iodure de fer (1) et ce dernier les mêmes troubles physiologiques que le fer. (2)

Ce qui peut se formuler ainsi:

As
$$0^3 = As 1^3 = Fe 1^3 = Fe$$

D'où l'on peut conclure:

1º Que l'iodure d'arsenic exerce à la fois identiquement la même action que l'iodure de fer et que l'arsenic blanc;

2º Que l'arsenic blanc, considéré jusqu'ici par tous les allopathes comme un médicament altérant, exerce absolument la même action physiologique que le fer, considéré jusqu'ici par ces mêmes allopathes comme un médicament reconstituant.

L'acide salicylique est connu depuis 1831 et constitue le principe actif de la Reine des prés, Spirea Ulmaria. Une étude pathogénétique de ce remède tant vanté jadis et tombé dans un injuste oubli, a été publiée en 4863 par le docteur Bojanus, de Nischney-Novgorod, dans le Homeopatische Vierteljahrschrift von Clotar Mullen, Leipzig, 1863; t. xiv, 112, et dans l'Homœopatische Arzneimittellehre aller in den Jahren 186)-62 geprüften Mittel von Dr G.-O. Kleinert, Nordhausen, 1863, t. m, p. 479.

[»] d'Allemagne, d'Angleterre, d'Amérique et d'Italie ne tarirent pas d'éloges sur les vertus

[»] incomparables de cette panacée. On l'appliqua, en effet, aux septicémies, puis à toutes les » fièvres spécifiques, éruptives, typhiques; puis aux fièvres symptomatiques des inflamma-

[»] tions, et finalement au rhumatisme articulaire fébrile.

[»] An milieu de ces merveilles innombrables et des affirmations les plus hardies, j'entrepris,

n dès le mois de novembre 1876, de soumettre les faits à une critique sévère, et de faire pas-» ser toutes les assertions, toutes les statistiques par le contrôle de l'expérimentation à la

[»] fois chimique et physiologique. Ces recherches me conduisirent à la négation de bien des » opinions hasardées, mais aussi à des applications nouvelles.... »

lci encore les allopathes finissent par où ils auraient dû commencer.

⁽¹⁾ Trousseau et Pidoux, « Traité de thérapeutique » 1858, f. 1, p. 244.

⁽²⁾ Trousseau et Pidoux, « Traité de thérapeutique » 1853, t. 1, p. 9.

C'est parce que cela est parfaitement absurde qu'il est absurde aussi de soutenir que l'action de l'arsenie blanc est identique à l'action de l'arsenie proprement dit, de l'hydrogène arsénié, de l'acide arsénique, des arsénites, des arséniates, des biarséniates, du chlorure, de l'iodure, du sulfure, du bisulfure (réalgar), du trisulfure (orpiment) d'arsenic, etc.

Les allopathes ont assez longtemps erré en cette matière pour que nous puissions espérer que prochainement un professeur Gubler quelconque, après avoir parcouru les écrits de Hahnemann ou... par intuition, découvrira que les substances médicamenteuses n'ont pas nécessairement les mêmes propriétés physiologiques que leurs dérivés. Les confrères — je pourrais dire les compères — fermeront les yeux sur cette même découverte faite il y a trois quarts de siècle par Hahnemann, et la mémoire de notre Maître sera vilipendée avec une ardeur nouvelle. Ne leur rappelle-t-il pas le

Monstrum horrendum, informe, ingens, cui lumen ademptum!

Je distinguerai dans mon Étude analytique de l'action pathogénétique de l'arsenic et du phosphore, les troubles physiologiques qui se manifestent dans l'intoxication aiguë, de ceux qui se produisent dans l'intoxication chronique. Il est certain que quand un agent médicamenteux est pris régulièrement et pendant longtemps, son activité physiologique est autre que quand il est pris accidentellement et d'une manière tout à fait passagère. Dans mes Tableaux pathogénétiques, j'indiquerai ces distinctions pour les empoisonnements par voie gastrique. Si je n'avais craint de trop multiplier les colonnes de ces Tableaux, j'aurais établi la même division pour les intoxications par voie cutanée, par voie veineuse, par voies respiratoires, etc.; mais le nombre plus restreint de ces observations rendra toujours cette distinction assez faeile.

Je rechercherai la différence des accidents morbides selon la voie d'administration de l'arsenic ou du phosphore. Il est incontestable que l'action des agents médicamenteux varie suivant les canaux d'absorption. Ainsi, par exemple, le mercure métallique pris à l'intérieur agit tout autrement que le mercure métallique absorbé par les voies respiratoires ou les voies cutanées. Aujourd'hui, certains médecins allopathes acceptent parfaitement les enseignements de l'école hahnemannienne au sujet de la nécessité d'établir les différences d'action des médicaments selon que l'administration de ces agents se fait par voie gastrique, par voie veineuse ou sous-cutanée, par voie cutanée, par voie rectale, par voie vaginale, par voies respiratoires ou par voie olfactive. M. Bouvier, un des adversaires de notre école, adhère implicitement à ce principe, lorsqu'il dit en pleine Académie nationale de médecine de Paris:

- « Est-il rien qui démontre mieux que l'histoire de la nécrose phospho-» rique le véritable caractère de notre science, si claire, si positive dans
- » tout ce qui dérive de l'observation et de l'expérience, si incertaine, si » aveugle, si inhabile à devancer les faits, dans tout ce qui n'est basé que

» sur les raisonnements a priori? Vers 1835, une nouvelle industrie est
» créée; des flots de vapeurs phosphorées vont inonder les organes de
» malheureux ouvriers, hommes, femmes, enfants. Que va-t-il arriver?
» Nnl ne le sait; on ne le soupçonne même pas; toutes les données de la
» science sont impuissantes à le prévoir. Et cependant on connaissait l'ac» tion du phosphore sur l'organisme; on connaissait les effets toxiques de
» son introduction dans l'estomac, dans les sércuses, dans les veines.
» Mais c'est que, de même qu'il n'a pas suffi de savoir l'action de l'éther
» avalé pour se donter des merveilleuses propriétés des vapeurs éthérées,
» de même les notions acquises sur le phosphore n'apprenaient rien tou» chant les terribles ravages qu'allaient exercer les vapeurs phospho» rées (1). »

Les auteurs des traités classiques de matière médicale, de thérapeutique et de toxicologie, MM. Trousseau et Pidoux, Tardieu, Hermann, Naunyn, etc., ont adopté la manière de voir de notre maître et décrivent séparément l'action des agents médicamenteux, selon que l'administration se fait par voie gastrique, par voie veineuse ou par voie cutanée. Mais, comme toujours, ils oublient d'indiquer l'auteur de cette importante réforme.

J'établirai, enfin, quels sont les troubles physiologiques et les lésions anatomiques observés dans les expérimentations sur les animaux, et ici encore je différencierai ces troubles selon que les agents médicamenteux auront été administrés par voie gastrique, par voie veineuse, par voie cutanée ou par voies respiratoires. Non pas que je répudie ce que Hahnemann a écrit pour infirmer la valeur des expériences faites sur les animaux. Mais sans admettre qu'il soit possible et légitime de conclure de l'homme à l'animal, on peut parfaitement tirer profit des expériences tentées sur les animaux quand les résultats sont confirmatifs « des symptômes, des signes et des changements » anatomiques constatés chez l'homme sain.

Les nombreux troubles fonctionnels et anatomiques qui sont produits par l'arsenic et le phosphore seront classés suivant un ordre différent de celui qu'a suivi Hahnemann (2), et plus en rapport, croyons-nous, avec les

⁽¹⁾ Bouvier, in « Bull. Ac. méd. Paris, » t. XXV, p. 1033.

⁽²⁾ Voici l'ordre de classement observé par Hahnemann dans la description des troubles physiologiques des médicaments :

Vertige, obnubilation ou offuscation de la tête, défaut d'intelligence, de mémoire, mal de tête interne, externe, front, cuir chevelu;

Visage en général (Vul!us), yeux et visage (visus), oreille, ouïe (articulation de la mâchoire), nez, odorat, lèvres, menton, machoire inférieure (glandes sous-maxillaires):

Dents, langue (vices de la parole), salive, intérieur du cou, arrière-gorge, pharynx, œso-phage;

Goût, rapports, soda, hoquet, mal de cœur, vomissement, envie de manger et de boire [a], faim, creux de l'estomac, estomac;

[[]a] La soif se trouve quelquefois après le hoquet, et revient aussi en partie plus bas, avec la fièvre.

données de la physiologie. Ce classement plus scientifique rendra les recherches très-rapides, très-faciles et plus complètes.

Voici les principales lignes de cette classification :

4° Vie de relation.

- A. Organes centraux et périphériques de la vie de relation :
 - 4º Troubles physiologiques des organes centraux et périphériques de la vie de relation et de leurs appareils protecteurs :
 - A. Symptômes de l'intelligence;
 - B. Symptômes des facultés affectives et morales ;
 - C. Symptômes : 1º généraux de la sensibilité générale ; 2º locaux de la sensibilité générale ;
 - D. Symptômes : 1º généraux de la motilité ; 2º locaux de la motilité.
 - 2º Lésions anatomo-pathologiques des organes centraux et périphériques de la vie de relation et de leurs appareils protecteurs :

Lésions anatomo-pathologiques: A. du cerveau et des méninges encéphaliques; B. de la moëlle épinière et des méninges rachidiennes: C. des nerfs; D. des muscles; E. des os et F. des articulations.

B. Organes des Sens:

1º Appareil de la vision :

A. Troubles physiologiques de l'œil et de ses organes protecteurs: Symptômes: 1º sensoriels; 2º (a. généraux et b. locaux) de la sensibilité générale; 3º (a. généraux et b. locaux) de la motilité; 4º des sécrétions et 5º de la circulation.

Abdomen, épigastre, région hépatique, hypochondres [b] (région au-dessous des côtes), hypogastre, région lombaire [c], aînes, anneau inguinal;

Rectum, anus, périnée, selles ;

Urine, vessie, urèthre;

Parties génitales, appétit vénérien, facultés génitales, pollutions :

Règles, écoulement par le vagin;

Éternûment, coryza, catarrhe, enrouement, toux :

Haleine, poitrine;

Mouvement du cœur :

Région du sacrum, vertèbres lombaires, dos, omoplates, nuque, extérieur du con [d];

Epaules (aisselles), bras, mains;

Hanches, bassin, fesses, cuisses, jambes, pieds;

Affections générales du corps et maladies cutanées ;

Accidents qui surviennent en plein air;

Transpiration, température du corps, paroxysmes, spasmes, paralysie, faiblesse, syncope; Bâillement, envie de dormir, somnolence, sommeil, affections nocturnes, rêves;

Fièvre, froid, chaleur, sueur;

Anxiété, battements de cœur [e], agitation [f], tremblement;

Changements de caractère, maladies de l'âme.

[b] Quelquefois on les trouve avec la poitrine.

[c] Parfois elle est comprise dans la région du dos et des vertèbres lombaires ;

[d] L'extérieur du cou vient quelquefois après la mâchoire inférieure.

[e] Les battements de cœur sans anxiété sont ordinairement relatés parmi les symptômes de la poitrine.

[f] L'agitation purement corporelle, à laquelle l'esprit ne prend aucune part, se trouve la plupart du temps parmi les affections générales ou communes du corps .

B. Lésions anatomo-pathologiques de l'œil et de ses organes protecteurs :

Lésions: 4° des yeux; 2° des paupières et 3° de l'appareil lacrymal.

2º Appareil de l'audition :

A. Troubles physiologiques de l'oreille et de son appareil accessoire :

Symptômes: 1° sensoriels; 2° (a. généraux et b. locaux) de la sensibilité générale; 3° des sécrétions et 4° de la circulation.

B. Lésions anatomo-pathologiques de l'oreille et de son appareil accessoire.

3º Appareil de l'olfaction:

A. Troubles physiologiques des organes de l'olfaction :

Symptômes: 1° sensoriels; 2° (a. généraux et b. locaux) de la sensibilité générale; 3° des sécrétions et 4° de la circulation.

B. Lésions anatomo-pathologiques des organes de l'olfaction.

4º Appareil de la gustation:

A. Troubles physiologiques des organes de la gustation :

Symptômes : 1° sensoriels; 2° de la sensibilité générale; 3° de la motilité et 4° de la circulation de la langue.

B. Lésions anatomo-pathologiques de la langue.

5º Appareil du toucher :

Symptômes sensoriels (voir Appareil cutané).

2º VIE ORGANIQUE.

A. Appareil de la circulation:

1º Troubles physiologiques de l'appareil de la circulation :

Symptômes: a. de la nutrition générale; b. de la circulation; c. du sang; d. du cœur; e. des artères; f. des veines; g. des capillaires; h. du canal thoracique et des vaisseaux lymphatiques.

2º Lésions anatomo-pathologiques de l'appareil de la circulation :

Lésions: a. du sang; b. du cœur; c. des artères; d. des veines; e. des capillaires; f. du canal thoracique et des vaisseaux lymphatiques.

B. Appareil de la respiration :

1º Troubles physiologiques de l'appareil de la respiration :

Symptômes: a. du mouvement respiratoire; b. du besoin respiratoire; c. de la sensibilité respiratoire; d. du bruit respiratoire; e. de la toux; ſ. des sécrétions; g. de la circulation dans les organes respiratoires et h. de la voix.

2º Lésions anatomo-pathologiques de l'appareil de la respiration: Lésions: a. du larynx; b. de la trachée-artère; c. des bronches; d. des poumons; e. des plèvres; f. du diaphragme et g. de la glande thyroïde.

C. Appareil de la nutrition :

1º Symptômes de l'instinct alimentaire;

2º Troubles physiologiques et anatomo-pathologiques: a. de la

bouche; h. des gencives; c. des dents; d. des glandes salivaires;

- 3° Troubles physiologiques et anatomo-pathologiques: a. du pharynx et b. des amygdales.
- 4º Troubles physiologiques et anatomo-pathologiques de l'æsophage.
- 5º Troubles physiologiques et anatomo-pathologiques de l'estomac:

A. Symptômes de l'estomac :

- Symptômes: 1. dyspeptiques; 2. anacathartiques; 3. de sensibilité gastrique; 4. de distension gastrique et 5. de rétraction gastrique.
- B. Lésions anatomo-pathologiques de l'estomac.
- 6° Troubles physiologiques et anatomo-pathologiques de l'intestin :

A. Symptômes de l'intestin:

- Symptômes: 1. cathartiques; 2. de sensibilité intestinale; 3. de distension abdominale; 4° de rétraction abdominale; 5° action sur les vers intestinaux.
- B. Lésions anatomiques: 1° du duodénum; 2° du jéjunum; 3° de l'iléon; 4° du cœcum; 5° du colon; 6° du rectum; 7° de l'anus et 8° du péritoine.
- 7º Troubles physiologiques et anatomo-pathologiques du foie.
 - A. Symptômes : 1° de la sensibilité du foie, 2° de la sécrétion biliaire.
 - B. Lésions anatomiques : 1° du foie, 2° des conduits biliaires, et 3° de la bile.
- 8° Troubles physiologiques et anatomo-pathologiques de la rate.
- 9° Lésions anatomiques du pancréas et des glandes abdominales.
- 10° Lésions anatomo-pathologiques du diaphragme.
- 11º Lésions anatomiques de la veine-porte et des vaisseaux hémorrhoïdaux.
- D. Appareil de l'urination :
 - 1º Troubles physiologiques de l'appareil de l'urination.

Symptômes: a. des reins; b. de la vessie; c. de l'urèthre; d. de la sécrétion urinaire; e. de l'émission urinaire.

- 2º Lésions anatomo-pathologiques : a. des reins; b. des bassinets et des urethères; c. de la vessie et d. de l'urèthre.
- E. Appareil de la génération :
 - 1° Chez l'homme:
 - A. Symptômes: 1° de l'instinct génésique; 2° du pénis, des testicules et du scrotum.
 - B. Lésions anatomo-pathologiques : 1° du pénis ; 2° des testicules et 3° du scrotum.
 - 2º Chez la femme:
 - A. Symptômes: 1° de l'instinct génésique; 2° des fonctions génitales; 3° de la matrice; 4° des ovaires, 5° du vagin; 6° de la vulve; 7° des seins; 8° du fœtus.
 - B. Lésions anatomo-pathologiques: 1° de la matrice; 2° des ovaires;

3º du placenta, de l'amnios et du fœtus ; 4º du vagin ; 5º de la vulve, et 6º des seins.

F. Appareil cutané:

1º Troubles physiologiques de la peau :

Symptômes: a. dystrophiques; b. de la sensibilité générale; c. sensoriels, et d. des sécrétions de la peau.

2º Lésions anatomiques : a. générales, et b. locales de la peau.

Je donne en note la classification entière avec les développements que comporte chaque subdivision (1).

C'est suivant cet ordre anatomo-physiologique que je décrirai les séries

(1) Voici cette classification:

1° VIE DE RELATION

A. ORGANES CENTRAUX ET PÉRIPHÉRIQUES DE LA VIE DE RELATION:

1. TROUBLES PHYSIOLOGIQUES DES ORGANES CENTRAUX ET PÉRIPHÉRIQUES DE LA VIE DE RELATION ET DE LEURS APPAREILS PROTECTEURS :

A. TROUBLES DE L'INTELLIGENCE:

- 1. Symptômes de l'intelligence (exaltation intellectuelle, erreur, manie, folie...);
- 2. Symptômes de la conscience de soi (inattention, étourdissement, apoplexie, syncope, sidération ...) (1);
- 3. Symptômes de l'imagination (exaltation de l'imagination, délire...);
- 4. Symptômes de la perception (hallucinations, visions, carphologie...);
- 5. Symptômes de la mémoire (exaltation de la mémoire, dépression, perversion...);
- 6. Symptômes de la parole (loquacité, aphasie, mutisme, substitution erronée de mots...);
- 7. Symptômes du sommeil (insomnie, somnolence, coma...);
- 8. Symptômes onéirotiques (rêves morbides...).

B. TROUBLES DES FACULTÉS AFFECTIVES ET MORALES:

- 1. Symptômes du moral (tristesse, crainte, découragement, apathie, colère...);
- 2. Symptômes de l'instinct (haine, jalousie, indifférence...);
- 3. Symptômes de la volonté (ambition...).

C. TROUBLES DE LA SENSIBILITÉ GÉNÉRALE :

- a. Troubles généraux de la sensibilité générale :
- 1. Symptômes du sentiment du bien-être (bien-être, malaise, illusions ou perversion de la sensibilité générale, hypochondrie...);
- 2. Symptômes de la sensibilité générale (hyperesthésie, anesthésie);

⁽¹⁾ Voir le Tableau pathogénétique nº 1 donné plus loin.

d'actions électives produites par l'arsenic et le phosphore sur les divers organes et appareils de l'économie.

A chacune de ces divisions et subdivisions correspondront un bon nombre de troubles fonctionnels ou anatomiques et des variétés de ces troubles.

A côté de chaque manifestation maladive je noterai si le phénomène

- 3. Symptômes algésiques (douleur, névralgie);
- 4. Symptômes de la sensibilité douloureuse et tactile de la peau (analgésie cutanée, dermalgie, troubles et perversion du tact, engourdissement, fourmillement);
 - b. Troubles locaux de la sensibilité générale :
- 1. Symptômes de la sensibilité encéphalique et faciale (céphalalgie, migraine, névralgie de la tête et de la face);
- 2. Symptômes du cou et de la nuque;
- 3. Symptômes du dos, des lombes et de la région sacrée;
- 4. Symptômes de la paroi thoracique ;
- 5. Symptômes de la paroi abdominale;
- 6. Symptômes des membres supérieurs ;
- 7. Symptômes des membres inférieurs ;
- 8. Symptômes de la sensibilité périphérique (voir Symptômes de la sensibilité générale de la peau, ad pag. 64).

D. TROUBLES DE LA MOTILITÉ.

- a. Troubles généraux de la motilité :
- 1. Symptômes de la sensibilité musculaire (lassitude, pandiculation, jactation, anesthésie musculaire, myodynie, crampes);
- 2. Symptômes paralytiques (faiblesse paralytique, paralysie) (1);
- 3. Symptômes d'oscillation musculaire (soubresaut, tressaillement, tremblement);
- 4. Symptômes astasiques ou d'équilibre (vertige, titubation);
- 5. Symptômes ataxiques ou du pouvoir coordinateur des mouvements (tic, mouvements choréiques, ataxie locomotrice);
- 6. Symptômes convulsifs (convulsions, spasmes, éclampsie, épilepsie);
- 7. Symptômes tétaniques (contracture, tétanos);
 - b. Troubles locaux de la motilité:
- 1. Symptômes de la face ;
- 2. Symptômes du cou et de la nuque;
- 3. Symptômes du dos, des lombes et de la région sacrée;
- 4. Symptômes de la paroi thoracique;
- 5. Symptômes de la paroi abdominale;
- 6. Symptômes des membres supérieurs;
- 7. Symptômes des membres inférieurs.
- 2. LÉSIONS ANATOMIQUES DES ORGANES CENTRAUX ET PÉRIPHÉRIQUES DE LA VIE DE RELATION ET DE LEURS APPAREILS PROTECTEURS :
 - A. Lésions anatomiques du cerveau et des méninges encéphaliques;

⁽¹⁾ Voir le Tableau pathogénétique nº 2 donné plus loin.

morbide a été renseigné par Hahnemann, s'il a été constaté chez l'homme ou chez les animanx, et observé à la suite de l'administration du médicament par voie gastrique, par voie rectale ou vaginale, par voie sous-cutanée ou veineuse, par voies respiratoires ou par voie cutanée.

Pour permettre d'embrasser d'un seul coup d'œil tous les renseigne-

- B. Lésions anatomiques de la moëlle épinière et des méninges rachidiennes;
- C. Lésions anatomiques des nerfs;
- D. Lésions anatomiques des muscles;
- E. Lésions anatomiques des os et des articulations.

B. ORGANES DES SENS:

1. APPAREIL DE LA VISION:

- A. TROUBLES PHYSIOLOGIQUES DE L'OEIL ET DE SES ORGANES PROTEC-TEURS :
 - 4º Troubles sensoriels de l'œil:
 - a. Symptômes dioptriques ou troubles d'accommodation des yeux (myopie, asthénopie, diplopie...);
 - b. Symptômes optiques (éblouissement, bluettes, photophobie, amblyopie, amaurose).
 - 2º Troubles de la sensibilité générale :
 - a. Symptômes de la sensibilité générale des yeux (douleur, névralgie);
 - b. Symptômes de la sensibilité générale: 1° des muscles de l'œil; 2° des paupières, et 3° de l'appareil lacrymal.
 - 3º Troubles de la motilité :
 - a. Symptômes de la motilité de l'Iris (myose, mydriase);
 - b. Symptômes de la motilité du globe oculaire (strabisme, convulsions, tétanos);
 - c. Symptômes de la motilité des paupières.
 - 4º Troubles des sécrétions :

Symptômes de l'appareil lacrymal.

- 5º Troubles de la circulation :
 - A. Hyperémie: a. générale et b. locale de l'œil et de ses organes protecteurs.
 - B. Inflammation : a. générale et b. locale de l'œil et de ses organes protecteurs;
- B. LÉSIONS ANATOMIQUES DES ORGANES DE LA VISION:
 - 1. Lésions anatomiques des yeux;
 - 2. Lésions anatomiques des paupières;
 - 3. Lésions anatomiques de l'appareil lacrymal.

2. APPAREIL DE L'AUDITION:

- A. TROUBLES PHYSIOLOGIQUES DE L'OREILLE ET DES ORGANES ACCESSOIRES DE L'AUDITION.
 - 1. Symptômes sensoriels (bourdonnements, battements, hyperacousie, dysécie.);

ments recueillis, j'ai tracé des tableaux où ces données scientifiques seront méthodiquement consignées dans quinze colonnes :

Première colonne: Indication du trouble fonctionnel on de la lésion anatomo-pathologique.

Deuxième colonne: Hahnemann a-t-il personnellement observé cette manifestation morbide soit dans ses expériences pures sur lui-même,

- 2. Symptômes a. généraux et b. locaux de la sensibilité générale de l'oreille (douleur, névralgie, prurit);
- 3. Sumptômes des séciétions;
- 4. Symptômes de la circulation (hyperémie, inflammation, abcédation...).
- B. LÉSIONS ANATOMIQUES DES ORGANES DE L'AUDITION.

2. APPAREIL DE L'OLFACTION :

- A. TROUBLES PHYSIOLOGIQUES DES ORGANES DE L'OLFACTION :
 - 1. Symptômes sensoriels du nez;
 - 2. Symptômes a. généraux et b. locaux de la sensibilité générale du nez;
 - 3. Symptômes des sécrétions du nez;
 - 4. Symptômes de la circulation.
- B. LÉSIONS ANATOMIQUES DES ORGANES DE L'OLFACTION.

4. APPAREIL DE LA GUSTATION:

- A TROUBLES PHYSIOLOGIQUES DES ORGANES DE LA GUSTATION:
 - 1. Symptômes de la sensibilité générale de la langue ;
 - 2. Symptômes sensoriels;
 - 3. Symptômes de la motilité de la langue;
 - 4. Symptômes de la circulation.
- B. LÉSIONS ANATOMIQUES DE LA LANGUE.

5. APPAREIL DU TOUCHER:

(Voir plus loin: Appareil cutané, symptômes sensoriels, page 64.

2º VIE ORGANIQUE

A. APPAREIL DE LA CIRCULATION:

- B. TROUBLES PHYSIOLOGIQUES DE L'APPAREIL DE LA CIRCULATION :
 - A. Symptômes de la nutrition générale :
 - 1. Assimilation;
 - 2. Désassimilation:
 - 3. Altérations de la nutrition : anémie, hydrémie, pléthore, stéatose...
 - **B.** Symptômes de la circulation :
 - 1. Hyperémie active;
 - 2. Hyperémie passive;
 - 3. Inflammation;
 - 4. Hémorrhagie (interne, externe, diathèse hémorrhagique);
 - 5. Cuanose (par stagnation veineuse et anhématosie);
 - 6. Prostration.

à doses massives, à doses atténuées ou à doses infinitésimales; soit dans des expériences pures faites sous sa direction sur des membres de sa famille ou sur d'autres personnes saines, également à doses massives, à doses atténuées ou à doses infinitésimales; soit encore dans des cas d'intoxication accidentelle ou provoquée, volontaire ou involontaire, aiguë ou chronique, sur des sujets sains ou sur des personnes malades, par voie gastrique, par voies respiratoires ou par voie cutanée?

Troisième colonne: la manifestation morbide a-t-elle été observée par les collaborateurs, les élèves ou les admirateurs de Hahnemann, dans

C. Symptômes du sang:

- 1. Fièvre:
 - a. Fièvres à stades: fièvre éphémère, rémittente, intermittente;
 symptômes rémittents;
 symptômes intermittents;
 - b. Fièvre synoque;
 - c. Fièvre inflammatoire;
 - d. Fièvre adynamique;
 - e. Fièvre lente:
 - f. Fièvre hectique.
- 2. Algidité (syncopale, asphyxique, asthénique, fébrile).
- 3. Frilosité; Froid localisé.
- 4. Frissons.
- 5. Ardeur (chaleur mordicante, chaleur brûlante, ardeur générale on locale.)
- 6. Bouffées.
- 7. Sueurs.
- D. Symptômes du cœur:
 - 1. Battements du cœur accélérés ou ralentis, forts ou faibles;
 - 2. Pulpitations du cœur fortes ou faibles ;
 - 3. Monvements désordonnés du cœur : Battements intermittents; Battements inégaux; Battements irréguliers; Désordre dans les battements;— Suppression ou imperceptibilité des battements du cœur;
 - 4. Battements douloureux du cœur;
 - 5. Symptômes stéthoscopiques du cœur.
- E. Symptômes des artères :
 - 1. Battements artériels ;
 - 2. Pouls: accéléré, ralenti, fort, dur, faible, dicrote, intermittent, inégal, irrégulier, imperceptible; pouls non en rapport avec les battements du cœur.
- F. Symptômes des veines :
 - 1. Battements veineux;
 - 2. Plénitude; action paralysante sur les veines;
 - 3. Inflammations.
- G. Symptômes des capillaires; action paralysante sur les nerfs vaso-moteurs.

des expériences faites sur eux-mêmes ou sur d'autres personnes, à doses massives, à doses atténuées ou à doses infinitésimales?

Quatrième colonne: Hahnemann a-t-il recueilli ces renseignements dans les écrits des médecins allopathes, ses devanciers ou ses contemporains?

Cinquième colonne: cette manifestation morbide a-t-elle été renseignée

- H. Symptômes du canal thoracique et des vaisseaux lymphatiques;— Inflammation.
- 2. LÉSIONS ANATOMO-PATHOLOGIQUES DE L'APPAREIL DE LA CIRCULATION :
 - A. Sang (ses altérations).
 - B. Cœur (1):
 - 1. Lésions du péricarde ;
 - 2. Épanchements péricardiques ;
 - 3. Lésions du muscle du cœur;
 - 4. Lésions de l'endocarde ;
 - 5. Sang contenu dans les cavités du cœur.

G. Artères:

- 1. Lésions des gros troncs et des valvules ;
- 2. Lésions des artères.
- **D**. Veines:
 - 1. Lésions des gros troncs
 - 2. Lésions des veines.
- E. Lésions des capillaires.
- F. Lésions du canal thoracique et des vaisseaux lymphatiques.

R. APPAREIL DE LA RESPIRATION:

- 1º TROUBLES PHYSIOLOGIQUES DE L'APPAREIL DE LA RESPIRATION:
 - A. Symptômes du mouvement respiratoire :
 - 1. Respiration à rhythme accéléré (respiration haletante ou anhélation; essoufflement...);
 - 2. Respiration à rhythme ralenti (respiration ample, profonde...);
 - 3. Respiration à rhythme désordonné:
 - a. Respiration suspirieuse;
 - b. Respiration saccadée;
 - c. Respiration interrompue, entrecoupée;
 - d. Respiration intermittente;
 - e. Respiration inégale.
 - 4. Soupirs;
 - 5. Bàillement;
 - 6. Hoquet.
 - B. Symptômes du besoin respiratoire:
 - 1. Diminution du besoin de respirer (respiration facilitée);
 - 2. Détresse respiratoire (respiration difficile);
 - 3. Oppression (avec ou sans dyspnée);

⁽¹⁾ Voir le Tableau pathogénétique nº III donné plus loin.

par d'autres médecins allopathes dans des travaux sur l'action générale de ces substances médicamentenses?

Sixième colonne : cette manufestation morbide a-t-elle été observée chez l'homme : dans des cas d'intoxication aiguë par voie gastrique ?

Septième colonne: dans des cas d'intoxication chronique par voie gastrique?

Huitième colonne: dans des cas d'intoxication par voie vaginale ou rectale? *Neuvième colonne*: dans des cas d'intoxication par injection veineuse on sous-entanée?

Dixième colonne : dans des cas d'intoxication par voies respiratoires ?

- 4. Dyspnée;
- 5. Asthme:
- 6. Suffocation;
- 7. Asphyxie;
- 8. Apnée.
- C. Symptômes de la sensibilité respiratoire :
 - 1º Respiration douloureuse;
 - 2º Respiration anxieuse.
- D. Symptômes du bruit respiratoire:
 - 1º Symptômes subjectifs, entendus à distance:
 - a. Ronflement;
 - b. Sifflement nasal; sifflement trachéal (ou inspiratoire); sifflement pulmonaire (ou expiratoire);
 - c. Râlement;
 - d. Gémissement.
 - 2º Symptômes objectifs, entendus par l'auscultation.
- E. Symptômes de la toux;
- F. Symptômes des sécrétions des voies respiratoires : Expectoration ;
- G. Symptômes de la circulation dans les organes respiratoires; Hémorrhagie;
- H. Symptômes de la voix.
- 2. LÉSIONS ANATOMO-PATHOLOGIQUES DE L'APPAREIL DE LA RESPIRATION :
 - A. Lésions anatomiques du larynx.
 - B. Lésions anatomiques de la trachée-artère.
 - C. Lésions anatomiques des bronches.
 - D. Lésions anatomiques des poumons.
 - E. Lésions anatomiques des plèvres.
 - F. Lésions anatomiques du diaphragme.
 - G. Lésions anatomiques de la glande thyroïde.

C. APPAREIL DE LA NUTRITION :

- 4. SYMPTOMES DE L'INSTINCT ALIMENTAIRE :
 - A. Faim augmentée, diminuée ou pervertic.
 - B. Soif augmentée ou diminuée; hydrophobie.
- 2. TROUBLES PHYSIOLOGIQUES ET ANATOMO-PATHOLOGIQUES DE LA BOUCHE:
 - A. Symptômes de la bouche :

Onzième colonne: dans des cas d'intoxication par voie cutanée?

 ${\it Douzième\ colonne}$: dans des expérimentations sur les animaux : par voie gastrique?

Treizième colonne: par voie sous-cutanée ou par voie veineuse;

Quatorzième colonne : par voies respiratoires?

Quinzième colonne : par voie cutanée?

Pour faire comprendre l'importance et l'étendue de ce travail, je reproduirai ici quatre de ces tableaux consacrés à quatre catégories différentes de phénomènes morbides :

- 1º Troubles de la sensibilité générale ;
- 2º Troubles de la motilité;
- 3º Troubles des sécrétions.
- B. Lésions anatomo-pathologiques de la bouche.
- C. Symptômes des gencives.
- D. Lésions anatomiques des gencives.
- E. Symptômes des dents.
- F. Symptômes et lésions des glandes salivaires.
- 3. TROUBLES PHYSIOLOGIQUES ET ANATOMO-PATHOLOGIQUES DU PHARYNX:
 - A. Symptômes de la gorge:
 - 1º Troubles de la sensibilité générale;
 - 2º Troubles de la motilité ;
 - 3º Troubles des sécrétions.
 - B. Lésions anatomiques du pharynx et des amygdales.
- 4. TROUBLES PHYSIOLOGIQUES ET ANATOMO-PATHOLOGIQUES DE L'OESOPHAGE:
 - A. Symptômes de l'æsophage.
 - B. Lésions anatomiques de l'œsophage.
- 5. TROUBLES PHYSIOLOGIQUES ET ANATOMO-PATHOLOGIQUES DE L'ESTOMAC:
 - A. Symptômes de l'estomac:
 - 1º Symptômes dyspeptiques (indigestion, dyspepsie);
 - 2º Symptômes anacathartiques:
 - a. Nausée:
 - b. Vomiturition;
 - c. Renvois gazeux; éructations ;
 - d. Renvois liquides; pyrosis;
 - e. Réjurgitation;
 - f. Vomissement;
 - g. Hématémèse.
 - 3° Symptômes de la sensibilité gastrique :
 - a. Gastrodynie;
 - b. Cardialgie.
 - 4º Symptômes de distension gastrique (ballonnement ou gastro-pneumatose).
 - 5° Symptômes de rétraction gastrique.
 - B. Lésions anatomo-pathologiques de l'estomac.

Un premier tableau consacré aux troubles physiologiques objectifs ou internes, expose les symptomes de la conscience de soi qui sont du domaine de l'action pathogénétique de l'arsenic.

Le deuxième tableou consacré aux troubles physiologiques subjectifs ou externes, expose les symptomes paralytiques qui sont du domaine de l'action pathogénétique de l'arsenic.

Le troisième tableau, consacré aux lésions anatomo-pathologiques inter-

- 6. TROUBLES PHYSIOLOGIQUES ET ANATOMO-PATHOLOGIQUES DE L'INTESTIN:
 - A. Symptômes de l'intestin:
 - 1º Symptômes cathartiques:
 - a. Constipation;
 - b. Diarrhée;
 - c. Hémoentérorrhagie.
 - 2º Symptômes de la sensibilité intestinale :
 - a. Entérodynie et douleurs péritonéales ;
 - b. Entéralgie;
 - c. Douleurs rectales :
 - d. Prurit et ténesme de l'anus.
 - 3º Symptômes de distension abdominale:
 - a. Entéro-pneumatose (flatulence, borborygme, gargouillement);
 - b. Tympanite (tympanite de l'intestin; tympanite du péritoine);
 - c. Ascite.
 - 4° Symptômes de rétraction abdominale.
 - 5º Action sur les vers intestinaux.
 - B. Lésions anatomo-pathologiques de l'intestin:
 - 1º Lésions anatomiques du duodénum;
 - 2º Lésions anatomiques du jéjunum;
 - 3º Lésions anatomiques de l'iléon;
 - 4º Lésions anatomiques du cœcum;
 - 5º Lésions anatomiques du colon;
 - 6º Lésions anatomiques du rectum;
 - 7º Lésions anatomiques de l'anus;
 - 8º Lésions anatomiques du péritoine.
- 7. TROUBLES PHYSIOLOGIQUES ET ANATOMO-PATHOLOGIQUES DU FOIE:
 - A. Symptômes hépatiques :
 - 1º Symptômes de la sensibilité du foie :
 - a. Hépatodynie;
 - b. Ilépatalgie.
 - 2º Symptômes de la sécrétion biliaire.
 - B. Lésions anatomiques du foie, des conduits biliaires et de la bile.
- 8. TROUBLES PHYSIOLOGIQUES ET ANATOMO-PATHOLOGIQUES DE LA RATE :
 - A. Splénodynie.
 - B. Lésions anatomiques de la rate.
- 9. LÉSIONS ANATOMO-PATHOLOGIQUES DU PANCRÉAS ET DES GLANDES ABDO-MINALES.

NES, EXPOSE LESIONS ANATOMO-PATHOLOGIQUES DU C'EUR ET DE SES ENVE-LOPPES INTERNE ET EXTERNE.

Le quatrième tableau, consacré aux lésions anatomo-pathologiques externes, expose les lésions anatomo-pathologiques de la peau.

Pour donner la clé de ces tableaux pathogénétiques, prenons au hasard

- 10. LÉSIONS ANATOMO PATHOLOGIQUES DU DIAPHRAGME.
- 11. LÉSIONS ANATOMO-PATHOLOGIQUES DE LA VEINE-PORTE ET DES VAISSEAUX HÉMORBHOÏDAUX.

D. APPAREIL DE L'URINATION:

- 1º TROUBLES PHYSIOLOGIQUES DE L'APPAREIL DE L'URINATION.
 - A. Symptômes des reins (néphrodynie, néphralgie);
 - B. Symptômes de la vessie;
 - C. Symptômes de l'urèthre;
 - D. Symptômes de la sécrétion urinaire :
 - 1º Couleur de l'urine ;
 - 2º Odeur de l'urine ;
 - 3º Acidité de l'urine :
 - 4º Alcalinité de l'urine ;
 - 5º Oligurie;
 - 6º Anurie;
 - 7º Diurie; polyurie;
 - 8º Glycosurie;
 - 9º Inosurie:
 - 10º Azoturie;
 - 44º Albuminurie;
 - 12º Hématurie;
 - 13º Lipurie (urines graisseuses).
 - E. Symptômes de l'émission urinaire.
- 2. LÉSIONS ANATOMO-PATHOLOGIQUES DE L'APPAREIL DE L'URINATION.
 - A. Lésions anatomiques des reins.
 - B. Lésions anatomiques des bassinets et des urethères.
 - C. Lésions anatomiques de la vessie.
 - **D**. Lésions anatomiques de l'urèthre.

E. APPAREIL DE LA GÉNÉRATION:

- 1. CHEZ L'HOMME :
 - A. Symptômes de l'instinct génésique.
 - B. Symptômes du pénis, des testicules et du scrotum (anesthésie, in-flammation...)
 - C. Lésions anatomo-pathologiques du pénis, des testicules et du scro-
- 2º CHEZ LA FEMME :
 - A. Troubles de l'instinct génésique ;
 - **B**. Troubles fonctionnels de la femme :
 - 1º Symptômes de la menstruation;

le symptôme syncope du tableau consacré aux Troubles de la conscience de soi (tableau 1, symptôme nº 32).

Les chiffres 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68 et 69 qui occupent les co-

- 2º Symptômes de la gestation;
- 3º Symptômes de la lactation.
- C. Symptômes de la matrice.
- D. Lésions anatomiques de la matrice.
- E. Symptômes et lésions anatomiques des ovaires.
- F. Lésions anatomiques du placenta, de l'amnios et du fœtus. G. Symptômes et lésions anatomiques du vagin.
- H. Symptômes de la vulve.
- I. Lésions anatomiques de la vulve.
- K. Symptômes et lésions des seins.

F. APPAREIL CUTANÉ.

1º TROUBLES PHYSIOLOGIQUES DE L'APPAREIL CUTANÉ :

- A Symptômes dystrophiques:
 - 1º Turgescence;
 - 2º Emphysème;
 - 3º Edème circonscrit;
 - 4º Anasarque;
 - 5º Obésité;
 - 6º Amaigrissement (avec on sans atrophie).
- B. Symptômes de la sensibilité générale de la peau :
 - 1º Prurit.
 - 2º Douleur.
- C. Symptômes sensoriels de la peau.
- D. Symptômes des sécrétions.
- 2º LÉSIONS ANATOMIQUES DE LA PEAU :
 - A. Lésions cutanées en général :
 - 1º Coloration de la peau Macules;
 - 2º Hémorrhagie;
 - 3º Erythème;
 - 4º Erysipèle;
 - 5º Papules;
 - 6º Urticaire;
 - 7º Squammes;
 - 8º Tubercules;
 - 9º Vésicules (miliaire, eczéma, zona);
 - 40° Bulles, phlictènes;
 - 11º Pustules;
 - 12º Ulcères (1) ;
 - 13º. Abcès, furoncles;
 - 14º Gangrène;
 - 15º Inflammation des glandes sébarées.
 - B. Lésions cutanées localisées dans certaines régions :
 - 4º Lésions cutanées du cuir chevelu et de la face.
 - 2º Lésions cutanées du tronc.
 - 3º Lésions cutanées des membres.

⁽¹⁾ Voir le Tableau pathogénétique nº 4 donné plus loin.

lonnes II, IV, V, VI, VII, XI, XII, XIII et XV sont des numéros de notes qui se rattachent au *Tableau nº 1* et qu'on trouvera au bas de la page (1).

Le chiffre 61 (colonne 2) se rapporte à une indication pathogénétique donnée par Hahnemann, dans son traité *Ueber die Arsenikvergiftung*, et consignée au renvoi n° viii de mon « *Cahier de Renvois ayant trait à l'action physiologique générale de l'arsenic.* »

Le chiffre 62 (colonne 4) se rapporte à une indication pathogénétique empruntée par Hahnemann à des observations recueillies par Forestus dans ses « Opera » et par Buchholz dans ses « Beitrage z. gerichtl. Arzneikunde ». Ce symptôme est rapporté au nº 80 de la pathogénésie arsenicale du « Traité de matière médicale homœopathique » de Hahnemann, Paris, 1877, t. 1, p. 395.

Le chiffre 63 (colonne 5) se rapporte à des indications pathogénétiques fournies par Pierre de Abano, dans son traité « De Venenis; par Cadet de Gassicourt, dans le tome ii du « Dictionnaire des sciences médicales » Paris, Panckoucke, 1812; par Orfila, dans son « Traité de toxicologie » Paris, 1852, et dans la « Gazette des hôpitaux » 1857; par L. Orfila, dans le « Dictionnaire encyclopédique des sciences médicales » Paris, 1867; par Delioux de Savignac, également dans le « Dictionnaire encyclopédique des sciences médicales » 1867; par Tardieu, dans son « Traité de l'empoisonnement » 1867; par A. Wurtz et Willm, dans leur « Dictionnaire de chimie pure et appliquée » Paris 1869, t. I, et par Gubler, dans ses « Commentaires thérapeutiques du Codex » 1868.

Le chiffre 64 (colonne 6) se rapporte à des observations d'intoxication aiguë par voie gastrique décrites par Tardieu, in « Traité de l'empoisonnement » p. 379 (voir mon « Cahier d'Observations d'intoxication arsenicale sur l'homme sain, » observation n° 29); par Barrier in « Journal de médecine » 4783 (voir observation n° 13); par Andral, Rouget et Tardieu, in « Annales d'Hygiène publique » t. xxxvIII (voir observ. n° 126); par Morley, « British medical journal » 1873 (voir observ. n° 150); par Barrier

⁽¹⁾ Notes au nombre de 115 se rattachant au Tableau des troubles de la conscience de soi (Tableau pathogénétique nº 1):

^{1. «} Une femme, après avoir pris de l'arsenic, devint anxieuse, ressentit une faiblesse extrême au point de n'être plus maîtresse de ses idées et de se trouver incapable de fixer son attention sans beaucoup d'efforts; en même temps, elle chancelait. » Hahnemann, « Tr. mat. méd. hom.» 1877, t.1, p. 393, sympt. 21. - 2. «On a la tête étourdie comme si l'on venait de terminer précipitamment de graves affaires; en même temps, inquiétude intérieure (au bout de 2 j.) » Ibid., t. 1, p. 404, sympt. 371. — 3. Renv. 26 Geoghegan. — 4 Obs. 58 BOUTIGNY et BAUDRY. - 5. Obs. 168 ALQUIÉ, BENOIST, BOURELY, BOULICHE et PERGEZ. -6. Obs. 168 Alquié, Benoit, Bourely, Bouliche et Pergez. - 7. Myrrhen, « Misc. nat. cur. » Dec. m, 91, 10. - 8. « Avec confusion d'esprit » Barlett « Chicag. pharmac. » 1872. — Spengler, in « Henke's Zeitschr », t. Lv, 2, 450. — Bodenmüller, in « Franck's magazin » t. 11, p. 39. — 9. Alberti, in Hahnemann, t. 1. p. 405, sympt. 401. - 10. Obs. 168 Alquié, Benoist, Bourely, Bouliche et Pergez. - 11. Obs. 168 Alquié, BENOIST, BOURLLY, BOULICHE et PERGEZ. - 12. «... et perte du sentiment » EBERS, in HAHNEMANN, ibid. t. 1, p. 403, sympt. 400. - 13. Scheulen, in « Casper's Wochenschr. » 1844, p. 372.-14. Stachow, in "Henke's Zeitschr. " t. xxvi, 3, 165.- 15. " Au bout d'une demi-heure ». Hahnemann, ibid. p. 400, sympt. 369. — 16. Renv. 26 Geoghegan. —

« Gazette des hôpitaux » 1843 (voir observ. n° 159); par Orfila et Lespinas, in « Mémoires de l'Académie royale de médecine de Paris » 1841 (voir observ. n° 239) et par Crocq, in « Journal de médecine de Bruxelles » 1852 (voir mon « Cahier d'Observations d'intoxication arsenicale sur l'homme malade », observation n° 101.)

Le chiffre 65 (colonne 7) se rapporte à deux observations médico-légales

17. Obs. 168 Alquié, Benoist, Bourely, Bouliche et Pergez. — 18. Obs. 168 Alquié, Benoist, Bourely, Bouliche et Pergez .- 19. Pearson, in Hahnemann, ibid. t. 1, p 405, sympt. 395. - Pearson, in « Sammlung Br. Abh. für p. Ærzte » 13, iv. - 20. Orfila, «Tr. de toxicologie» 1852, t. 1, p. 418. — 21. « La tête s'embarrasse ». Obs. 43 Desgranges. - 22. « Au bout de 5 j.» Hahnemann, ibid, t. 1. p. 404, sympt. 566. - 23. Hornburg, in Hahnemann, ibid., t. 1, p. 405, sympt. 398. — 24. « Les douleurs causent une telle faiblesse dans la tête avec tant d'affadissement au cœur et de langueur au creux de l'estomac qu'elle est très-malade ». Haunemann, ibid., t. 1. p. 404, sympt. 367. — 25. KAYSER, in HAHNEMANN, ibid., t. 1, p. 403, sympt. 540.—26. Buchholz, in HAHNEMANN, ibid. 1. p. 405, sympt. 396. — 27. Tardieu, « Et. sur l'empoisonnement » 1867, p. 329. -28. " Le malade est hors de lui et ne voit ni n'entend correctement ». Renv. 1 HAHNEMANN. -29. Orfila, « Toxicologie » 1852, t. 1. p. 418. - Renv. 145 Hermann. - Renv. 475 NAUNYN. — 30. « Avec érythème général ». Obs. 263 Newman. — « Avec érythème. » Obs. mal. 47 Girdlestone. — Obs. 22 Guilbert. — Obs. 406 Gendrin. — Obs. 34 Lachèse. - « Les douleurs sont tellement intenses, accompagnées d'anxiété, qu'il se roule par terre, s'abandonne au plus violent désespoir et perd la raison ». Obs. 148 Prt. - 31. Obs. 37 Méan. - 32. Hahnemann. - 33. Kaisen, in Hartlaub u. Trinks, « Reine Arzneimitt. » p. 249. - 34. Pyl., « Sammlung » viii, 98, 105, 108. (Perte de la sensibilité et de la connaissance, de sorte qu'on ne sait ce qui se passe autour de soi). - « Perte de la connaissance et des sens externes et internes; on ne voit pas, et pendant plusieurs jours, ne dit, n'entend et ne comprend rien, si l'on crie très-haut dans les oreilles du sujet, il regarde ceux qui l'entourent comme un homme ivre qui sort d'un profond sommeil ». Mongagni in Hahne-MANN, t. I, p. 405, sympt. 327. — 35. « Affaiblissement du sensorium ». Renv. 27.) SKRZECZKA. -36. Obs. 22 GUILBERT. - Obs. 45 BARNIER. (Chez quatre personnes, quelques heures après l'intoxication). — Renv. 270 Skrzeczka. — 37. Renv. 1 Hahnemann. — Renv. 8 Hahnemann. — Hahnemann, sympt. — 38. Obs. 256 Myrrhen — « Eph. nat.cur.» dec. 3, an. 9 et 10, p. 590. — Morgagni in « Hahnemann », sympt. 327. — 39. Obs. 256 Myrrhen. -40. « Eph. nat. cur. » dec. 3, an. 9 et 10, p. 390, -41. « Ils perdent l'usage des sens externes et des facultés intellectuelles ». Obs. anim. 73. Jægen. —42. Obs. anim. 73 Jegen. — 43. Obs. 34 Lachèse. — 44. « Chez quatre personnes, quelques heures après l'intoxication ». Obs. 13 Barrien. — Obs. 148 Pyl. — 45. Obs. malad. 44 Magnus Iluss. —46. Obs. 153 Roget. — 47. Renv. 270 Skrzeczka. —48. Renv. 2 Нанке-MANN. - 49. (Moins de dix minutes après l'ingestion). Obs. 38 Lachèse. - 50. Obs. 5 De Plasse et Coppée. -51. « Accès de convulsions ; d'abord on étend un bras, puis on perd connaissance, restant étendu comme un mort, pâle, mais la surface du corps conservant sa chalenr, les pouces sont serrés, les bras tordus, les poings fermés; les bras sont ensuite levés, puis baissés lentement; au bout de dix minutes la bouche remue dans tous les sens comme si la machoire branlait; enfin, la respiration reste insensible. Au bout d'un quart d'heure, l'accès se termine par une violente secousse de tout le corps, comme si l'on avait reçu un coup porté sur les pieds et les mains; la connaissance revient aussitôt, mais il reste une faiblesse extrême (chez une femme) ». Hahnemann, p. 393, sympt. 57.—52. Renv. 2 HAHNEMANN. — 53. Obs. 155 ROGET. — 54. HAHNEMANN. — 55. EBERS, Obs. 255. — 56. Ebers, Obs. 255.-57. «Vertige. Les idées se perdent quand on se redresse ». Stapf, in Hahnemann, t. 1, p. 405, sympt. 413.-58. Renv. 270 Skrzeczka.-59. "Eph. nat cur. " in Hahnemann. — 60. Hahnemann, t. 1, p. 401, sympt. 293.—61. Renv. 8 Hahnemann. — 62. Forestus, in Hahnemann, t. 1, p. 395, sympt. 80.—Buchholz, ibid. — 63. "... des lipothymies, des syncopes ». Renv. 186 Delioux de Savignag. - Renv. 189 Delioux de Savi

d'intoxication arsenicale chronique par voic gastrique observées par MM. De Plasse et Coppée (voir observations n° 3 et 23), et à une indication pathogénétique générale fournie par A. Tardieu dans son *Traité de l'empoisonnement*, 1867, p. 331.

Le chiffre 66 (colonne n° 41) se rapporte à des observations d'intoxication par voie cutanée décrites par Mean, dans la « Bibliothèque médicale » t. lxxiv (voir observ. n° 97) et par Angelo Sala dans son « Ternar. Bezoard. »

Les chiffres 67, 68 et 69 (colonnes nos 12, 13 et 15) se rapportent à des

gnac. - Reny. 207 Cadet de Gassicourt. - P. de Abano in Reny. 215. - Reny. 235 Orfila. - Renv. 218 L. Orfila. - Renv. 222 Gubler. - Tardieu, « Tr. de l'empoisonnement » Paris 1867, p. 328. - Renv. 88 Orfila. - Renv. 271 A. Wurtz et Willin. --64. Obs. 29 Tardieu, « Avec diarrhée et vomissements dès le début ». - Obs. 13 Barrier. - Obs. 126 Rouget, Andral et Tardieu. - Obs. 150 Morley. - Obs. 159 Barbier. -Renv. 271 Wurtz et Willm. — Obs. 259 Lespinas et Orfila. — Obs. malad. 101 Crocq. — 65. Obs. 3 De Plasse et Coppée. - Obs. 23 De Plasse. - Tardieu, « Empoisonnem. » 1867, p. 551. -66. "Deliquium animi ". Obs. mal. 73 Ang. Sala. - Obs. 97 Mean. -67. "... plus on moins répétée». Obs. anim. 76 Sмгн. — 68. Obs. anim 76 Sмгн. — 69. Obs. anim. 76 Smith. - 70. Obs. 253 De Jaeguere et Van Meenen. - 71. Obs. 97 Méan. -72. Morgagni, in Hahnemann, t. 1, p. 395, sympt. 94. — Guildent, ibid., sympt. 94. — Sennert, ibid. p. 396, sympt. 118. - 73. «... avec faiblesse du pouls ». Fernel, in Hahne-MANN, t. 1, p. 395, sympt. 81. - 74. Renv. 124 Novati. - 75. Obs. 29 Tardieu. - Obs. 126 TARDIEU. - 76. Obs. 190 TIMŒUS'A GULDENKLEE. - 77. Obs. 97 MÉAN. - 78. Obs. anim. 76 Smth. — 79. Obs. anim. 76 Smth. — 80. Obs. anim. 76 Smth. — 81 Renv. 8 HAHNEMANN. -82. A. GAUTIER, in a Annal. hyg. publ. 3 1876, t. xlv, p. 159. - Reny, 186 Delioux de Savignac. - Reny, 189 Delioux de Savignac. - Reny, 207 CADET DE GASSICOURT. - « Défaillance ». Renv. 222 Gubler. - Tardieu, « Tr. de l'empoisonnement » p 528. — Renv. 107 Decaisne. — 83. Obs. 16 Aguillon. — Obs. 153 ROGET. - Obs. 230 SCHWABE. - Obs. 239 LESPINAS et ORFILA. - Obs. 234 CHAP-PUIS. - 84. «...avec diarrhée ». Obs. 5 De Plasse et Coppée. - «...avec coliques ». Obs. 4 De Plasse et Coppée. — 85. Renv. 281 Proust. — 86. Obs. 43 Desgranges. — Obs. 37 Mean. - Obs. 332 Wepfer. - Tardieu, « Et. sur l'empoisonnem. », p. 352. -Renv. 281 Proust. - 87. Tardieu, « Et. sur l'empoisonnement », 1867, p. 329. -88. Friedrich, in Hahnemann, t. 1, p. 403, sympt. 324. -89. Verzasch, in Hahnemann, t 1, р 403, sympt. 343. — 90. Наниемани, t. 1, p. 393, sympt. 50. — 91. Tardieu « Et. sur l'empoisonnement », 1867, p. 328. — 92. (pendant cinq jours). Obs. 22 Guilbert. -93. Renv. 271 Wurtz et Willm. - 94. Obs. 233 Laure. - 95. Tardieu, « Et. sur l'empois. » 1867, p. 328. — Renv. 88 Orfila. — 96. Obs. 228 Chaussier. — Obs. Laborde, in Renv. 255 Orfila. — Renault, in Renv. 255 Orfila. — Renv. 37 Orfila. - C. Renault, « Recueil périod. soc. médec. » t. xII, p. 94. - 97. (Voie vaginale). Obs. 81 Brisken. - 98. Obs. 9 De Plasse et Coppée. - 99. Obs. 29 Tardieu. -100. Obs. 97 Méan. -- 101. Obs. 3 De Plasse et Coppée. -- 102. Obs. 4 De Plasse et Coppée. -103. Obs. 9 De Plasse et Coppée. -104. Obs. 153 Roget. - 105. Renv. 8 Hah-NEVANN. - HEPP, in Renv. 227 Hirtz. - « Anéantissement de toutes les fonctions vitales ». Renv. 129 C. James. - Renv. 173 Naunyn. - 106. a... dès les premiers jours allant en augmentant ». Obs. 197 Grohe et Mosler. — 107. Hepp, in Renv. 227 Hiriz. — 108. Obs. 81 Brisken. - 109. Renv. 129 C. James. - 110. (Voie vaginale). Obs. 81 Brisken. -111. Renv. 8 Hahnemann. - « Ueber die Arsenikvergiftung », 1786, p. 73 et 75. -112. Mezgen « Gericht. med. Beobacht. » Kænigsberg, 1778, t. 1.-113. Hebendeen, in Obs. anim. 95. — Renv. 132 Mojon. — 114. Obs. 364 Delioux de Savignac. — Obs. 414 Mezger. - 115. Obs. anim. 95 Heberdeen.

expérimentations instituées sur des animaux par Smith et relatées dans sa « Dissertation inaugurale sur l'usage et l'abus des caustiques » Paris, 1815.

Exposons maintenant la substance de ces quatre tableaux pathogénétiques de l'arsenic.

Le Tableau nº 1 consacré à des troubles physiologiques objectifs ou internes détermine, d'après les nombreuses observations que j'ai recueillies et que j'indique à chaque ligne (1), quels sont dans l'état actuel de la science les symptômes de la conscience de soi, essentiellement propres à l'action pathogénétique de l'arsenic. Et par « conscience de soi » j'entends le sentiment des rapports qui s'établissent entre le sujet et l'objet, entre le « moi » et le « non-moi ». Ce sentiment s'appelle « attention » ou « connaissance » s'il se porte au dehors vers les objets; il s'appelle « conscience de l'existence » s'il se porte à l'intérieur vers le sujet.

Je ne comprends pas dans ce *Tableau* les « symptômes du sommeil » et le « somnambulisme », états dans lesquels il y a cependant abolition absolue de cette faculté, ni ceux de l' « exaltation de la conscience de soi, » ni ceux de la « perversion de la conscience de soi. » Tout ce qui a trait à ces troubles physiologiques sera rapporté dans d'autres tableaux (voir plus haut p. 54, le plan de l'ordre anatomo-physiologique que j'ai adopté pour la description de l'action pathogénétique des substances médicamenteuses).

J'expose les symptômes suivants :

1º Dépression de la conscience de soi ;

2º Sentiment de vide dans la tête; — Tête entreprise;

3º Etourdissement, c'est-à-dire sentiment de stupeur passagère, qui donne au malade un air d'étonnement ou d'hébétude ne se dissipant que petit à petit. J'indique diverses variétés d'étourdissement :

a. D'après quelques symptômes concomittants (comme l'impossibilité de penser, les éblouissements, les vertiges, la somnolence....) et b. d'après les conditions de production (.... en allant au grand air, en rentrant dans la chambre, avant de vomir....);

4° Chute soudaine et passagère des forces (avec obnubilation des sens et de l'intelligence, et affaiblissement de la respiration et de la circulation);

5° Lipothymie, ou état dans lequel le sujet est soudainement ou graduellement et incomplétement privé de connaissance, de sensibilité et de mouvement, avec affaiblissement de la respiration et de la circulation;

6° Défaillance, ou état dans lequel le sujet est soudainement ou graduellement et incomplétement privé de connaissance, de sensibilité et de mouvement, avec affaiblissement très-marqué de la respiration et de la circulation;

7º Syncope, ou état dans lequel le sujet est soudainement et complé-

⁽¹⁾ Voir les notes au nombre de 115, reproduites au bas de la page 65.

Symptomes de la conscience de soi l'Tableau

Symptomes de la conscience de smillaneau i.	G	will	eo F	ligoii	logiq	ues e	d an	aton	ro-ha	illale	jujue.	o obo	vez v és	,	
A. Clans le cours de pres de conquante amées. I dans somptimes puis en la nome, a does mossors à does allinerage à does infinitormales.	Λ.	В.	c.	D.	140	91	ale a	, p	2		120	S anic	vite.	, a l	
	_	-	-3 -	3	tings.	on cheening	ragun	pare o	g 10	intrarcation	s che	office so-cut	chez	ches entan	
And the approximations from managers is drove all inverse on as drove infinitesimates: If there droves par les d'unescalain archetell en proque administration mediation approachange and the second part of the second part	Halinemaan	Alaborateuro de Kahnemann	allejathas ertes er Hahmemann	Lautes autents allepuikes	mbreation a	hen che	odion	nionothou par	indespendion respindence	leased c out	expériment ax par coies	oxpériouso x pri vou sos	1011.00E	00000	
B. Il show manner, a deservationness on a shore infinite infinite infinite show the exercise finite on our	Galline	Labora	Cradbe	Spall	nalin	infortation	intoxio rectale	iones		contra core	expéts ex pot	oxpéricu a patroue	night.	expériences uix par ivi	
name on see die personne bein politike (bien over leer verwellene. Die geschen deutschein augest on die vergebinge per von verpaalsevert par von volume. Die gemels dans des dezemptone generalie see Unition physologique de bessen.	par 3	par col	pur all	par il,	hans	port of	dans	10.00 mg	dans	dans	land	lans	dens expériences elle	lane	
2 2 2								-=	١	I	- 6		- 3		
Craffation de la conscience de soi Soir broubles psychiques															
Posocration de la conscience de soi) Dépression de la conscience de soi	/														
Construenced .	2			3	11				5	6					
Courdissement acco impossibilité de penser			2	۶۶.											
Clour dissement a see oblinessements			.9						10	11					
Courdissement avec verliges			12	13											
Clourdissement avec somnolence				14		}									
Consdissement on allant an grand air, s'exacerbant en	15														
- centrant Dans la chambre Chonzdissement précédant le vourissement	10			16		١.			17	18					
La têle est entreprise			19	20					, ,	21					1
La têle est fortement entreprise le soir	22														
Side dans la tête		23													
La conscience de soi-même disparait on est confuse	211	25	26	27											
Perte de connaissance	25			30	30					37					
Porte du sentiment et de la conscience au point qu'il no	.22	22	2//	,.	2/4										
savail plus ce qu'il devenait	l .	33	34	.3.5	36	3.9			40		111	11?			
Absence de l'espect et des seus internes et externes. La perte de connaissance se dissipa asser pour qu'elle put	37		,,,			100			270		-11	7.			1
rendre comple de sa situation					113										1
La perte du sentiment et de la connaissance est passagère					111										
La perte de connaissance persole pendant plusieurs journe															
apiès la cessation des comissements					1.5										
Perte de connaissance persistant pendant plusieurs houres															
après la consation des conoulsions			1		-16					•			,		
Perto de connaissance d'aggravant jusqu'au développement.					1;										
-complet du coma -Perto de connaissance, avec attaques nervouses consulsives gé :					1			,							
nérales	45				1.9	30			ļ						
Perto de connaissance avec convulsions tétaniques	51														
Porte de connaissance an moment de l'invasion des convulsions	32														
Perte de connaissance pendant la durée des convulsions					.3.3										
Forte de connaissance avec tromblement par lout le corps	54		3.5			36				}					
Verte de connaissance avec vertiges		37													l
Officiblissement du sensorium avec vertige et mat de tête Perte de la connaissance et de la parole			3.9		1.5										
Faiblesse de corps et d'esprit, on ne dit rion, mais on n'est pas			100												
de manoaise Rumens	60														
Syncope	61		60	63	64	65				66	6%	68		6.9	
Tyncopes continuelles					10					11					
Tyncopes prolongées			12												-
Syncopes repélées			13	14	15	١.,,			16	12	15	7.9		50	
Paiblesses syneopales	.51			52	8.3	84			55	56					
Wéfallances alternant avec un étal Tagitation et des mou- vements spasmodiques				87											
Anxielé au cour interrompne par des syncopes			SS	07											
Anxieté et tourments qui vont souvent jusqu'à faire tomber															
en syncope			8.9												
Le matin Disposition à la lipothymic avec faiblesse et anxiété	.90														
Frequente faiblesse semblant annoncer à chaque instant															1
to most du malade		1		.97	,00						}				
Syncope comme seul trouble fonctionnel dans un em =				.9.3	.24										
poisonnement mortel				.95	.96										
Syncopes acre convulsions							.0;								
Tyneopes et palpitations du cour au moindre monvement						.25									
Syncopes accompagnant des vomissements et des diareliées,															
Juneanes accompany and the Direct for					,20	,				100					
Tyneopes accompagnant la diarrhée Tyneopes accompagnant des coliques violentes						101									
Syncopes avec tenesme votal et diarrhée						102									
Syncopes avec remission des symptomes qualio intestinana					114	,									
Collapsus	105				106	10%	108				1019				
Collapsus avec convulsions Tidexation							110								
· wettinn	111		112	11.3	11.11						11.5				

(Tablean II)
paralytiques
Symptomes

	1 2010	sanimum pay voic cutch				H	H			25		H	H	H		_												-					_	
. 000	Son	eridosi esion red amounio	-!																													-		-
oboczocio	221123112	and contraster and summer											6.9			S,	.99.														Otto			
- 1	mbriger	שיוייייש במים מים שמים שמים שמים שמים שמים שמים שמ				10				56.				.5.		0%									- · ·	<u></u>	•					11:11		
Pulagi	2212	שמונים ווון טמבים קרים ו	~ %	\$ \$	200			C'H	50						5	0.0				68		105		1	.%						657	vio.		
Jud-c		מינוס ווונסצוכמנוסוו מינס וטוסונמקסוו	1, 10					4		*				3						38							1/2				527	671		
anatomo-pathelogiques		dans informations par																												`	`			
	almin jan	q nalanani anaban vor sadala na vagu	io o																															
neo ch	. 511	morgenti montantanti emp	, ° ,	ž.		50%	36	2.4			છે					2	633	00	ŜŢ.	6)		001) () () () () () () () () () (**	3	207				J. 84 3	1113	11:11	
Coging	- only	dons intercedion and	4 3	5639	To:		500		24		29			1.	162	S.	88			96	001		SW	011	"	011	007		130	132	136	147	15,2	11:7
physiologiques	<u> </u>	par d'autres anteurs allopathes	2 81			0, 0,	25 1/2			0,5	3 6	3 %	80	02/	1	18	\$ 3		66	3		ŏuI	10'		07/		6 6	(0)	19.5		257	941	604	150
	2	var allagather cities	O _t	16				25						1																	13.		18	
Troubles	B.	speriological condition of a	-				S.													16														
22	=	mamming reg	\ \ \					3,2		6.3				2				06													13.3			
Symptomes paracyclques (radicau 11)	A. Aras le cours de près de inquante années : L'ans se expresses purs sui l'univer debatte messoure, des defenues en desse applicamelles L'asse me mendents purs sui se desse se se se se les melles et ce femille et se de desse protectes.	If the control of the	. Rarahysic Sa pandysic du sentiment existe inclée (Victuarthásic) Sa sandsaire evite sur le monorment sent	La paralysie poile our le mouvement vout La paralysie du mouvement au avocée à la paralysie de la sensibilité La poundipie de la connibilité cavile au même degre que elle du moud-	Paralysic du mouvement et de la senvilèlité avoc contracture Lacalysic du mouvement et de la senvilèlité avec seconsos conouls: Les norfs et les muscles paralysic réselent senvilles aux creeta e	tions dedriques, pour land Presidabilité ar légèrement Timinuée Franchier de moithte avec hyperarthèsie 75. 70.	Faiblewe parabylique (Affaiblewement dans les membres	Affaiblissment dans les membres supérieurs et inférieurs (Maiblissment dans les membres inférieurs	Faiblesse Dans tout le système musculaire, principalement dans l'extrémité inférieure	. Harche parillante . Harche parillante n o	. Narche incortaine C'Harblissement dans les membres sans douleur brûlante P. Britissement dans les membres miserdes de douber krûlante	CHaiblissement dans les membres précédé de douleur biulante et Aaiblissement dans les membres accompagné de douleur builante	Pastation careêms, premier degré de la paralysie (V. Ympl.géner) Paralysie des organes centraux	Paalysie générale Myélike aigus	Angelle chonique	Taralysic Des meths vaso-moleurs Faralysic Des varioscaux	Paalysie complete des vaisseaux abdominaux Paulysie partielle	Copplexic	Daralysie des organos génilaux Affaiblissement de la puissance génésique	Garalysic des membres Parolisie des analre extrémités mais senton des carties	les plus éloguéses du tronc : les doighs, les pieds, les mains, les immess et les annet These	Language particle dos membros infériencs et dos membros supér. Parsolésie acos laiblesse caralutismo des beses	Campagn promoter promisers of the fact of the fa	Faintyon des quatre extremites, forte surtout du coté droit Faintyoir des membres plus prononcée du côté ganche	ordinairement la forme paraplégique	Jorniyse dos membros, mais surboul dos membros inféricais Paralysis, exclusivo dos membros supérienis So o,	Komipkyjie Tarahjsie partielle des membres supérieurs Tsaakyse des mains	Paralysis Des doigh senlement	B 15	Tarahysie localisée à une main Parahysie remontant des jambes jusqu'an thorax	Narapkyje Harapkyje do toute la moitte inférieure du corps	Laraplézia incomplèto Paraplégie des membres	of Prince partielle des membres inferieurs	warding oco preco

See word the second control of the second co	raplegte de toute de marie		_		14.3	111.3	-			1411	_	_	
	plégie incomplete		1/2		14/3	51/11	-	67/1	Oi;	-			
	upore partielle des membres inférieurs yoie des pieds		5 5		0 153	11:01	_			-			
	phie museulaire ophie des membres			100 150			<u> </u>		``	63			
	Anuellous en quaire arrennesses morphis en un ano manello de cos partico, surfout des musellos extenseurs. Analysis surfout des musello extenseurs			9									
	lysic des qualre calrèmilés avec alrophic des muselés nous particulièrement phoi résullèrent des contractures				<u> </u>								
	anones was funce memore. Azire des mains, surtout du vole de la flexion avec Esse paradytique des membres inférieurs				691								
	Aprie Des extrémités avec contracture plégie avec contracture				170				1/2				
	lysie succèdant à de la contracture musculaire paralysie des membres se concertit en épilepsie	17.4			1,6%								
	ynie piścedże de domlanes bealantes dans les extrémités nsie avoc doulanes britlantes dans les extrémités	5/1		777	. 6								
	you non accompagned De Doubans bealantes	637		3									
	you acce contents qui ressendrent a cetto or la gouine you presque complete des extrémités avec anesthésis de	 											
\$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$	an any mann el ana piebs, se retiant a des beuteurs. Se la sensibilité dans le dos				E34								
18	iesse paralytique surtout dans les pieds qui deoeuaient vis insensibles, raides et très douloureux . Les mans									_			
	felaient raides et insensibles		*	1/5	537								
166 166 166 166 166 166 166 166 166 166	a ace diminution considerable du sens de la oue				981					_			
	lysie de toules les extrémités progressive avec déman = ons et ardeur violentes à la paume des mains et à												
634 635 635 635 635 635 635 635 635 635 635	anke des pieds Peris desse dimensariems				250								
160 160 160 160 160 160 160 160 160 160	yose avee fournillements	<u> </u>	•—		637								
140 200 100 100 100 100 100 100 100 100 10	ysie priesose de tremblements ysie accompagnée de tremblements			9. 6.	~ .								
100 000 000 000 000 000 000 000 000 000	yoie avec sentiment de froid et crampes douloureuses	-		,					60,				
\$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$				<u> </u>	<u>.</u>				53				
166 165 165 165 165 165 165 165 165 165		161			.667						-		
165 165 165 165 165 165 165 165 165 165	aralysic debute ordinationent d'une manière biuque,												
166 166 166 166 166 166 166 166 166 166	e est anosi caractérisée qu'elle doit l'êlre pour di s er progressivement plus tard			167	Ç,				:67				
166 165 165 165 165 165 165 165 165 165	aralysic peut Whiter par un affaillessement qui							_					
100 000 000 000 000 000 000 000 000 000	it a des epoques variables analysie suit toujours de très près les troubles pumi =			×									
116 116 116 116 116 116 116 116 116 116	e l'appareil gastro-intestinal aralysie sébule dè les premiers jours de l'intoxication	_		5. %					cidi:				
166 165 165 165 165 165 165 165 165 165	aralysic debute Dans le courant du Deuxième replenaire			- 8									
16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 1	intorienteori aralysie debute dans le courant du troisième septenaire			<u> </u>									
116 000 000 0000 0000 0000 0000 0000 00	interication ara Pusio delinto arris le prairième malemaire de l'interiral "			<u>e</u>									
116 116 116 116 116 116 116 116 116 116	lysic terminale			, e;									
166 165 655 655 655 655 655 655 655 655	aralysie ne débute que pluvieurs jours après l'a aition des phénomènes d'intoxication			6									
166 166 166 166 166 166 166 166 166 166	varalysies se développent pour la plupart graduelle =			ò							_		
110 1100 1000 1000 1000 1000 1000 1000	party phenomenes d'excitation paralysies se développent graduellement avec			7,									
166 166 666 666 666 666 666 666 666 666	umines d'excitation au début		÷	2	11.31.								
remited 979 979 979 979 979 979 979 979 979 97	es d'excitation			No.									
sierens, mais no aktoplue	parahysie debute poujours par le bout des extremités elysie passagère (durant quelques jours)			1, 8.	2 ~								
200 - 600 200 - 600 200 - 600	lesse paralylique longlemps persistante			8					900				
.4%	etysie persplanto pendant ptusieurs mois paralysie disparait dans les membres supeiieurs, mais		-	4	240				2				
See lan	ste dans les membres inférieurs Unis comobile sossistant sendant des années sans atractie				36				300				
	lysic pensistant après la querison			00:	Soc !							_	



tement privé de connaissance, de sensibilité et de mouvement, avec arrêt de la respiration et de la circulation;

- 8° Collapsus (1), ou état dans lequel il y a chute rapide, complète et persistante des forces, un état intermédiaire entre la syncope et l'adynamie;
- 9º Sidération, ou état dans lequel il y a anéantissement subit, complet, comme par foudroiement et d'ordinaire pour toujours, de connaissance, de sensibilité, de mouvement, de circulation, de respiration et de tout autre acte d'innervation.
- 10° Apoplexie, ou état dans lequel le sujet est soudainement et complétement privé de connaissance, de sensibilité et de mouvement, avec une respiration stertoreuse et une circulation plus ou moins troublée. En ce qui concerne les symptômes de lipothymie, de défaillance et de syncope, j'indique quelques variétés de ces symptômes:
 - a. D'après la durée :
 - b. D'après l'intensité;
 - c. D'après la fixité (le sentiment de défaillance va en augmentant..., le sentiment de défaillance va en décroissant....);
 - d. D'après le mode d'invasion;
 - e. D'après le mode de terminaison;
 - f. D'après la répétition des accès;
 - g. D'après quelques troubles physiologiques concomittants, intimement liés au symptôme princeps;
 - h. D'après quelques troubles physiologiques alternant avec le symptôme princeps (tremblement, convulsions, tétanos...).

Le tableau nº II, consacré à des troubles physiologiques subjectifs ou externes, détermine, d'après les nombreuses observations que j'ai recueillies, et que j'indique à chaque ligne (2), quels sont dans l'état actuel de la science les symptômes de paralysie, essentiellement propres à l'action pathogénétique de l'arsenic.

J'expose les symptômes suivants :

1º Paralysie portant sur le mouvement;

⁽¹⁾ Le mot Collapsus était jadis employé à peu près comme synonyme de marasme.

⁽²⁾ Notes au nombre de 251 se rattachant au Tableau des symptômes paralytiques (Tableau pathogénétique n° 11):

^{1.} Hahnemann, in renv. 6. — Hahnemann, in renv. 8. — Obs. 410 Hahnemann. — Renv. 112 Hahnemann. — 2. Alberti, "Jur. medic.", t. 111, p. 861. — Forestus, lib. XVIII, obs. 28, p. 143. — Wepfer, "Hist. cic. aq.", cap. XXI, hist. 8, p. 558. — "Eph. nat. cur.", dec. 2, an. IV, obs. 42, p. 36 et cent. V et VI, obs. 45, p. 67. — P. de Abano, "De venen.", c. XXV. — J.-B. Montanus, "Consilia", cons. 567, p. 947. — Ramlow, in Hahnemann, renv. 6. — 3. Caels, "Rat. occurr. morb. a min. abus. prod. sol." — Schäffner, in "Art médical", Paris, 1871, t. xxxIII, p. 111. — "La paralysie arsenicale rappelle la paralysie saturnine et les phénomènes d'ergotisme". H. Huchard, "Rev. sc. médic.", Paris, 1876, t. vii, p. 551.—"Paralysie analogue à celle de l'intoxication saturnine". Scolosuboff, in "Annal. hyg. publ.", 1876, t. xlv, p. 155. — Renv. 192 G. Sée. — Gubler, in "Bull. Acad. méd.", Paris, 1870, t. xxxv, p. 931. — Renv. 189

- 2º Paralysie du mouvement associée à la paralysie de la seusibilité;
- 3º Paralysie du mouvement et de la sensibilité associée à quelques troubles physiologiques concomittants qui impriment un cachet caractéristique au symptôme princeps (contracture, secousses convulsives...);

Delioux de Savignac. — Renv. 211 Delioux de Savignac. — « La paralysie arsenicale est analogue à celle de l'empoisonnement saturnin ». Christison, « On poisons ». - « La paralysic arsenicale est parfois identique à celle de l'intoxication saturnine ». Reny, 222 Gubler. — Renv. 228 Hirtz. — Renv. 229 Fowler. — Renv. 65 Kircher. — Renv. 86 Demarquay — Reny. 88 Orfila. — Reny. 92 R. Leroy d'Etiolles. — Reny. 94 Christison. — Cardan, in renv. 95 Imbert-Gourbeyre. — Zacchias, in renv. 95 Imbert-Gourbeyre. — Renv. 96 Geoffroy. — James, in renv. 96. — Hoffmann. — Boerhaave. — Van Swieten. - SAUVAGES. - ELLER. - GORTER. - KRANTZ, 1755. - DESBOIS DE ROCHEFORT, 1789. - MURRAY, 1795. - GREN, 1798. - CRENNEMAN, 1819. - MÉRAT et DELENS, 1829. -SACHS DE DULK, 1830. - VOGH, 1831. - PEREIRA, 1839. - OESTERLEN, 1856. - KISSEL, in reny. 100 Imbert-Gourbeyre. - Reny. 101 Fodéré. - Reny. 102 Wibmer. - Reny. 113 IMBERT GOURBEYRE. - MURRAY, « Edimby med. journ. », t xviii, p. 9. - Behrend, « Bei!rage z. Gerichtl. Arzneikunde», in renv. 145 et 147 Hermann. - Brodie, in renv. 147 Hermann. - Renv. 163 G. Krans. - Renv. 164 L. Goffart. - Renv. 165 Barella. - Renv. 173 NAUNYN. - Renv. 270 SKRZECZKA. - Renv. 275 Scolosuboff et Huchard. - Renv. 280 WALTHER. - 4. "Les paralysies musculaires qu'on observe dans l'intoxication arsenicale aiguë et chronique ont pour cause initiale l'altération des centres nerveux eux-mêmes par ce métalloïde, et ce n'est pas dans les muscles qu'il faut rechercher la raison de la paralysie et de l'atrophie musculaires». A. GAUTIER, «Annal. hyg. publ.», 1876, t. xlv, p. 159. — « Lorsque l'ingestion du pojson est promptement mortelle, ce n'est que par exception que l'on voit apparaître des phénomènes de paralysie». Renv. 109 Inbert-Gourbeyre. - Renv. 145 HERMANN. — Renv. 173 NAUNYN. — Renv. 270 SKRZECZKA. — 5. A. GAUTIER, «Annal. hyg. publ. », 1876, t. xlv, p. 150. — Hahnemann, in renv. 112. — Tardieu, « Ét. sur l'empoisonnement », 1837, p. 332. — Renv. 109 Imbert-Gourbeyre. — Renv. 145 Hermann. — Obs. 49 Guyot. -6. (Voie vaginale). Obs. 81 Brisken. -7. Ramlow, in renv. 6 Hahnemann. - RAMLOW, in renv. 98 IMBERT-GOURBEYRE. - Renv. 112 HAHNEMANN. - Renv. 143 HERMANN. - Renv. 152 L. Hirt. - 8. Ramlow, in renv. 6 Hannemann. - Ramlow, in renv 98 IMBERT-GOURBEYNE. - Renv. 112 HAHNEMANN. - Renv. 145 HERMANN. - Renv. 152 L. Hirt. - 9. Obs. anim. 73 Joeger. - « Ils semblent paralysés ». Obs. anim. 32 — 10. Obs. anim. 73 Joeger. — Renv. 147 Brodie, in Hermann. — 11. Renv. 103 Imbert-Gourbeyre. - 12. Renv. 109 Imbert-Gourbeyre. - Renv. 155 MAGNUS HUSS — 13. Obs. 247 BOUVIER et R. LEROY D'ETIOLLES — 14. Obs. 8 DE PLASSE et Coppée, - 15. Renv. 281 Proust. - 16. Renv. 281 Proust. - 17. « Paralysie du mouvement et du sentiment des membres inférieurs ». Huben, in Hahnemann, t. 1, p. 423, s. 1104. - 18. Renv. 10.) IMBERT-GOURBEYRE. - Renv. 139 R. LEROY O'ETIOLLES. -Renv. 155 Magnus Huss. - 19. Obs. 158 Merunowicz - "Avec contracture". Obs. 183 Huber.—« Paraplégie avec anesthésie des pieds ». Obs 247 Bouvier et R. Leroy d'Etiolles. - 20. Obs. 124 Krans. - "... des bras et des jambes". Obs. 246 Thilenius. - "Avec refroidissement. Obs. mal. 99 Trochon et R. Leroy d'Etiolles. - 21. Huber, in Hahne-MANN, t. I, p. 425, s. 1104. - 22 Renv. 139 R. LEROY D'ETIOLLES. - 23. Obs. 150 SCHAPER. -- Obs. 131 Schaper. - 24. « ... des pieds seulement ». Obs. 188 Huber. -25. Obs. 124 Krans. — 26. Redv. 165 G. Krans. — 27. Schiff, in Trousseau, Pidoux et C. PAUL, « Tr. de thérapeut. », 1876, t. 1, p. 396. — 28. Obs. 8 De Plasse et Ceppée. — 29. « Amaigrissement rapide avec teint terreux; yeux cernés, grande faiblesse des membres, dégoût de toute occupation et désir continuel de repos (au bout de 5 j.) ». HAHNEMANN, t. 1, p. 393, s. 20. - « Faiblesse telle qu'on a de la peine à ne pas tomber en marchant dans sa chambre» Hahnemann, ibid., s. 24. - "Au moment où l'on sort du lit, le vertige et la faiblesse font tomber à terre; en même temps la céphalalgie augmente (chez une femme) ».

- 4º Paralysie du mouvement et de la sensibilité avec conservation de l'excitabilité électrique;
- 5º Paralysie du mouvement avec hyperesthésie;
- 6º Faiblesse paralytique (générale ou partielle, avec ou sans douleurs concomittantes);
- 7º Paralysie générale;

HARNEMANN, ibid., s. 35. - 30. «Faiblesse extrême; au moment de marcher, on tombe ». STAPF, in HAHNEMANN, t. 1, p. 394, s. 59. - 31. Pyl, in HAHNEMANN, t. 1, p. 394, s. 62. -« Grande faiblesse, surtout dans les membres inférieurs ». Pyl., in Hahnemann, t. I, p. 391, s. 64. - « Faiblesse générale se faisant sentir surtout dans les membres que l'on remue avec peine ». Alberti, in Hahnemann, t. 1, p. 393, s. 97. — Alberti, ibid., s. 98. — 32. Renv. 66 WEICKARD. - Renv. 92 R. LEROY D'ETIOLLES. - CARDAN, in renv. 95 Imbert-Gourbeyre. — Zacchias, in renv. 95 Imbert-Gourbeyre. — Renv. 101 Fodéré. — Reny, 139 R. Leroy D'Etiolles. - Reny, 166 Baumgärtner, - Reny, 174 Naunyn, -33. « Faiblesse paralytique des membres revenant tous les jours à la même heure, comme une fièvre d'accès ». Hahnemann, t. 1, p. 393, s. 23. — 34. Renv. 66 Weickard. — Renv. 155 Magnus Huss. — Renv. 211 Delioux de Savignac. — Renv. 222 Gubler. — 35. Obs. 166 Oppler. — Obs. 167 Spengler. — Obs. 225 Maschka. — 36. Obs. mal. 78 Magnus Huss. — 37. « Grande faiblesse des extrémités ; il semble que les mains et les pieds soient sans force, avec tremblement des membres; le matin, lassitude et douleurs articulaires avant midi, plus fortes quand on est assis que pendant la marche ». HAHNEMANN, t. I, p. 393, s. 32. - 38. « Grande faiblesse, surtout dans les membres inférieurs ». Pyl., in Hahnemann, s. 64. - 39. « Deux semaines après l'empoisonnement, il constate de l'affaiblissement dans les mains et les pieds, et de l'engourdissement aux extrémités des doigts ». Obs. 1 Scolosuboff. — Obs. 2 Scolosuboff. — « Impuissance presque absolue des membres plus prononcée du côté gauche ». Obs. 375 Obfila et Coqueret. — Obs. malad. 44 Magnus Huss. - Obs. 128 Keber, - Obs. 129 Keber. - 40. « . . . surtout dans les membres inférieurs » . Obs. mal. 78 Magnus Huss. - Obs. 10 De Plasse et Coppée. - 41. Renv. 204 Nothnagel. - 42. Obs. 1 Scolosuboff. - Renv. 204 Nothnagel. - 43. « Si peu qu'on marche, on sent dans les genoux une faiblesse extrême ». Hahnemann, p 393, s. 33. — « Faiblesse telle dans les genoux qu'on ne peut s'asseoir qu'avec peine ». Hahnemann, t. 1, p. 423, s. 1044 -« Grande faiblesse du genou droit, on se laisse tomber ». HARNEMANN, ibid., s. 1045. — 44. Renv. 165 Barella. - 45. (Chez cinq personnes). Obs. 37 Lachèse. - 46. Obs. 9 DE PLASSE et COPPÉE. - 47. Renv. 163 Krans. - 48. Obs. 148 Pyl. - Obs. 166 Oppler. -49. Obs. malad. 78 Magnus Huss. -50. Obs. 124 Krans. -51. « Faiblesse telle qu'on a de la peine à ne pas tomber en marchant dans sa chambre ». HAHNEMANN, t. I, p. 393, s. 21. - 52. Renv. 66 Weickard. - 53. Obs. 1 Scolosuboff. « ... et fait usage des mains avec grand'peine ». — (Le dixième jour). Obs. 2 Scolosuboff. — « Il marche avec peine, le corps courbé, la figure pâle, portant l'empreinte de la plus profonde douleur ». Obs. 89 Orfila. - Obs. 37 Lachèse. - Obs. 128 Keber. - Obs. 129 Keber. - Obs. malad 44 Magnus Huss. — 54. Obs. mal. 2 Gaillard. — Obs. 5 De Plasse et Coppée. - Obs. mal. 78 Magnus Huss. - Obs. 10 De Plasse et Coppée. - 55. Obs. 1 Scolosuboff. - 56. Obs. anim. 32. - 57. "Une femme, après avoir pris l'arsenie, devint anxiense, ressentit une faiblesse extrême, au point de n'être plus maîtresse de ses idées, et de se trouver incapable de fixer son attention sans beaucoup d'effort; en même temps, elle chancelait ». Hahnemann, t. 1, p. 595, s. 21. - 58. Obs. mal. 44 Magnus Huss. - 59. Obs. mal. 78 Magnus Huss. - 60. Obs. anim. 74 Joeger. - 61. Bouley, in renv. 103. -Regnetta, in renv. 103. — 62. Obs. malad. 44 Magnus Huss. — 63. Obs. malad. 78 Magnus Huss. — 64. Renv. 110 Imbert-Gourbeyre. — 65. Renv. 110 Imbert-Gourbeyre. - 66. Renv. 110 IMBERT-GOURBEYRE. - 67. « Dans une foule d'observations, il est toujours question d'une prostration extrême, d'une faiblesse extraordinaire. C'est un symptôme habituel, et j'estime que c'est bien là un premier degré de la paralysie, une véritable faiblesse paralytique ». Renv. 109 Imbert-Gourbeyre. — 68. Brodie, in renv. 147 Hermann. —

- 8º Paralysie de la moëlle épinière (aiguë ou chronique);
- 9º Paralysie des nerfs vaso-moteurs (générale ou locale);
- 10º Paralysie génésique;
- 11º Paralysie des quatre extrémités (générale ou partielle, complète ou incomplète...);

SKLAREK, in renv. 147 HERMANN. -- 69. BRODIE, in renv. 147 HERMANN. - SKLAREK, in renv. 147 Hermann. -- Obs. Sklarek, in renv. 175 Naunyn. - 70. Renv. 7 Hahnemann. — 71. Tackenius, in renv. 7 Hahnemann. — 72. « La paralysie arsenicale semble avoir une tendance à se généraliser ». Renv. 92 R. LEROY D'ETIOLLES. - Renv. 109 IMBERT-GOURBEYRE. — Renv. 136 R. LEROY D'ETIOLLES. — 73. TACKENIUS, in renv. 7 HAHNEMANN. -- 74. Obs. 1 Scolosuboff. -- Obs. 2 Scolosuboff. -- Obs. 432 Hallopeau. -- 75. Obs. 432 Vulpian, cité par Hallopeau. — 76. Obs. 452 Guéneau de Mussy, cité par Hallopeau. — 77. "Paralysie des capillaires sanguins ». Renv. 176 Sée. — Renv. 177 Gubler. (Il conteste). - Renv. 210 Delioux de Savignac « Paralysie nerveuse et vasculaire ». -78. « Veinules tortueuses par paralysie des nerfs vaso-moteurs ». Obs. 1 Scolosuboff. — 79. Obs. 1 Scolosuboff. — 80. Obs. 1 Scolosuboff. — 81. Renv. 81 Böhn et Unterberger. — Renv. 140 Alguier. — 82. Renv. 81 Böhm et Unterberger. — 83. Renv. 81 Böhm et Unterberger. — 84. Redy. 475 Naunyn. — 85. Böhm et Unterberger, in redy. 475 NAUNYN. - 86. BÖHM et UNTERBERGER, in renv. 175 NAUNYN - 87. FLANDIN, in renv. 227 Hirtz. — Renv. 174 Naunyn. — Renv. 234 Orfila. — 88. Renv. 174 Naunyn. — Ods. 575 Orfila et Coqueret. — 89. Renv. 174 Naunyn. — 90. Renv. 10 Hannemann. — 91. Renv. 122 IMBERT-GOURBEYRE. — Renv. 160 HARDY. — 92. Obs. mal. 37 RAYER. — Obs. mal. 38 Charcot. — Obs. mal. 59 Charcot. — Obs. 177 Biett. — 93. Renv. 460 Hardy. — 94. « Tous les membres sont comme paralysés, on ne peut se tenir droit ». Hornburg, in Hahnemann, t. 1, p. 394, s. 54. — 95. H. Hubrard, « Rev. Sc. médic. », 1876, t. vu, p. 551. — Renv. 189 Delioux de Savignac. — Renv. 222 Gubler. — Bardley. — Rayer. - Renv. 227 Hirtz. - Renv. 92 R. Leroy D'Etiolles. - Renv. 136 R. Leroy D'Etiolles. - Renv. 174 Naunyn. - Renv. 270 Skrzeczka. - 96. « ... plus tard paralysie des membres, et après la desquamation de l'exanthème, la paralysie se convertit en épilepsic dont souffrit encore longtemps la malade ». Obs. 282.—«Les membres étaient presque paralysés ». Obs. 69 Orfila et Coqueret. — Scolosuboff assure avoir observé divers cas in «Annal. hyg. publ.», 1876, t. xlv, p. 153. — «Impuissance presque absolue des membres plus prononcée du côté gauche». Obs. 375 Orfila et Coqueret. — « Aceidents cérébraux suivis an bout de vingt jours de paralysie des extrémités ». Obs. 397 Dukerly. — Obs. 25 Malmstem. -Obs. 24 G. Bergmann. -Obs. 137 De Haën. -Obs. 158 Merunowicz. -Obs. 165 Haffter. - Renv. 270 Skrzeczka. - 97. Obs. mal. 57 Rayer. - Scolosuboff, in «Annal. hyg. publ.", 1876, t. xlv, p. 153. — Obs. 555 Wiemer-Schaper. — Renv. 166 Baumgärtner. — 98. Renv. 201 Nothnagel —Renv. 166 Baungärtner.—Renv. 281 Proust.—99. Renv. 204 NOTHNAGEL. -- Reny. 166 BAUMGARTNER. -- Reny. 281 PROUST. -- 100. Reny. 5 Scolosuboff. — 101. Obs. 1 Scolosuboff. — 102. Renv. 174 Naunyn. — 103. Obs. 147 De Haën. — « Faiblesse paralytique des membres inférieurs avec fourmillement; les mains sont presque complétement paralysées du côté de la flexion ». Obs. 233 Laure — « Paraplégie de tonte la partie inférieure avec faiblesse paralytique des bras ». Obs. 247 Bouvier et R. Leroy D'ETIOLLES. — 104. Obs 3 DE PLASSE et COPPÉE — Obs. 4 DE PLASSE et COPPÉE. — 105. "... des bras et des jambes". Obs. 246 Thilenius. — Obs. 124 Krans. — 106 Obs. 247 Bouner et R Leroy d'Etiolles. — Obs. malad. 99 Trochon et R. Leroy L'ETIOLLES. - 107. Renv. 67 J. Schroeder. - Renv. 218 L. Orfila. - 108 Obs. 373 ORFILA et COQUERET. - 109. Obs. 1 Scolosuboff. - 110. Obs. 575 ORFILA et COQUERET. - 111. « Amyosthénie plus prononcée du côté gauche ». Obs. 124 Krans. - 112. Renv. 174 NAUNYN. - 113. Renv. 92 R. Leroy d'Etiolles. - Renv. 136 R. Leroy d'Etiolles. -Reny, 165 Krans. — 114. Obs. 147 De Haën. — 115. Obs. 9 De Plasse et Coppée. — 116. Obs. 246 Timlenius. — Obs. 124 Krans. — 117. Obs. anim. 2 Scolosuboff. — 118. Renv. 109 Imbert-Gourbeyre. — Renv. 270 Skrzeczka. — 119. Renv. 270

- 12º Hémiplégie;
- 13° Paralysie exclusive des membres supérieurs (générale ou partielle, complète ou incomplète);
- 14º Paraplégie (générale ou partielle, complète ou incomplète...);
- 15° Paralysie d'un membre:

SKRZECZKA. - 120. « Paralysie d'un bras et d'une jambe ». Obs. 115 Stachow. -121. Renv. 222 Gubler. «La paralysie frappe surtout la région dorsale des avant-bras, et laisse relativement inlacts les muscles radiaux ». - Renv. 109 IMBERT-GOURBEYRE. -Reny. 86 Demarquay. - Obs. 27 Falconer. - 122. Obs. 375 Orfila et Coqueret. --123. Obs. mal 2 Gaillard. — Obs. 3 De Plasse et Coppée. — 124. « Un onvrier resta paralysé de la main droite ». Obs. 260 IMBERT-GOURBEYRE. - 125. Renv. 109 IMBERT-GOURBLYRE. - 126. Obs. mal 19 EMERY. - 127. Renv. 109 IMBERT-GOURBEYRE. -128. Renv 109 Imbert-Gourbeyre. - 129. « Souvent une seule extrémité se trouve frappée ». Renv. 174 Naunyn. - 130. Renv. 174 Naunyn. - « Au bras gauche ». Obs. 156 MURRAY. - 131 Obs. 260 IMBERT-GOUBBEYRE. - 132. Obs. 224 STEVENSON. -133. Hahnemann. - 134. Obs. 146 Forestus. - « Paralysie rendant la marche im ossible », KRÜGER, in HAHNEMANN, t. 1, p. 395, s. 83. — 135. TROUSSEAU et PIDOUX, « Tr. de thérap. », 1858, t. 1, p. 314. — « La paraplégie est souvent la conséquence de l'empoisonnement arsenical ». HARDY, in « Bull. Acad. médec. Paris », 1870, t. xxxv, p. 910. - « L'arsenic cause parfois des paraplégies semblables, d'après Christison, quelquefois identiques, selon moi, aux paralysies saturnines ». Gubler, in «Bull. Acad. médec. Paris », 1870, xxxv, p. 931. — Renv. 16 Geoghegan. — Renv. 92 R Leroy D'Etiolles. — Renv. 136 R. Leroy D'ETIOLLES. — « La sphère d'élection de la paralysie gît dans les extrémités inférieures ». Renv. 109 Imbert-Gourbeyre. — Renv. 160 Hardy. — Renv. 270 Skrzeczka. — Renv. 276 Gailleton. — 136. Obs. 146 Forestus. — Obs. 13 Barrier. — Renv. 270 Skrzeczka. — Obs. 224 Stevenson. — Obs. mal. 94 Ebers. — 137. « Lumbago du côté gauche avec engourdissement de l'extrémité correspondante; un mois après, paraplégie ». Obs. mal. 52 GIBB. — TARDIEU, « Et. sur l'empois. », 1867, p. 332. — Renv. 436 R. Leroy d'Etiolles. — Renv. 166 Baumgärtner. - 138. Renv. 166 Baumgärtner. - Renv. 281 Proust. -139. Obs. 276 Stilli. — Reny. 166 Baungärtner. — Reny. 281 Proust. — 140. Obs. anim. 75 Brodie. - 141. « Paralysie remontant des jambes jusqu'au thorax ». Obs. 224 Stevenson. — « Il pouvait à peine faire le mouvement de rotation des cuisses ». Obs. 247 Bouvier et R. Leroy d'Etiolles. - 142. Tardieu, « Ét. sur l'empoisonnement », 1867, p. 332. — 143. Obs. mal. 2 Gaillard. — Obs. 3 De Plasse et Coppée. — Obs. 23 De Plasse. - Obs. 10 De Plasse et Coppée. - Tardieu, « Ét. sur l'empoisonnement », 1867, p. 332. -144. Obs., anim. 111 De Plasse et Coppée. — 145. « Paralysie des membres inférieurs ». Bernhardi, in Hahnemann, t. 1, p. 395, s. 106.—Ebers, in Hahnemann, t. 1, p. 425, s. 1080. — « Paralysie du mouvement et du sentiment». Нивен, in Наимемани, ibid., s. 1104. — 146. Renv. 173 Naunyn.—147. Obs. 13 Barrier. « . . . quelques heures après l'ingestion du poison ». - Obs. 37 Lachèse. - Renv. 173 Naunyn. - Obs. 190 Timoeus a Guldenklee. -Obs. 214 Serph. - Obs 224 Stephenson. - 148. Tardieu, « Et. sur l'empoisonnement », 1867, p. 332. — 149. Renv. 166 Baumgärtner. — 150. Renv. 166 Baumgärtner. — 151. «Paralysie des deux genoux ». J.-B. Montanus, in Hahnemann, t. 1, p. 425, s. 1087.— « Paralysie des deux genoux ». Schenk, in Hahnemann, t. 1, p. 425, s. 1087. — « Paralysie des jambes; on peut à peine marcher ». Forestus, in Hahnemann, ibid., s. 1089. -152. IMBERT-GOURBEURE « n'a point rencontré d'observat, de paralysies des membres inférieurs où les deux extrémités ne sussent atteintes simultanément». Renv. 109. — 153. Obs. 375 Orpila et Coqueret. - 154. Obs. 5 De Plasse et Coppée. - Obs. 8 DE PLASSE et COPPÉE. (... jambes). - 155. «Paralysie des pieds après avoir vomi». Cordanus, in Hahnemann, t. 1, p. 425, s. 1098. - Heimbich, in Hahnemann, ibid., s. 1103. — « Engourdissement, rigidité, insensibilité des pieds avec gouflement, douleur vive de temps en temps ». Pyl., in Hahnemann, ibid., s. 1097. 156. Renv. 109 Imbert-Gourbeyre. -157. Obs. 186 Hemrich. — Obs. 410. — Obs. 187 Kruger. — Obs. 188 Huber. —

J'indique quelques variétés de ces symptômes :

- a. D'après le mode d'extension (la paralysie s'étend progressivement de la main à tout le bras...);
- b. D'après des lésions anatomo-pathologiques concomittantes (avec atrophie des muscles en général, des muscles fléchisseurs...);
- c. D'après des troubles physiologiques concomittants intimement liés au symptôme princeps (contracture, douleurs brûlantes, douleurs articulaires, amblyopie, fourmillements, tremblements...);

158. Renv. 163 G. Krans. — Renv. 174 Naunyn. — 159. Obs. 140 Naunyn. — 160. Renv. 174 NAUNYN. - 161. Scolosuboff, in "Annal. hyg. publ.", 1876, t. xlv, р. 153. — 162. Scolosuboff, in «Annal. hygièn. publiq. », 1876, t. xlv, p. 153. — 163. Obs. anim. 2 Scolosuboff. -164. Obs. 1 Scolosuboff. -165. Renv. 222 Gueler. - Renv. 174 Naunyn. - 166. Obs. 375 Orfila et Cooueret. - 167. Obs. 158 Merunowicz. -- 168. Obs. 1 Scolosuboff. -- 169. Obs. 233 Laure. -- 170. Obs. 158 MERUNOWICZ. - 171. Obs. malad. 99 Trochon et R. Leroy d'Etiolles. - 172. Obs. 8 DE PLASSE et COPPÉE. - 173. Obs. mal. 99 Trochon et R. Leroy d'Etiolles. -174. Renv. 3 Hahnemann, « Ueber die Arsenikvergiftung », 1786, p. 174. — 175. Obs. 158 MERUNOWICZ. — 176. «Ces convulsions persistèrent pendant longtemps ». Obs. 282. — 177. Renv. 110 IMBERT-GOURBEYRE. - 178. Renv. 9 HAHNEMANN. - 179. Renv. 110 Imbert-Gourbeyre. - 180. Obs. 458 Merunowicz. - 181. Reny. 410 Imbert-Gourbeyre. - 182. Renv. 9 HAHNEMANN. - 183. Obs. mal. 79 Magnus Huss. - 184. Pyl., in Hahnemann, t. 1, p. 425, s. 1097. — 185. Obs. 148 Pyl. — 186. Obs. 128 Keber. — 187. Obs. 158 Merunowicz. — 188. Obs. 158 Merunowicz. — 189. Obs. 233 Laure. Renv. 110 Imbert-Gourbeyre. - 191. Renv. 110 Imbert-Gourbeyre. -192. Renv. 163 G. Krans. - 193. Obs. 246 Thilenius. - 194. Hahnemann, t. I, p. 393, s. 23. — **195**. Obs. mal. 65 R. Jones. — **196**. Renv. 163 G. Krans. — Renv. 139 R. LEROY D'ETIOLLES.—197. Obs. 246 THILENIUS.—198. Renv. 139 R. LEROY D'ETIOLLES. - 199. Renv. 163 G. Krans. - Renv. 139 R. Leroy D'Etiolles. - 200. Renv. 174 Naunyn. — 201. Renv. 174 Naunyn. — 202. Obs. 246 Thilenius. — 203. Renv. 174 Naunyn. — 204. Obs. 158 Merunowicz. — Reny. 174 Naunyn. — 205. Reny. 174 Naunyn. -206 Renv. 174 Naunyn. - 207. Renv. 174 Naunyn. - 208. Renv. 174 Naunyn. -209. Renv. 218 L. Orfila. — 210. Dehaën et Christison, in renv. 174 Naunyn. — — 211. Obs. Dehaën, in Christison, in renv. 174 Naunyn. — Schaper, in renv. 174. — Obs. 148 Pyl. — Obs. 158 Merunowicz. — 212. Renv. 174 Naunyn. — 213. Obs. 158 Merunowicz: — Renv. 174 Naunyn. — 214. « ... surtout dans la forme paraplégique ». Renv. 174 Naunyn. — 215. «... surtout dans la forme paraplégique ». Renv. 174 Naunyn. - 216. Renv. 174 Naunyn. - 217. Renv. 174 Naunyn. - 218. Renv. 109 IMBERT-GOURBEYRE. - 219. Obs. 8 DE PLASSE et COPPÉE. - 220. Reny, 109 IMBERT-GOURBEYRE. -Renv. 174 Naunyn. - 221. «Absence de forces persistante avec rétablissement très-lent ». Obs. 211 Merbach. — Obs. 242 Buzorini. — 222. Renv. 270 Skrzeczka. — Renv 109 IMBERT-GOURBEYRE. - Renv. 276 Gailleton. - Renv. 174 Naunyn. -- 223. Obs. 137 DE HAEN. — Obs. 156 MURRAY. — Renv. 445 HERMANN. — Renv. 270 SKRZECZKA. — Obs. 190 Timoeus a Guldenklee. - Obs. 247 Bouvier et R. Leroy d'Etiolles. - 224. Obs. malad. 99 Trochon et R. Leroy d'Etiolles. — Obs. 124 Krans. — 225. Obs. 246 Thilenius. — 226. Obs. 140 Naunyn. — 227. Christison, in renv. 174 Naunyn. — Schaper, in renv. 174 NAUNYN. — 228. Renv. 145 Hermann. — Renv. 174 Naunyn. — 229. Renv. 109 Imbert-GOURBEYRE. — Renv. 174 NAUNYN. — 230. Obs. 140 NAUNYN. — CHRISTISON, in renv. 174 NAUNYN. - Schaper, in renv. 174 Naunyn. - 231. Obs. malad. 99 Trochon et R. Leroy D'ETIOLLES.



-
Tab
E
Ē
_
200
~
~
Ĕ,
÷
ıthe
atho
vathe
pathe
-pathe
-pathe
o-patho
o-patho
no-patho
- OU
anatomo-patho
- OU
- OU
s anatomo-
s anatomo-
s anatomo-
s anatomo-
- OU
ons anatomo-
s anatomo-
sions anatomo-
sions anatomo-
ons anatomo-
sions anatomo-
sions anatomo-
sions anatomo-

	Coyo commission comp	08		É		2 14	65:	52.53
observés	contrastigos como nos entrantos							
<u> </u>	שיוים באפיניונכם כלוכן באוריות באפיניונכם כלוכן			29.	27	13	3	2/36
gique	dans experione gastrique	# & o'	200	8 6	\$ 13	15 18	33	5.5
that.	dano mloxicadim) priz voie endantée	E		250		33	36.68	35
anatomo-pathologiques	and more control part							
iakon	sive and montantalin cuts						3	
		18						
conl	dans interestion cheorique	7 19 01					0.50	
Troubles physiologiques et	dano intercatione aigue		र दी	43	13		2000	1 28 1
hysic	par d'autres auteurs		8 6	£ 53	6.5.	2 %	52.5	8646 3
63	par allopathas estes							.[
Buot	ah ermannanda hayaraq							
3.5	Far Hahmanan =							
Lésions anatomo-pathologiques du cœur Tabl. [V]	A Constitution of the state of the price of the constitution of the state of the st	Hyperemie Irio vice du péricarde Reidarde vide et see Cacha scolymatiques dans le tianu cellulaire sous-péricardique Pericarde contenant leaucoup de sécosité avec curu normal Reidarde contenant de la sécosité avec curu cellymase Reidarde contenant de la sécosité jaumaître Reidarde contenant de la sécosité jaumaître Reidarde contenant une sécosité jaumaître Reidarde contenant une sécosité souse des Reidarde contenant une sécosité souse des Reidarde contenant une sécosité sousquite Reidarde contenant une sécosité sousquite Reidarde contenant une sécosité sousquite Reidarde contenant une sécosité couque-beunaite. Réidarde contenant une sécosité coque-beunaite. Réidarde contenant une sécosité cique de la contenant une sécosité cique de la contenant une sécosité ciquense Réidarde contenant une sécosité ciquense	conserious arouning factorists a te surface tive su pricario Chlicenco poeulo-monheaneuses do deux faillets du pricardo Loison sardiagues Congsolion cardiague	Compostion De l'endocarde L'obocarde rouge et friable Injection très-rouge dus cavoités du caur Injection rouge-marbiée dus cavoités du caur	Myperémie des valoules Injection rouge de la valoule mitrale du cœur Adexation vive des valoules du cœur avec hypertrophie de l'organie Trycelion rouge-pourpée du ventricule deoit du cœur Millemartion des valoules	Inflammation des voloules somi-lunaires (valeules signocibles) Coméfection endocarditique récente des valeules de l'averte Cardite Inflammation violente des parsis des ventricules du coure (2021e des des ventricules, mais aurent du vontricule gaucelle Contra de des des les parsis autent du vontricule gaucelle	Cartier on continue gauge Cartile and hypertrophic Cartile and hypertrophic Colymnoses sond Pendocardo Colymnoses sond Pendocardo Asiro las ventricules Calymnoses sur la doison du carte	Certymosos Dans les ironillettes Certymosos Dans le tissu du contricule desit Certymosos dans le centricule gauche Certymosos arux valouces mitrale et tricuspide Influsions sanguines considérables dans les fibrillex? Disebes spangréneuses au cour

5 35	8 %		-			
13	55. 55 50. 92 99. 93		OII .			
67	338		11 82	0.	1 3 6	ji ji
	\$	ji		Ĉ.	735 MO	100 000
	12		2 2			ý s
5 %	8	36. 68. 68.	80 11 81 11 81 1 81 1 81 1 81 1 81 1 81			
0,	38 9 88	i	1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1		12 12 12 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13	1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
, ,			* '		7: 4, 4, 4,	
		***	S. I.		,	
resupussis aux valouks mitak et trieupise Gelfunesis aux valouks mitak et trieupise Influsion, sanguines considerables dans les fibrillex?	musculaires du cour celipmoses dans l'époisous du muele cardicaque celipmoses à la base do celomes darines les plus grosses confirmoses sur les colonnes charines. Fetti corpusades Banca asce, solloja et à consistance de	tene du contribil ganche Concretions albumino-graiosemes à la surface libre de l'embourde Concretions albumino-graiosemes dans les oreillètes Generations polypeuses dans les contrientes du cont Cour pale Cour pale	Cour flague mon Cour extraordunivement flague, peu musculeux, grainsoux Cour mines, flaque, side Cour affainsé, ratuliné de cour sur, petit volume, présente un état de ramollisse, -ment et de oscutté notables Cour ramolli, brunitte Cour ramolli, très mon comme mascrié et de couleur de	fice duits Les places musculaires ont para lan transparence et sont trés malles peu volumineux sans alléation mestids cheus peu volumineux sans alléation mestids cheus plus petit que Madhinde et ausoi dus qu'un muscle contracté spasmodquement Constitution du cours Constitution du cours Constitution du cours Constitution du course Constitution	Care in per ampire. Repertuphic aristique avec épaississement des parvis d'appertuphic aristique avec épaississement des parvis des centricule gauche était tiès hipertrophic et vide, le ceur droit avait ses parsis d'iminuéed épaisseur, l'ariellette correspondante était gorgée de sang Genulations de félers du ceur. Le microsope, on tranve les félirilles musculaires remplies de petits globules de graisse les félirilles musculaires remplies. Aixeltose aigus généraluée et des plus intense Mérintons au cour. Mérintons any cour. Gérkos gangréneuses au cour.	Ace earsies du ceur sont cides de sang des ceur sot vide et ne renferme que plusieurs petitus, acilhad de sang Les ceur est plein de sang liquide et noixilie Les ceuties du ceur renferment besucoup de sang noir, à denie catillé, anctueurs des cavités du ceur renferment de nombreux cuillets noi altres Les cavités du ceur renferment de caucoup de sang noixilie et l'oxeillette deut des cont distendus par un cuillet columineux qui es problenge dans l'artire pul', monirie, landie que dans le centriule gauche il existe très peu de sang l'aquide et des cechymoses



- d. D'après le mode d'invasion (succédant à la contracture, à des douleurs brûlantes, à des tremblements...);
- e. D'après le mode de terminaison (se convertissant en épilepsie..., se terminant par la mort...);
- f. D'après l'époque de l'invasion (immédiatement après l'intoxication, peu après l'intoxication, après le premier septenaire..., après la guérison de l'intoxication...);
- g. D'après la durée (paralysie passagère; paralysie persistante pendant des semaines, des mois, des années; paralysie incurable...)

Le tableau nº III, consacré à des lésions anatomo-pathologiques internes, détermine, d'après les nombreuses observations que j'ai recueillies et que j'indique à chaque ligne (1), quelles sont dans l'état actuel de la science les

⁽¹⁾ Notes au nombre de 163 se rattachant au Tableau des lésions anatomo-pathologiques du cœur et de ses enveloppes (Tableau pathogénétique n° III) :

^{1.} Obs. 59, Martineau et Liouville -2. Obs. 257, Kéber. - 3. «Les taches ecchymotiques se rencontrent à peu près constamment sous le péricarde et l'endocarde , TARDIEU, « Tr. de l'empoisonnement », 1867, p. 335 - Les ecchymoses sous-péricardiques ne doivent pas être admises « comme caractéristiques »; Taylor, « On poison ».—Renv. 219, L. Orfila. Renv. 173, Naunyn. -- 4. Obs. 59, Martineau et Liouville, « surtout sous le feuillet viscéral ». - Renv. 173, NAUNYN. - 5. «.... vers l'origine des gros vaisseaux », Obs. 4, DE PLASSE. - «Suffusions sanguines irrégulières », Obs 23, DE PLASSE. - 6. Obs. anim. 62, STOKVIS. - 7. "Quatre onces de sérosité", Obs. 335, Franque. - Kortum, in Reny. 149, IMBERT-GOURBEYRE. - Deux observ. de Franque, in Renv. 449, IMBERT-GOURBEYRE. -8. Beissenhirtz, in Renv. 149, Imbert-Gourbeyre. — 9. Obs. 89, Orfila. — 10. Obs. 4, DE PLASSE. - 11. Obs. 427, PARKER. - 12 BORGES, in Renv. 149, IMBERT-GOURBEYRE. -HOHNBAUM, in Renv. 149, IMBERT-GOURBEYRE. - 13. " et dans le péritoine », Zittmann? in Renv. 149, IMBERT GOURBEYRE. - GAIRDNER, in Renv. 149, IMBERT-GOURBEYRE. -14. Bouley, in Renv. 149, IMBERT-GOURBEYRE. - 15 Obs. 248, KEBER. - 16. « et dans le péritoine ... après 12 heures », Obs. 323, HEYFELDER. — Obs. 329, CHOULANT. — PFAFF, in Reny. 149, IMBERT-GOURBEYRE. - KERSTEN, in Reny. 149, IMBERT-GOURBEYRE. -17. Obs. 23, De Plasse. - 18. Voie vaginale. Obs. 81, Brisken. - 19. Obs. 90, Bayard et Chevallier - 20. Voie vulvaire. Obs. anim. 63. - 21. « avec hypertrophie cardiaque", WARD, in Renv. 149, IMBERT-GOURBEYRE. - 22 NISSEN, in Renv. 149, IMBERT-Gourbeyre. — 23. « ... pus jaunâtre abondant », Obs. 78, Peyer. — 24. 4 et de l'endocarde », Obs. 16, Aguilhon. — « et dans les oreillettes », Hennelé, in Renv. 149, IMBERT-GOURBEYRE. - 25. «Adhérences du cœur au péricarde», Obs. anim. 56, Bouley. - 26. Brodie, in Renv. 241 Orfila. - Joeger, in Renv. 241 Orfila. - 27. Obs. Tetrel et Obs. Griffon, in Obs. 587 Orfila et Devergie. - 28. Obs. anim. 57 Bouley. -29. Renv. 242 Orfila. — 30. Renv. 129 C. James. — 31. Renv. 129 C. James. — 32. Obs. 101 Bayard et Chevallier. — 33. Renv. 222 Gubler. — 34. Obs. 328 Murray. - Obs. 401 GAIRDNER. - Obs. 59 MARTINEAU et LIOUVILLE. - 35. Obs anim. Plater, CATANEI et Novati. — Obs. anim. 76 Smith. — 36. Obs. anim. 76 Smith. — 37 Obs. anim. 76 Smith - 38. Obs. 89 Orfila. - Mollet, in Obs. 89 Orfila. - 39. Renv 129 C. James. — 40. Renv. 129 C. James. — 41. Obs. 230 Wilks. — 42. Obs. anim. 81 ORFILA. - 43. Obs 239 LESPINAS et ORFILA. - 44. «... et des gros troncs veineux ». Obs. anim. 88 Hardegg. — 45. Obs. 55 Scoutetten. — 46. Obs. anim. 36. — 47. Voie vulvaire. Obs. anim. 63. - 48. Grohe et Mosler, in «Virchow's Archiv.», 1865. -49. TROUSSEAU et PIDOUX, «Tr. de thérapeutique», 1858, t. 1, p. 314. — 50. «.... avec diminution de la contractilité du cœur », Renv 31 Orfila et Smith. — 51. Renv. 31 Orfila

LÉSIONS ANATOMO-PATHOLOGIQUES DU COEUR ET DE SES ENVELOPPES, essentiellement propres à l'action pathogénétique de l'arsenic.

J'expose les lésions suivantes :

A. LÉSIONS DU PÉRICARDE :

- 1º Lésions de la membrane séreuse (a. hyperémie; b. ecchymoses); 2º Liquide péricardique :
 - a. Absence de tout liquide péricardique (le péricarde est vide, sec);

et Smith. — 52. Renv. 31 Orfila et Smith. — 53. Obs. 54 Scoutetten. — Obs. 55 Scoutetten. — Obs. 209 Fristo. — 54. «.... sans hypertrophie », Obs. 55 Scoutetten. — 55 Obs. 93 Kayser. — 56. « . . . le ventricule gauche est sain; cœur hypertrophié », Obs. 54 Scoutetten. — 57. Obs. 54 Scoutetten. — 58. « Les taches ecchymotiques se renconfrent à peu près constamment sous le péricarde et l'endocarde », Tardieu, « Tr. de l'empoisonn. », 1867, p. 335. — Les ecchymoses sous péricardiques ne doivent pas être admises comme caractéristiques, Taylor, «On poison». — Murray semble être le premier qui ait signalé les ecchymoses endocardiques, «Art médic. Paris», t. xxxvII, p. 16. — CASPER. — Mollet, in «Arch. gén. méd.», 1823, t. 1, р. 148. — Ollivier, in «Bull. Acad. médec. de Paris », 1829, 27 janv. — Orfila, «Bull. Acad. méd. Paris », 1829. — Renv. 240 Orfila. - DEVERGIE, 1813. - C. JAMES. - MACKENZIE, 1840. - CHOULANT. - KLOSE. - BAYARD et Chevallier. - Reuter. - Letheby. - Wilks. - Vitry. - Renv. 219 L Orfila. - Renv. 222 Gueler. - Renv. 26 Geoghegan. - Renv. 129 C. James. - Renv. 173 Naunyn. - 59. Obs. 126 Rouget, Andral, Orfila et Tardieu. - Obs. 328 Murray. -- Obs. 89 ORFILA - Obs. 87 GODART. - Obs. 329 CHOULANT. - Renv. 91 ORFILA. - Renv. 173 NAUNYN. — 60. Obs. 23 DE PLASSE. — 61. Renv. 91 Orfila. — 62. Orfila, «Traité toxicol.», 1852, t. 1, p. 421. — 63. Renv. 31 Orfila et Smith. — «.... ecchymoses éparses çà et là sur l'endocarde », Obs. Реисн, 1867. — Obs anim. 62 Stokvis. — Renv. 129 C. James. — 64. Obs. anim. 76 Smith. — Renv. 129 C James. — Renv. 31 Orfila et SMITH. — 65. Obs. anim. 99 Peuch. — Obs. anim. 76 SMITH. — Renv. 31 Orfila et SMITH. - 66. Renv. 29 Casper. - 67. Obs. 253 De Jaechere et Van Meenen. - 68. Obs. 238 Morgantier et Boissarie. — 69 Obs. 197 Grohe et Mosler. — 70. Renv. 240 Orfila. — 71. Obs. 329 Choulant — 72. « Dans deux cas », Imbert-Gourbeyre, « Art médical », Paris, 1869. t. xxix, p. 34. — 73. Obs. 101 Bayard et Chevallier — 74. « Dans dix cas», IMBERT-GOURBEYRE, «Art médical», Paris, 1869, t xxix, p. 34. - 75. Obs. 74 C. James. — Obs. 59 Martineau et Liouville. — Obs. 30 Tardieu. — Obs. 4:6 Tardieu. - Obs. 87 Godart. - Obs. 230 Wilks. - Obs. 329 Choulant. - 76. «Sur un chien empoisonné, deux ecchymoses sur le ventricule gauche », Obs. Plater, Catanei et Novati.-Obs. anim. 35 Plater, Catanel et Novati. — Obs. anim. 55 Bouley. — Obs. 58 Boehm. — 77. Obs anim. 58 Boehm. — Obs. anim. 76 Smith. — Renv. 81 Boehm et Unterberger. — 78. Obs. anim. 58 Boehm. — Obs. anim. 76 Smith. — Renv. 81 Boebm et Unterberger. — 79. Renv. 240 Orfila. — Renv. 129 C James. — 80. Obs. 230 Wilks. — " Valvules auriculo-ventriculaires présentant plusieurs petites ecchymoses», Obs. 415 Letheby. — 81. Renv. 129 C. James. -- Renv. 31 Orfila et Smith. - 82. Obs. anim. 77 Orfila. --Renv. 31 Orfila et Smith. - Renv. 129 C James. - 83. Renv. 31 Orfila et Smith. « avec ecchymoses sous-péricardiques et sous-endocardiques », Obs. anim. 62 Stokvis. — 85. Renv. 240 Orfila. — 86. Obs 126 Tardieu. — Obs. 89 Orfila. - 87 (Cœur droit). Obs. 101 Bayard et Chevallier. - 88. Obs. anim. 76 Smith. - Renv. 31 Orfila et Smith. - 89. Renv. 31 Orfila et Smith. - Obs. anim. 76 Smith. -90. Renv. 31 Orfila et Smith. — Obs. anim. 76 Smith. — 91. « entre les colonnes charnues du ventricule gauche et à la base des piliers de la valvule mitrale», Obs. 74 C James. — Obs. 59 Martineau et Liouville. — 92. Obs. anim 76 Smith. — Renv. 31 Orfila et Smith. — 93. Renv 31 Orfila et Smith. — Obs. anim. 76 Smith. — 94. Obs. anim. 76 Smith. - Renv. 31 Oafila et Smith - 95. Obs. 126 Tardieu. - Obs. 59 Martineau et Liouville. — Obs. 230 Wilks. — Obs. 329 Choulant. — Obs. 89 Orfila. — Obs. 328

- b. Épanchement séreux (avec cœur normal ou lésé; épanchement séreux d'après la couleur ou la consistance);
- c. Épanchement séroso-sanguinolent;
- d. Épanchement purulent.

MURRAY. - 96. « principalement sur les colonnes charnues », Obs. 238 Morgantier et Boissarie. - 97. Obs. anim. 77 Orfila. - 98. Obs. 77 Scheulen. - 99. «.... et du péricarde », Obs. 16 Acuilhon. — Obs. 77 Scheulen — 100. « et dans le péricarde », HENNELE, in Renv 149 IMBERT-GOURBEYRE. - 101. Voie vaginale, Obs. 426 MANGOR. -102. Obs. 192 E.-E. HOFFMANN — 103. Obs. 23 DE PLASSE. — 104. Obs. 77 Scheulen. - Obs. 237 Keber - 105. Obs. 101 Bayard et Chevallier. - 106. Hahnemann, « Ueber die Arsenikvergiftung », 1786, p. 80. - 107, Renv. 248 Imbert-Gourbeyre. - Smith, in Renv. 248 Inbert-Gourbeyre. - «Journal univers hebdom.», 1832. - 108. « Cœur mou, lâche, très-facile à déchirer », Obs. in Journ, univ hebdom.», 1832. — «Le muscle cardiaque est flasque, mou, jaunâtre », Obs. 59 Martineau. — Obs. 415 Letheby. — Obs. 16 AGUILHON. — Obs. 48 Chevallier. — Obs. 75 Kestern. — 109. Obs. 4 De Plasse — Obs. 23 DE PLASSE. -110. Obs. 101 BAYARD et CHEVALLIER. -111 Obs. anim. 76 Smith. - Obs. anim. 35 Plater, Catanel et Novati. — 112 Obs. anim 76 Smith. — 114. Obs. anim. 76 SMITH. - 115. Obs. 237 KEBER. -116 Obs 18 CHEVALLIER. - 117. Obs. 403 HOHNBAUM. - Obs. 237 Keber. - 118 Obs. anim. 35 Plater, Catanel et Novati. -- 119. Obs. 16 AGUILHON. - 120. Obs. 80 SCHMIDT. - 121. Obs KESTERN, in «Art médical», 1873, t. xxxvii, p. 103 — 122. « . . . et difficiles à isoler, surtout dans le ventrienle gauche ; par places, les stries transversales ont disparu complétement. Sur la cloison, on remarque des taches ecchymotiques et des ruptures de fibres complétement dégénérées et se perdant dans des amas de granulations », Obs. 197 Grohe et Mosler. - 123 Obs 90 BAYARD et CHEVALLIER. - 124. «.... comme momifié », Obs. 450 Keber. - 125. Renv 248 Imbert-GOURBEYRE. - 126. Obs. 363 WARD. - Obs. 400 WARD. - Obs. 401 GAIRDNER. -127. Obs 400 Ward - 128. Obs. 401 Gairdner. - Obs. 402 Dymock - 129. Obs. 192 E.-E. HOFFMANN. - 130. Obs. 239 Lespinas et Orfila. - 131. « avec épanchement rouge-brun », Renv. 149 Ward, in Imbert-Gourbeyre. — Obs. 126 Tardieu. — 132. «Le cœur est d'un volume considérable », Obs 54 Scoutetten. - 133. Obs. 427 PARKER. -134. Obs anim. 102 Van Dey - 135. Obs. anim 61 Stokwis. - 136. Renv. 248 IMBERT-GOURBEYRE. - Renv. 145 HERMANN. - Renv. 157. - Renv. 173 NAUNYN. -137. Grohe et Mosler, in Renv. 218 Imbert-Gourbeyre. - Obs. 76 Roth. - Renv. 173 NAUNYN - 138. Obs. 4 De Plasse. - Obs. 23 De Plasse. - Obs. 237 Keber. -139 Renv. 281 Proust -140. Renv. 81 Proust.-141. Renv. 248 Imbert-Gourbeyre. — Obs anim 61 Stokvis. — Saikowsky, in Renv. 248. — Obs anim 102 Vaudey. — 142. LOLLIOT, in Obs. 59 MARTINEAU. - Renv. 145 HERNANN. - Renv. 157. - 143. Obs. 59 MARTINEAU - 144 «Les lésions du tube digestif sont la rongeur, des ulcérations, des taches gangréneuses et des extravasations sanguines. Des phénomènes semblables se montrent du côté des organes de la circulation, de la respiration et de l'appareil génital, et parfois aussi vers les centres nerveux», Renv. 222 Gubler. — 145. Renv. 222 Gubler. — 146. Obs 48 Chevallier — « Cour ramolli et petit», Obs. 40 Aguilhon.—Obs 237 Keber. 147 Obs. 23 De Plasse. — 148. Par voie vaginale. Obs. 81 Brisken — 149 Obs 98 BAYARD. - 150 Obs. 93 KAYSER. - Obs. 371 TONNELIER - 151. Obs anim. 53 PLATER, CATANEI et Novati. - Obs. anim. 52 C. James. - 152. Obs. anim. 52 C. James. -153. Obs 32 DEVERGIE. - 154. Obs 101 BAYARD et CHEVALLIER. - 155 Obs. 192 E.-E. HOFFMANN. - Obs. 253 DE JAEGUER et VAN MEENEN. - Obs. 415 LETHEBY. -156. Obs. 90 Bayard et Chevallier. - 157. Obs. 59 Martineau et Liouville, «Les cavités du cœur renferment de nombreux caillots enchevêtrés de couleur rouge et gris, foncé ». - Obs. 30 Tardieu - 158. Obs. 4 De Plasse. - 159. « Sang noir, coagulé, d'un aspect analogue à celui de la gelée de groseille », Obs. 90 BAYARD et CHEVALLIER. — 160. Obs. anim. 99 Peuch. - 161. « Le plus souvent », Renv. 219 L Orfila. - Renv. 240 Orfila. -162. Obs. 372 GÉRARD DE BEAUVAIS. - Obs. 74 C. JAMES. - 163. Obs 126 TARDIEU.

- 3º Néoplasmes:
 - a. Concrétions albumino-graisseuses à la surface libre;
 - b. Adhérences pseudo-membraneuses des deux feuillets du péricarde.
- B. LÉSIONS DE L'ENDOCARDE:
 - 1º Lésions de la membrane séreuse :
 - a. Hyperémie (générale ou partielle);
 - b. Ecchymoses (générales ou partielles);
 - c. Épaississement;
 - d. Friabilité;
 - e. Néoplasmes: concrétions albumino-graisseuses générales ou partielles; polype.
 - 2º Lésions des valvules:
 - a. Hyperémie valvulaire avec ou sans lésion hypertrophique du cœur:
 - b. Inflammation des valvules;
 - c. Ecchymoses;
 - d. Épaississement.
- C. LÉSIONS DU COEUR (MUSCLE DU COEUR) :
 - 1º Couleur: pâle, brun-rougeâtre, brunâtre;
 - 2º Inflammation générale ou partielle, avec ou sans lésion hypertrophique;
 - 3º Ecchymoses dans le muscle ou dans les colonnes charnues;
 - 4º Consistance: cœur mou, ramolli, flasque, comme macéré; cœur ferme, dur, contracté...;
 - 5º Volume: cœur ratatiné, petit; cœur aminci; hypertrophie excentrique avec amincissement du muscle;—hypertrophie excentrique avec épaississement du muscle;—hypertrophie excentrique sans épaississement du muscle; hypertrophie du ventricule gauche avec amincissement du ventricule droit; hypertrophie concentrique;
 - 6º Dégénérescence graisseuse (stéatose générale ou partielle);
 - 7º Ulcération du cœur;
 - 8º Taches gangréneuses au cœur.
- D. ÉTAT DE VACUITÉ OU DE PLÉNITUDE des ventricules et des oreillettes du cœur.

Le tableau n° IV, consacré à des lésions anatomo-pathologiques externes, détermine, d'après les nombreuses observations que j'ai recueillies et que j'indique à chaque ligne (1), quelles sont dans l'état actuel de la science les

⁽⁴⁾ Notes au nombre de 94 se rapportant au tableau pathogénétique nº IV(ulcères cutanés) :

^{1.} Hahnemann. « Tr. de matière médic. homœop. » Paris, 4877, 3° édit. tom. 1, p. 426, symp. 1146. — 2. « Les éruptions arsenicales professionnelles ont offert, la plupart du temps, le caractère pustuleux et surtout ulcéreux » Imbert-Gourbeyre, « Art médical » 4871, t. xxxIII, p. 36. — « Nombre de faits prouvent

Scale Comment de pris de composite maises de l'accordination de l'acco	l'Icérations cutanées (Tableau III)	7.	Saul!	ı, ,	f	d'agi ;	nea c	ىد 1-	nton	to-po	etholo	grque	is ob	secué	0
The state of the control of the cont	1. Oans le cours de près de emquante années:	1	1	1 .	1	19	y .	يد	1	-		- Carlo	3.1	410	-81
math international programs desire and in manifestion and continuous and continuous and programs desire and the material programs desire and the material programs desired in the material programs de	To dans do experimentations failes sons so direction our discontinued as famille it our d'indise prosente. Same aprilement à done massives à done all'émisses et à dose infinitements.		-ş-	3.	3	al and	Sterney Stephe	od 1	pur c	d so	alton	s cha	alla e	cher	al her
Micro externe Micro externe Lentition paid i Polat Vulnitation Micro externe Lentition paid i Polat Vulnitation Micro externe Lentition paid i Polat Vulnitation Micro displacement on ulcinitum Micro externe Lentition paid i Polat Vulnitation Naturaliza qui Riginization on ulcinitum Micro externellize Micro incignition Micro Doub Polation Micro Doub Polation Micro Doub Polation Micro Doub Polation Micro oppound Micro opp	If Jan der as observe vas by d'internation, accidentelle en recourse relations en un leutone anne advenue	- Day	deace	o cel	unde fer	ulinoi Gaeg	land.	odler ett	dron on o	endi ejialo	oxic c ou	tune c	00000	coores	r seuce
Micrie externe Paratiems passé à l'état Valleination Montale qui Régistemt on alérations Micrie qui Régistemt on alérations Micrie extendisce Micrie reliendisce Micrie reliendisce Micrie reliendisce Micrie reliendisce Micrie reliendisce Micrie supparant abond à besienment très élevés Micrie supparant abond à besienment très élevés Micrie supparant abondamment Micrie supparant des disconférence de l'ulérie; il saigne quand on le peuse et se course d'une centré séde compélendi Micrie supparant abond à besi mattires adversasso H minte d'un ulérie une quande quantité de sang mandre et quaméleux Alfrein de la circonférence de l'ulérie; il saigne quand on le peuse et se course d'une centré séde compélendi Micrie se contant de chier bacter de l'ulérie; il saigne quand une abers insurportable Micrie se contant de chier bacter qui l'état es se course d'un centré séde ausse suppara s' ton fétite sonicieux Micrie ausse d'un centre d'un de centre s'elle course qui Micrie ausse charecente de l'ulérie s'elle ausse suppara s' ton fétite sonicieux Micrie ausse charecente de l'ulérie d'un d'un d'un d'ulérie d'un d'un d'un d'un d'un d'un d'un d'un	Die El done internes a de resultancer en la date infortentation des applications facts en la con-	influ	Labour	Craff	Loper Coper			interio	louta		lin o	expér ex pa	expér x pav	apoti apare	urpetin
Reinterne passe à l'hat Dubération Notatile qui déginérent en alérations Particle qui déginérent en alérations Particle qui déginérent en alérations Réire de profess Mérie à l'éginérent en alérations Mérie de profess Mérie à l'éginérent en alérations Mérie de profess Mérie à l'éginérent en alérations Mérie Dout l'e land de l'éginérent en définitions Mérie de l'active de l'éginérent en définitions Mérie de la broit airllés à pir (Amerière) Mérie de la broit de l'éginérent en définition (Amerière) Mérie de l'active de l'éginérent de l'éginérent l'éginérent dout d'am alérate observation De ainte d'un aléra en me grande quantité de song mondre de quantitée de la éginérent de l'alération de l'éginérent l'éginérent de l'active de l'éginérent l'éginérent de l'éginérent de l'aleration de l'éginérent de l'aleration de l'éginérent l'éginérent de l'éginérent de l'éginérent de l'éginérent l'éginérent de l'éginérent de l'éginérent l'éginérent de l'é	D. Dunahambarahan agui om thompton per vier gastrique, par e res corpratares 1 par con est terre. D. aguillo dura dia discriptiona generale aux l'action plignologique de l'aroun	Par J	Par col	par all	14	dame	land on	dans	in our	dans	da	dans		lans a	
Parattima passé à Chat Valeriation Maienda qui Régistreun en alériations Materia qui Régistreun en alériations Mière enbordaire Mière enbordaire Mière proposition Mière proposition Mière proposition Mière proposition Mière proposition Mière supparant abondamment Mière de bende taillé à pir chamerade) Mière supparant abondamment Mière de paratte taillé à pri chamerade) Mière supparant abondamment Mière de paratte de circonfèrence de l'ulière; il carque quando une parate de circonfèrence de l'ulière; il carque quando un le parate de circonfèrence de l'ulière; il carque quando un le parate de convert d'une circite siche supplicable Mière su converant de chaire baccare; il decrent promptement patrité, film et vert, similarit un ichie canedicence qui régiand une debent inneppetuable Mière paraginenza Mière de canedicent Mière paraginenza Mière de canedicent de canedicent Mière de canedicent de canedice		/			9	.2				11				- 3	
Novembra of Agrahiem on alkénations Moère ortheathire Moère inségnitée Moère ortheathire Moère profesion Moère Moère Moère Moè				6	,					,	S				
Mérie rivigalites Mérie trisquifes Mérie trisquifes Mérie d'issi profess Mérie congrant Mérie congrant Mérie congrant Mérie d'issi profess Nérie d'issi profess Mérie d'issi profess Mérie d'issi baccano e il Devent promptomat putrile, libre et vert, anintant un rébes conceliens qui répand une adeut insupportable Mérie reniteure Mérie d'issi d'issi baccano e il Devent promptomat putrile, libre et vert, anintant un rébes conceliens qui répand une adeut insupportable Mérie reniteure Mérie d'issi d'issi baccano e il relevés avec arappura : lim fétile automati à bacdo d'issi conference qui répand une adeut insupportable Mérie avec l'anintant un rébes conceliens qui l'issi fétile automati à bacdo d'issi d'i	Vésicules qui dégénérent en ulcérations				.2					10					
Mérie très grofend Mérie John the berds deviennent très élocés Mérie de boud table à pir chimerature Mérie John the berds deviennent très élocés Mérie companion a choudement Mérie John au lième une grande quantité de sang mandre et grunnelius Jufflammation de la circonférence de l'ulicire, il saigne grand on le pause et se couve d'une croîte siche ouperficult Mérie songenant de châis bacense; il teorent promptement putrité, blan et cert, anintant un rélève cancéreure qui régrand une doire insupportable Mérie gangréneure Mérie gangréneure Mérie gangréneure Mérie gangréneure Mérie desmourent songuineleute Mérie assec élancoments deuthouse eur élucis avec suppura : tien fétule songent sanguineleute Mérie assec élancoments deuthouseur surtout étant avoir, for fétule aussent sanguineleute Mérie assec élancoments deuthouseur surtout étant avoir, confarje au la attien droite et calimé outout par la marche deut de madant Mérie assec élancoments deuthouseur surtout étant avoir, confarje au la attien droite et calimé outout par la marche deut de miditure dans les utéries outours par la marche deut de miditure dans les utéries doulleurs brailleure dans méries comme su l'on prome ; and deute de miditure dans les utéries qui jusque ella datient deuthouseurs d'anieure deute par la frai autour d'an utérie compone peus pisibleure et assemplement d'anie de deuteur de fétilleure de sousies de pruit autour d'an utérie douteur de fétilleure d'anoire qui cet extrément fétile eu empune peus failleure et assemplement d'anie d'a deute avec compissement général Méries du cuix chosoli Méries aux camiquissement glacéral Méries du cuix devolt s'étendant jusqu'au mitteu du fant Méries du cuix devolt Méries aux camiquissement glacéral Méries du cuix devolt s'étendant jusqu'au mitteu du fant Méries du cuix devolt Méries du caux divolt Méries aux aincelles Méries du caux divolt de fétilleure de la consisse et aux pimbes Méries du caux atalleure					12		1.3			14	1.5				16
Mérie Paul de Barts seriemment très élevés Mérie Dan le Barts seriemment très élevés Mérie a granelant Mérie apparant abendamment Mérie Ponnant écone à l'as mattières chorenaes 27 d'uninté d'un alève une grande quantité de sang nombre et granelane Juffammation de la circonférence de l'alère; il saigne grand on le pause et se course d'une écolité séde enpediende Mérie a convent de châis baceure, il Denent promptement putride, filen et cert, mintant un icher canceleure qui répard une adeut inompositable Mérie a convent de châis baceure, il Denent promptement putride, filen et cert, mintant un icher canceleure qui répard une adeut inompositable Mérie convent de châis baceure, il Denent promptement putride, filen et cert, mintant un icher canceleure qui répard une adeut inompositable Mérie convent auguinelente Mérie convent auguinelente Mérie convent auguinelente Mérie convent auguinelente Mérie convent de brail brail de callué autou par la marche 12 de de l'aliente de convent de callué autou d'un alcère Ounleur de brailante adoit de purit autour d'un parme e nait Desson un charles nouvelent Dendeur de brailante adoit de purit autour d'un alcère Ounleur de brailante adoit de purit autour d'un ulcère, non dans l'alère même qui est extrémement fétide ensempsus peu faibleure d'une part de purit autour d'un ulcère, non d'une l'alière même qui est extrémement fétide ensempsus peu faibleur d'une part de purit autour d'un ulcère, non d'une l'alère même qui est extrémement fétide ensempsus peu faibleur d'une de purit autour d'un ulcère en de la fait de l'alière d'une d'une de l'une d'une de l'une d'une d'une Denen de la fait d'une autoir de peut autour d'un ulcère en d'une d'	and the second s														17
Meire 2 de bodo taillés à pie (chanciste) Meire songeant Meire supparant abondamment Meire songeant Meire content tome 2 hos mattires observance If mind Van alève une grande quantité de rang nouidre et grannelone Meire content de la circonférence de l'alière; il saigne quand on le pause et se courre d'une croîte sielle superfiedl Meire son elle circonférence de l'alière; il saigne quand on le pause et se courre d'une croîte sielle superfiedl Meire son elle time de cet courre d'une croîte sielle superfiedl Meire son elle time de cet courre d'une croîte sielle superfiedl Meire paugièneme Meire quagièneme Meire gaugièneme Meire sonseine Meire s															
Meire wageant Meire songeant Meire croiter Meire game of se careficence de l'ulière; il saigne guand on le pauce et se cource d'incercivite sielle oppellacte Meire croiteur Meire se consent de chair baveaux; il derent gromptoment putrice, blies et cert, avintant un icher conceleure qui répaul une odent inapportable Meire gangieneux Meire dangieneux Meire da		00		}			7.7			20	27				
Mesice comparant abundamment Mésice domaint ione à low matières chorenses Of antité d'un désire une grande quantité de sang antiète t quamelleux Inflammation de la circonférence de l'alières, il saigne quand on le pause et se course d'une cointe sièlle angeliedle Mésice contentant à colair baccence jul d'enemt promphement putitible, fleu et cert, ouititant un icher consciente qui sépand une odeux inaupportable Mésice quangiéneux Mésice (anexière) à bond durs et relevés avec suppura : tien féture souvent aunquinclente Mésice conceilenx Mésice domesienx Mésice										93	24				
Meire Jonnant ione à des matières chrecuses Nominale dan alère une grande quantité de rang noviative et granneleux Nonflammation de la circonférence de l'alère il raique quand en le panse et se couvre d'une civilé oéché superficult Méire e roiteux Méire e roiteux Méire e converant de chair bacence, il decrent promptoment putride, filen et vert, mintant un icher cancéreux qui répand une oder i insupportable de l'été (cancrotte) à bend dus et relecés avec ouppura : lien félide souvent auguinoleute Méire (cancrotte) à bend dus et relecés avec ouppura : lien félide connectu ounguinoleute Méire avec élancement donloureux ou tout dant avoix, soullagé par la otation doite et calmé outstud dant avoix, soullagé par la otation doite et calmé outstud dant avoix, soullagé par la otation doite et calmé outstud dant avoix, soullagé par la otation doite et calmé outstud dant avoix. Jonaleur de bisilière comme par du feu autour d'un ulcère que mai de l'été de de la coute de calmé outstud part avoix de combine de bisilière comme par du feu autour d'un ulcère que ma de l'été de la coute de l'été coute de l'été coute de l'été de l'		25	36							.,,	4-7				
Meinte dan ulérie une grande quantitées scherences Il suinte d'un ulérie une grande quantité de sang nouidre et granneleux Inflammation de la circonférence de l'ulérie, il acique guand on le panse et se courre d'une croîte éche superfiedle Méère concrant de châis baceure, il descrent promptement putride, filen et vert , onintant un icher cancéreux qui régand une odeur insupportable Méère gangréneux Méère donneur danguineleute Méère cancéreux Méère cancéreux Méère cancéreux Méère cancéreux Méère avec d'ancomonte douboureux ou tout étant avoir, coullage par la station droite et caliné autout par la marche Ondeux de brillure comme par du feu autour d'un ulérie, coullage par la station droite et caliné autour d'un ulérie, coullage par la station rédent Ondeux de brillure comme qui cot extrémement fétile en suppure peu faiblisse et assentient dans la journée Ondeux de brillure comme qui cot extrémement fétile en suppure peu faiblisse et assentient dans la journée Oouleux de brillure comme qui cot extrémement fitile en suppure peu faiblisse et assentient d'an uléries Oouleux de brillure comme par du feu autour d'un ulérie Oouleux de brillure comme par du feu autour d'un ulérie Oouleux de brillure comme par du feu autour d'un ulérie Oouleux de brillure comme par du feu autour d'un ulérie Oouleux de brillure comme par du feu autour d'un ulérie Oouleux de brillure comme par du feu autour d'un ulérie Oouleux de brillure comme par du feu autour d'un ulérie Oouleux de brillure comme par du feu autour d'un ulérie Oouleux de brillure comme de partit autour d'un ulérie Oouleux de brillure comme de partit autour d'un ulérie Oouleux de brillure comme de partit autour d'un ulérie Oouleux de cuix chevel Méère auce amaignisement ginère d'un milieu du font Méère auce amaignisement ginère d'un milieu du font Méère auce amaignisement ginère d'un milieu du font Méère aux eux de cuix chevel Méère aux eux de les Méères aux autour Méères du cuix chevel							27								
de grumelaux Inflammation de la circonférence de l'ulcère, il saigne quand on le pause et se course d'une croîte séche ouperfectel Mérère occurrant de chair baceure, il describe uperfectel Mérère occurrant de chair baceure, il describe qui répand une odeur insupportable Mérère (convenide) à bordo durs et relevés avec suppura : tion fétide souvent songuinelente Mérère describent Mérère de	41.3	25			2.2	30									
Inflammation de la circonférence de l'uléries il saigne quand on le pause et se course d'une civilte séche superficiélé llucive et conférence l'une civilte séche superficiélé llucive et conférence l'une d'est d'accure ; il decient promptement putitibe, bleu et vert pair une pertre table. Méère gangrénence l'une object is une portable llucive gangrénence l'une propose par la destine d'accourse d'accourse l'une product l'une product l'une fétiles convent sanquinclente llucive concriteure llucive deudonieure llucive deudonieure l'une fétiles convoluit d'autonité de caliné autont par la marche soulagé par la station droite et caliné autont par la marche soulagé par la station droite et caliné autont par la marche soulagé par la station de l'une prome : nait dessars une diaction arbeit d'année de la marche de builture acceldant à d'a princit d'en prome : nait dessars une diaction arbeit d'année d'année de l'une	- Il suinte d'un ulcère une grande quantité de sang nomâtre														
quand on le pause et se couver d'une croîte séche superficelle Mérie se constant de chair baveure; il decrent promptement putitife, fleu et vert, suintant un réher cancéreux qui répand une odeux insupportable Mérie gaugnémeux Mérie (cancrière) à berde durs et relevés avec suppura : im fétide soncent sanguinelente Mérie conceineux Mérie conceineux Mérie avec élancements doubeureux suitent élant assis, soullagé par la station driét et calmé outant par la marche Douleux de buillure succédant à du privit Jenestime de suiture dans un eléctre comme su l'on prome ; nait Dessus un charton arbent Douleux buillante dans les uléctres Douleux de limiture dans ul méries qui est extrémement fétide en suppure par, faithere et asomptionment dans la journée Douleux de limiture dans les uléctres Douleux de limiture dans les uléctres Douleux de limiture dans les uléctres Douleux de limiture dans les uléctres qui jusque-là étaient undelents Mérie avec amaignissement général Mérie avec amaigrissement général Mérie aux ainselles Méries our le cuix chevelu s'éloudant jusqu'au milieu du fiont Méries our le cuix chevelu Méries aux ainselles Méries aux fonts Méries aux parties génétales Méries au serotum	et grumeloux	31													
Mêire o constant de chair bavence ; il teorent promptement putitive, ellen et vert, ouintant un rether cancelvene qui répand une odeur insupportable Méire gangréneux Mêire (canceride) à borde dues et relevés avec empura : tien fêtide souvent sanguinelente Mêire cancéreux Mêire doulonceux Mêire doulonceux Mêire avec élancements doulouseux ou tout élant avia . 27 29 40 41 45 Mêire mordant Mêire avec élancements doulouseux ou tout élant avia . 28 29 40 41 45 42 45 43 46 44 45 45 46 46 46 47 45 48 46 49 40 40 41 42 41 45 42 40 43 41 42 44 45 45 46 46 47 47 45 48 46 48 46 48 46 48 46 48 46 48 46 48 46 48 46 48 46 48 46 48 46 48 46 48 46 48 46 48 46 48 46 48 46 48 47 48 47 48 47 48 48									1						
Meser or converned De chair baccourse, il Desiral promptoment put ide, filen et vort, onintant un icher cancel eine qui répand une odeux insupportable. Meser (cancriole) à bord dus et relevés avec suppura : tim flithe souvent sanguinelente. Meser cancéreux Méser cancéreux Méser avec élanoments doulouseux ou tout étant avoix, onlagé par la station doile et calmé outout par la marche doubleur de buillous ancoulouseux ou tout étant avoix, onlagé par la station doile et calmé outout par la marche doubleur de buillous ancoulours du nu leire, non dans l'ulaire ancolant à du prusir. Douleur de buillous dans un ulcires comme a l'on prome : noit devand ou de buillous ancours la ulcires comme a l'on prome : noit devand ou de buillous entent par la fact autour d'un ulcère, non dans l'ulcère même qui est extrémement fétide en suppur peu, faiblous et auxenjacement dans la journée douleur déblisante dans les ulcères des sideure même qui est extrémement fétide en suppur peu, faiblous et auxenjacement dans la journée douleur déblisante dans les ulcères des sideures dans les ulcères des sideures dans les ulcères qui jusque l'a étaient insolents Méser aux acce amaigrissement général Méser aux acce amaigrissement général Méser aux acce dans des dux orteils Mésers aux aines Mésers aux joulées Mésers aux poulées		2.2			,						0				
putride, bleu et vert, mintant un icher canceleux qu'i icépand une odier innupportable Meère gangréneux Meère (cancride) à bords dues et relevés avec suppura : tion fétide souvent sanguineleute Meère accideux Meère douloureux Meère douloureux Meère mordant Douleur de brillure succèdent à du purit Sensation de brillure succèdent à du purit Douleur de brillure soume par du feu autour d'un ulcère, non dans l'ulcère mome qu'i est extrémement fétide er, suppure peu faibleour et assempissement d'ann al-cère Douleur de brillure conivie de purit autour d'un ulcère Ourleur de brillure succèdeur d'anne la juranée Douleur de brillure conivie de purit autour d'un ulcère Ourleur de brillure conivie de purit autour d'un ulcère Ourleur de brillure succèdent Meère acce amaigrissement général Meère aux éliment Meère aux eniment Meère aux enimes Meère aux aines Me	11.7	UÜ		01	رون						36	3%			
scépand une objecte inompportable Moire gangrieneux Méric (camerido) à bond durs et relevés avec suppura : tion sétide somment sangrainolente Méric camerinex Méric doubniceux Méric doubniceux Méric doubniceux Méric avec élancoments doubniceux ou tout étant avois , soulagé par la otation droite et calmé auront par la marche Obuleur de britaire dans uncédant à du pranet Sensation de britaire dans un uleère comme ou l'on prome ; nait devous un charbon ardent Doubeur de britaire comme par du seu catémement sétide en- ouppure peu, saiblesse et assoupissement dans la journée Obuleur de britaire vouive de prurit autour d'un uleère non dans l'uleères même qui cat certemement sétide en- ouppure peu, saiblesse et assoupissement dans la journée Obuleur de britaire vouive de prurit autour d'un uleère Obuleur de britaire vouive de prurit autour d'un uleère Obuleur de britaire vouive de prurit autour d'un uleère Obuleur de britaire vouive de prurit autour d'un uleère Obuleur de britaire dans les uleères Obuleur de britaire dans les uleères Obuleur de britaire vouive de prurit autour d'un uleère Obuleur de britaire de prurit autour d'un uleère Obuleur de britaire vouive de prurit autour d'un uleère Obuleur de britaire vouive de prurit autour d'un uleère Obuleur de britaire vouive de prurit autour d'un uleère Obuleur de britaire vouive de prurit autour d'un uleère Obuleur de britaire vouive de prurit autour d'un uleère Obuleur de britaire vouive de prurit autour d'un uleère Obuleur de britaire vouive de prurit autour d'un uleère Obuleur de britaire vouive de prurit autour d'un uleère Obuleur de britaire vouive de prurit autour d'un uleère Obuleur de britaire vouive de prurit autour d'un uleère Obuleur de britaire vouive ent entre de	00														
Meire gangièneae Meire (senervià) à boid duis et relevés avee suppura : tion fêtide comeent canquinclente Meire douloneaux Méire douce étaneaments douloureaux ou tout étant avoia , coulagé par la station droite et calimé ourtout par la marche Qouleur de buillure dans un uleire somme par la marche Couleur de buillure dans les uleires comme ou l'on prome ; noit desous un charten arient Qouleur de buillure comme par du feu autour d'un uleire , non dans l'uleire même qui cot extrémement fétile ers compute peur faithèse et assomptissement dans la journée Qouleur de buillure ouivie de puncit autour d'un uleire Qouleur de buillure ouivie de puncit autour d'un uleire Qouleur de buillure ouivie de puncit autour d'un uleire Qouleur de buillure ouivie de puncit autour d'un uleire Qouleur de buillure ouivie de puncit autour d'un uleire Qouleur de buillure ouivie de puncit autour d'un uleire Qouleur de buillure ouivie de puncit autour d'un uleire Qouleur de buillure ouivie de puncit autour d'un uleire Qouleur de buillure ouivie de puncit autour d'un uleire Qouleur de buillure ouivie de puncit autour d'un uleire Qouleur de buillure ouivie de puncit autour d'un uleire Appendeur de buillure ouivie de puncit autour d'un uleire Appendeur de la face Appendeur de buillure ouivie de puncit autour d'un uleire Appendeur de la face Appendeur de la			35												
Merico (caneriore) à bord duro et relevés avec suppura : tion fétide souvent sanguinelente Merico denavirone Merico doulouroux Merico doulouroux Merico doulouroux Merico doulouroux Merico doulouroux Merico doulouroux Merico avec élaneemento doulouroux ou tout étant avoia soulagió par la station divide et caliné austant par la marche denation de brillare duro étant à du prurit denation de brillare dans les ulcères Obuleur brillante dans les ulcères Obuleur brillante dans les ulcères Obuleur de brillare comme par du feu autour d'un ulcère non dans l'ulcère même qui est extrêmement fétide en suppure peur faibleux et avoupissement dans la journée Obuleur de brillare suivic de prurit autour d'un ulcère Obuleur de brillare suivic de prurit autour d'un ul					3.9	.10				.11	110				
Meire cancérenx Méire doulousoux Meire mordant Méire avec élancomento Douloureux ou tout étant avoix voulagé par la otation droite et calmé outent par la marche doulour de britlaire dans la printe densation de britlaire dans un référe comme en l'ou prome = naît dession un charbon ardent doulour britlante dans les ulcères Oouleur britlante dans les ulcères Oouleur britlante dans les ulcères Oouleur de britlaire comme par du feu autour d'un ulcère, non dans l'ulcère même qui est extrémement fâtide en ouppure peu, faibleve et avocupissement dans la journée Oouleur de britlaire entière de printit autour d'un ulcère, non dans l'ulcère méme qui est extrémement fâtide en ouppure peu, faibleve et avocupissement dans la journée Oouleur défitiante dans les ulcères dentières de défitante dans les ulcères dentières de cour chével d'étendant jusqu'au milieu du fiont Méère aux le cuie chévelu s'étendant jusqu'au milieu du fiont Méère ou cui chévelu s'étendant jusqu'au milieu du fiont Méère ou cui chévelu s'étendant jusqu'au milieu du fiont Méères aux le cuie chévelu s'étendant jusqu'au milieu du fiont Méères aux le cuie chévelu s'étendant jusqu'au milieu du fiont Méères aux le cuie chévelu s'étendant jusqu'au milieu du fiont Méères aux le cuie chévelu s'étendant jusqu'au milieu du fiont Méères aux le cuie chévelu s'étendant jusqu'au milieu du fiont Méères aux le cuie chévelu s'étendant jusqu'au milieu du fiont Méères aux le cuie chévelu s'étendant jusqu'au milieu du fiont Méères aux le cuie s'étendant jusqu'au milieu du fiont Méères aux le cuie s'étendant jusqu'au milieu du fiont Méères aux de cuie chévelu s'étendant jusqu'au milieu du fiont Méère aux de cuie chévelu s'étendant jusqu'au milieu du fiont Méère aux de cuie chévelu s'étendant jusqu'au milieu du fiont Méère aux de cuie chévelu s'étendant jusqu'au milieu du fiont Méère aux de cuie chévelu s'étendant jusqu'au milieu du fiont Méère aux de cuie chévelu s'étendant jusqu'au milieu du fiont Méère aux de cuie chévelu s'étendant jusqu'au milieu du fiont Méère aux de cuie															
Merre doubouroux Merre avec élancoments doubouroux ou tout étant avoia coulagé par la station droite et calmé anitout par la marche de	tion létide souvent sanguinolonte				1.3										
Merico mordant Merico avec élancomento douloureux ou tout élant avoia, soulagé par la obution droite et calmé antout par la marche. Oulour de brûlure succédant à du prurit dinat avoia de promos mait decous un charbon ardent Ooulour brûlante dans un ulérie comme si l'ou promos mait decous un charbon ardent Ooulour brûlante dans les uléries Ooulour de brûlure comme par du feu autour d'un ulérie, onto dans l'uléries même qui cot extrémement fétide en suppure peu faibleve et avoupissement dans la journée. Ooulour de brûlure onivie de prurit autour d'un ulérie de l'ulerie de prurit autour d'un ulérie de l'ulerie de l'ulerie dans les uléries qui jusque-là étaient indelents Merine de cuir chevelu s'étendant jusqu'au milieu du front uléries aux elevres Merines aux éteries Merines aux éteries Merines aux ainselles Merines entre les cuisses et aux jambes Merines entre les cuisses et aux jambes Merines entre les cuisses et aux jambes Merines aux jambes Merines aux parties génitales Merines aux parties génitales Merines aux parties génitales Merines aux parties génitales	and the second s	١	.47	1.5	116					1%	118				
Merce avec chancements douboureux ou tout étant avoir , outlagé par la station droite et calmé outlout par la marche							00	0/							
soulagé par la station divite et calmé suitent par la marche d'Ondlour de brillare succédant à du prarit denoation de brillare dans un ulcère comme on l'on prome : mait dessus un charbon ardent doubleur brillare dans les ulcères d'Ondleur brillare dans les ulcères d'Ondleur de brillare comme par du feu autour d'un ulcère, non dans l'ulcère même qui cot extrêmement fétide en suppure peu faiblesse et assoupissement dans la journée d'Ondleur de brillare soivie de prurit autour d'un ulcère d'Ondleur de brillare soivie de prurit autour d'un ulcère des différes avec amaigrissement général ulcères qui jusque-là étaient indollents ulcères qui jusque-là étaient indollents Ulcère aux care amaigrissement général ulcère sur le cuir chevelu ulcère sur le cuir chevelu s'étendant jusqu'au milieu du fant Ulcère sur le cuir chevelu s'étendant jusqu'au milieu du fant Ulcère sur le cuir chevelu s'étendant jusqu'au milieu du fant Ulcères aux dieselles ulcères aux jambes Ulcères aux jambes Ulcères aux jambes ux jambes		17 Y													
Douleur de brûlare dans un alerte Jenation de brûlare dans un alerte Douleur brûlante dans les alectes Oouleur de brûlare dans les alectes Oouleur de brûlare comme par du feu autour d'un alecte, non dans l'alecte même qui est extrémement fétile en ouppure peu, faiblesse et assoupissement dans la journée Oouleur de brûlare suivie de prurit autour d'un alecte Oouleur de brûlare suivie de prurit autour d'un alecte Oouleur de brûlare suivie de prurit autour d'un alecte Oouleur de brûlare suivie de prurit autour d'un alecte Oouleur de brûlare suivie de prurit autour d'un alecte Oouleur de brûlare dans les alectes densibilité douloureuse d'anciens alectes qui jusque-lâ étaiont indolents Meère aux anaigrissement général Meère aux elevelu s'étendant jusqu'au milieu du front Meères aux les les cuis chevelu s'étendant jusqu'au milieu du front Meères aux aisselles Meères aux aisselles Meères aux aines Meères aux jambes Meères aux salons Meères aux serotum		5.3													
Denoation de brûlure dans un ulcère comme su l'on prome su did dessus un charbon ardent Douleur brûlante dans les ulcères Oouleur de brûlure comme par du feu autour d'un ulcère, non dans l'ulcère même qui est extrêmement fétide expoupeure peur faiblesse et assoupissement dans la journée dou de brûlure suivie de prurit autour d'un ulcère den des la foureuse d'anciens ulcères qui jusque-là étaient indolents Meère duc cuir chevelu d'enciens ulcères qui jusque-là étaient indolents Meère duc cuir chevelu s'étondant jusqu'au milieu du front flleères aux le cuir chevelu s'étondant jusqu'au milieu du front flleères aux disselles Meères aux disselles Meères aux aisselles Meères aux aisselles Meères aux aisselles Meères aux jounbes Meères aux sons génitales Meères aux sons génitales Meères aux sons génitales Meères aux sons génitales	3 000 3 3			34											
Douleur brûlante dans les ulcôres Oouleur de brûlane comme par du feu autour d'un ulcôre, non dans l'ulcôres même qui cot extrémement fétide es, ouppure peu, faiblesse et assonpissement dans la journée Oouleur de brûlare suivie de pruit autour d'un ulcôre Oouleur déclirante dans les ulcôres qui jusque-là étaient indolents Ulcôre avec amaigrissement général Ulcôre avec amaigrissement général Ulcôre avec amaigrissement général Ulcôres our le cuir chevelu s'étendant jusqu'au milieu du front Ulcôres our le cuir chevelu s'étendant jusqu'au milieu du front Ulcôres aux aisselles Ulcôres aux aisselles Ulcôres aux aisselles Ulcôres aux joundes Ulcôres aux parties génitales Ulcôres aux parties génitales Ulcôres aux serotum					,										
Oouleur de brûlure comme par du feu autour d'un ulcère, non dans l'ulcère même qui cot extrémement fétide est ouppure peu, faiblèse et assoupissement dans la journée (%) Oouleur de brûlure suivic de prurit autour d'un ulcère (%) Oouleur déchirante dans les ulcères qui jusque-là étaient indolents Ulcère avec amaigrissement général Ulcère avec amaigrissement général Ulcère ou le cuir chevelu s'étendant jusqu'au milieu du front Ulcères our le cuir chevelu s'étendant jusqu'au milieu du front Ulcères our le cuir chevelu s'étendant jusqu'au milieu du front Ulcères our le cuir chevelu s'étendant jusqu'au milieu du front Ulcères our l'erres Ulcères aux aisselles Ulcères aux aisselles Ulcères aux aisselles Ulcères aux jounbes Ulcères aux jounbes Ulcères aux jounbes Ulcères aux jounbes Ulcères à l'anus Ulcères à l'anus Ulcères à l'anus Ulcères aux parties génitales Ulcères aux serotum	nait decom un charbon ardent	ززر													
non dans l'inlètes même qui cot extrémement fétide en ouppurs peur faibleme et assomptissement dans la journée 1907. Ontleur de brûture suivie de prurit autour d'un ulcère 1909 on deur de leur de l		36		3%											
ouppure pen, faiblisse et assonpissement dans la journée (18) Oouleur de l'ithure autoir de prurit autour d'un ulcère (19) Oouleur déclitante dans les ulcères qui jusque-là étaient indolents Ulcère avec amaigrissement général Ulcère avec amaigrissement général Ulcère ou le cuir chevelu s'étendant jusqu'au milieu du fant Ulcère ou le cuir chevelu s'étendant jusqu'au milieu du fant Ulcères aux l'evres Ulcères aux disples et aux orteils Ulcères aux aines Ulcères aux aines Ulcères aux jambes Ulcères aux talons Ulcères aux parties génétales Ulcères aux parties génétales Ulcères aux parties génétales Ulcères aux sons aux parties génétales Ulcères aux sons aux parties génétales Ulcères aux sons aux parties génétales															
Oouleur de Brithere suivice de prurit autour d'un aleère 5,9 Oouleur déclitante dans les aleères qui jusque-là étaient molleurs d'un ensibilité doubureure d'anciens aléères qui jusque-là étaient molleurs des des des des des des des des des de		i.e													
Doublens Mehitaante dans les uleëres Sensibilité doubureuse d'anciens uleëres qui jusque-là étaient indolents Whêire avec anneigrissement général Wheire avec anneigrissement général Wheire avec liveselu Mheires aux le cuir chevelu s'étondant jusqu'au milieu du front Mheires aux lèvies Mheires aux disselles Mheires aux ainselles Mheires aux ainselles Mheires aux ainselles Mheires aux jambes Mheires aux partics génitales Mheires aux serotum	Doulous de Brilling minis de musit autous d'un ul visa	F													
clations involents Meiro acce amaigrissement général Meiro du cuir chevelu s'étendant jusqu'au milieu du front Meiro du cuir chevelu s'étendant jusqu'au milieu du front Meiros aux clives Méiros aux clives Méiros aux disselles Méiros aux aixelles Méiros aux tanes Méiros aux jambes Méiros aux jambes Méiros aux jambes Méiros aux talons Méiros aux patitos génitales Méiros aux patitos génitales Méiros aux serotum															
clations involents Meiro acce amaigrissement général Meiro du cuir chevelu s'étendant jusqu'au milieu du front Meiro du cuir chevelu s'étendant jusqu'au milieu du front Meiros aux clives Méiros aux clives Méiros aux disselles Méiros aux aixelles Méiros aux tanes Méiros aux jambes Méiros aux jambes Méiros aux jambes Méiros aux talons Méiros aux patitos génitales Méiros aux patitos génitales Méiros aux serotum	Sonsibilité Soulourouse Sancions ulcores qui jusque la														
Morre du cuir chevelu Morre du le cuir chevelu d'étendant jusqu'au milieu du front Morre du le face Morres aux d'estes Morres aux doigts et aux orteils Morres aux aines Morres entre les cuisses et aux jambes Morres aux jambes	staient indolents	67													
Meire sur le cuix chevelu s'étondant jusqu'au milieu du front Méires à la face Méires aux livres Méires aux aisselles Méires aux aisselles Méires aux aines Méires aux aines Méires aux jointes et aux jambes Méires aux parties génitales Méires aux parties génitales	Moère avec amaigrissement général				6.2	63									
Maries à la face Maries aux lores Maries aux aisselles Maries aux aisselles Maries aux aisselles Maries aux aisselles Maries aux aisses Maries aux jambes				1							00				
Mheires aux disselles Mheires aux aisselles Mheires aux disselles Mheires aux jambes Mheires aux jambes Mheires aux talons Mheires aux talons Mheires aux parties génitales Mheires aux parties génitales Mheires aux parties génitales	Morris à la lan														
Moères aux aixelles Moères aux doigts et aux orteils Moères aux doigts et aux orteils Moères entre les cuisses et aux jambes Moères aux jambes Moères aux talons Moères ai l'anus Moères ai l'anus Moères aux parties génitales Moères aux parties génitales		03		6.9											
Meires aux doigts et aux ortoils Moires aux aines Meires entre les cuisses et aux jambes Meires aux jambes Meires aux talons Meires à l'anus Meires à l'anus Meires au serotum				10	11					12	13				
Meireo entre les cuisses et aux jambes Meires aux jambes 39 87 87 89 87 89 87 Meires aux talons 1	Meères aux doigh et aux orteils				11					10	16				
Medico aux jambes										17	15				
Mleères aux talons Meères à l'anus Meérations aux parties génitales Méères au serotum 22,27		0.	13.4		10		a.			50	87				
Merrations aux parties génitales Merrations aux parties génitales Merres au serotum		00	00	S:	50	.5:	04								
Meration aux parties génétales Méries au serotum 92 92 93					1,767	85		50							
Illicites an serolum 197 192 9.7					.90										
Medico nu soin	Meeres an serolum				.91					.92	,2,3				
	Medies an sein			1			.27								



LÉSIONS ANATOMO-PATHOLOGIQUES ULCÉRATIVES DE LA PEAU, essentiellement propres à l'action pathogénétique de l'arsenic.

J'expose les lésions suivantes :

- 1º Ulcères externes en général;
- 2º Paratrima, vésicules ou pustules passant à l'état d'ulcération;

la tendance de l'arsenie à produire l'ulcération », Imbert-Gourbeyre, « Art médical», 1872, t. xxxiv, p. 187. — Renv. 174 Naunyn. — 3. «Aux deux talons», Obs. 22 Gilbert. - Renv. 473 Naunyn. - 4. Imbert-Gourbeyre, « Art médical », 1871, t. xxxIII, p. 36. — Scheffler. « Gesundheit der Bergleute », 1770. — KLINGE. « Hufeland's Journal » t. xi. — Renv. 281 Proust. — 5. « Le douzième. jour, au cuir chevelu. » Observ. 296 Schulze. — Imbert-Gourbeyre, « Art médical », 4874, t. xxxIII, p. 36. — Scheffler, « Gesundheit der Bergleute, » 4770. - Klinge, «Hufeland's Journal », t. xi. - Trousseau, Pidoux et Const. Paul, « Traité de Thérapeutique », 4876, t. 1, p. 204. — Renv. 281 Proust. — 6. KLINGE in Hahnemann, « Matière médicale », 1877, p. 429, symp. 1201. — 7. Brockmann, « Die Metallurgischen Krankheiten des Oberharzes », 1851. - 8. Brockmann, ibid. - 9. Renv. 122 Imbert-Gourbeyre. - Renv. 174 Naunyn. - 10. Renv. 204 NOTHNAGEL. - Renv. 174 NAUNYN. - 11. Renv. 204 NOTHNAGEL. - Renv. 174 NAUNYN. — 12. Reny. 487 Delioux de Savignac. — 13. Bazin. — 14. Reny. 221 Gubler.— Lallier in Reny. 221 Gubler.—15. Observ. 297 Thilenius.—Reny. 221 Gubler. — Lallier, in Renv. 221 Gubler. — Renv. 225 Hirtz. — 16. Observ. animaux 408 Renault. - 17. Observ. anim. 408 Renault. - 18. « A la face antérieure de la jambe », Obs. 5 De Plasse et Coppée. — « Au sein », Obs. 9 DE PLASSE et COPPÉE. - 19. « A la jambe », Obs. 5 DE PLASSE et COPPÉE. -20. Brockmann, « Die Metallurgischen Krankheiten », 1851. — 21. Brockmann, « Die Metall... » - 22. Hahnemann, « Matière médic. », 1877, t. 1, p. 426, symp. 1117. - 23. Lallier, in Renv. 221 Gubler. - 24. Trousseau, Pidoux et C. Paul, « Tr. de Thérap. », 1876, t. i, p. 395. - Renv. 224 Gubler-Sallier, in Renv. 224 Gubler. — 25. « A la lèvre, causant le soir lorsqu'on est couché, et le jour lorsqu'on remue, une douleur lancinante et mordante comme si la place était couverte de sel; aggravation au toucher et à l'air libre. Il en résulte l'impossibilité de dormir et l'insommie pendant la nuit au bout de 14 jours ». HAHNEMANN, « Mat. méd. », 4877, t. 1, p. 428, symp. 4477. — 26. « Au cuir chevelu jusqu'au milieu du front », KNAPE in Hahnemann, p. 427, symp. 1156. — 27. « A la face antérieure de la jambe », Obs. 5 De Plasse et Coppée. — 28. Hahnemann, p. 426, symp. 1116. — 29. Renv. 234 Orfila. — 30. Obs. 22 Guilbert. - 31. Hahnemann, p. 426, symp. 4124. - 32. Hargens in Hahnemann, p. 427, symp. 1146. — 33. «Ulcère douloureux, surtout le matin, renfermant sous une croûte un pus foncé, sanguinolent, avec élancements isolés lorsqu'on est assis, soulagés par la station droite et calmés par la marche », Hahnemann, p. 426, sympt. 1116. — 34. « Ulcère croûteux sur le cuir chevelu, s'étendant jusqu'au milieu du front», Knape in Hahnemann, p. 427, sympt. 4156. — « Croûte ulcéreuse de l'épaisseur du doigt sur le cuir chevelu, tombant au bout de quelques semaines », Heimreich in Hahnemann, p. 427, sympt. 1159. — 35. Renv. 184 Delioux de Savignac. — Henckel. — Scheffler. — Klinge. — Bramer. — Langhendorff. — Brockmann. — 36. Obs. 209 Fristo. — Renv. 184 Delioux de SAVIGNAC. — HENCKEL. — SCHEFFLER. — KLINGE. — BRAMER. — LANGHENDORFF. — Brockmann.—37. «Avec chute des poils », Obs. anim. 68 Lolliot.—38. Hornbourg in Hahnemann, p. 426, sympt. 1128. (Au doigt). — 39. Renv. 122 Imbert3º Forme des ulcères (ulcères orbiculaires, ou irréguliers, ou profonds, ou à bords élevés, ou à bords taillés à pic, ou rongeants);
4º Sécrétion des ulcères (suppuration abondante, ou ichoreuse, ou

sanguinolente...);

5º Inflammation de la circonférence de l'ulcère ;

GOURBEYRE. - Renv. 474 Naunyn. - 40. Renv. 173. Naunyn. - 41. Renv. 474 Naunyn. — 42. Renv. 174 Naunyn. — 43. « Ces caractères établissent tout au moins une similitude avec les ulcères cancéreux », IMBERT-GOURBEYRE, « Art édical », 1872, t. xxxiv, p. 187. — 44. Hornburg, in Hahnemann. « Mat. méd. », 1877, t. I, p. 426, sympt. 1127. — 45. Heinze in Hahnemann, ibid., p. 427, sympt. 4144, « Ulcères carcinomateux ayant nécessité l'amputation du membre ». — « Éruption à la lèvre inférieure avec une croûte épaisse et un fonds lardacé comme le cancer », Sr... in Hahnemann, ibid., p. 428, sympt 1482.—46. IMBERT-Gourbeyre, « Art méd. », 1872, t. xxxvi, p. 187. — 47. « Aux parties sexuelles », Scheffler, «Gesundheid der Bergleute», 1770. - Renv. 201. - Obs. 346 Curling. -48. « Aux parties sexuelles », Scheffler, « Gesundheid der Bergleute », 1770. - Reny. 201. - Obs. 346 Curling. - 49. « Ulcères douloureux, surtout le matin, renfermant sous une croûte un pus foncé, sanguinolent, avec élancements isolés lorsqu'on est assis, soulagés par la station droite et calmés surtout par la marche. » Hahnemann, «Mat. méd. », 1877, t. 1., p. 426, sympt. 1117. — 50. « A la jambe », Obs. 5 De Plasse et Coppée. — 51. « Aux lèvres » Obs. 473. Henzell et Taylor. - 52. « Ulcère rongeant à la lèvre causant le soir, lorsqu'on est couché, et le jour, lorsqu'on remue, une douleur lancinante et mordante comme si la place était couverte de sel; aggravation au toucher et à l'air libre, il en résulte l'impossibilité de dormir et l'insomnie pendant la nuit au bout de quaterze jours. » Hahnemann, « Mat. méd. », 1877, t. I, p. 428, sympt. 1177. — 53. « Ulcère douloureux surtout le matin renfermant sous une croûte un pus foncé, sanguinolent », Hahnemann, ibid., p. 426, sympt. 1116. — 54. « Après application externe », Heun in Hahnemann, ibid., p. 427, sympt. 1146. — 55. HAHNEMANN, ibid., p. 426, sympt. 1121. - 56. HAHNEMANN, ibid., p. 426, sympt. 1120. - 57. Hargens, « par application externe » in Hahnemann, ibid. p. 427, sympt. 4145. — 58. Hahnemann, ibid., p. 426, sympt. 4123. — 59. Hahne-MANN, ibid., p. 426, sympt. 1122. — 60. Hahnemann, ibid., p. 426, sympt. 1119. - 61. HAHNEMANN, ibid., p. 426, sympt. 4118. - 62. Renv. 473 Naunyn. -63. Renv. 473 Naunyn. - 64. (Par usage externe). « Ulcères rongeants. » KNAPE in HAHNEMANN, « Mat. méd. », 1877, t. I, p. 427, sympt. 1155. — 65. Observ. 209 Fristo. — Obs. 296 Schulze (le douzième jour). - 66. « Ulcère croûteux », Knape in Hahnemann, « Mat. méd. », 1877, p. 427, sympt. 1156. — 67. «Face couverte d'ulcères», Neue medicin. chir. Wharn. in Hahnemann, ibid., p. 428, sympt. 1180. - 68. « Ulcère rongeant », Hahnemann, ibid., p. 428, sympt. 1177. — 69. ISENFLAMM-STEIMMIG in HAHNEMANN, ibid., p. 428, sympt. 1181. - Sr... in Hahnemann, ibid., p. 428, sympt. 1482. - 70. « Excoriation dans l'aisselle, sous les bras. » Klinge in Hahnemann, ibid., p. 428, sympt. 1490. — 71. Renv. 54 Scheffler. - 72. Scheffler, « Gesundheit der Bergleute », 1770. - Klinge, « Hufeland's Journal », t. xi - Kloss - Renv. 54 Scheffler -Brockmann, « Die metallurgisch. Krankheit», 1851.—73. Scheffler, « Gesundheit der Bergleute », 1770 — Klinge, «Hufeland's Journal», t. xII— Kloss—Renv. 54 Scheffler-Brockmann, «Die metallurgischen Krankheiten», 1851.-74. Renv. 234

- 6º Ulcère croûteux;
- 7º Ulcère putride;
- 8º Ulcère gangréneux;
- 9º Ulcère cancroïde;
- 10° Ulcère cancéreux;
- 11º Douleurs dans les ulcères; ulcères avec amaigrissement général;
- 12º Anciens ulcères redevenus douloureux;
- 13º Ulcères suivant les régions.

Ces Tableaux, tels que je les présente à l'Académie, sont établis de manière à me permettre d'apporter à l'appui de ma démonstration une nouvelle série de faits et d'observations que je m'occupe à coordonner, et d'y ajouter plus tard les faits nouveaux, au fur et à mesure qu'ils seront consignés dans les annales de la science. Nil actum reputans si quid superesset agendum. La Matière médicale est avant tout l'œuvre du temps; elle est infinie comme lui.

Je n'affirme pas que toutes ces indications pathogénétiques extraites des écrits des médecins allopathes les plus recommandables, soient rigoureusement exactes et empruntent la même autorité au nom de leurs auteurs. On a beau dire avec Baglivi: Quæ sensus demonstrat, nulla ætas, nulla auctoritas infirmare potest, il reste toujours à démontrer que l'observation a été bien faite. Ici encore c'est l'expérience seule qui peut prononcer: Non debemus adhærere omnibus quæ legimus et audimus, sed attentè debemus Majorum dicta et verba examinare ut addamus et corrigamus quæ errata sunt. En suivant ee précepte de Bâcon, on écartera bien des faits douteux, insuffisamment établis; mais ce contrôle de l'expérience de nos devanciers et de nos contemporains ne peut être, lui aussi, que l'œuvre du temps.

On peut se demander si tous ces troubles pathogénétiques ont une im-

Orfila. — 75. Kloss. — 76. Kloss. — 77. Brockmann, « Die metallurgischen Krankheiten der Oberharzes, 4851. — 78. Brockmann, « Die metall. krankh. der Oberharzes, 1851.—79. Renv. 234 Orfila.—80. Klinge « Hufeland's Journal », t. xi.—81. Klinge « Hufeland's Journal », t. xi.—82. « Ulcère à la jambe couvert d'une croûte grise à bords enflammés et causant une douleur de brûlure », Hahnemann, « Mat. méd. », 1877, t. l, p. 428, sympt. 1498. — 83. « Ulcère à la jambe gauche au dessous du genou », Hornburg in Hahnemann, ibid., p. 429, sympt. 1204.—84. Obs. 5. De Plasse et Coppée.—85. « Ulcère exsudant un pus sanguinolent », Guilbert in Hahnemann, Mat. méd., 1877, t. i, p. 429, sympt. 1205. — 86. Renv. 234 Orfila. — 87. Obs. 22, Guilbert. — 88. Obs. 106, Christison.— 89. Obs. 173 Henzell et Taylor. — 90. Renv. 122 Imbert-Gourbeyre. — 91. Renv. 54, Scheffler.—92. Kloss—Scheffler, « Gesundheit der Bergleute », 1770—Brockmann, « Die metall. Krankh. »—93. Kloss—Scheffler, « Gesundheit der Bergleute », 1770 — Brockmann, « Die metall. Krankh. » — . Obs. 9, De Plasse et Coppée.

portance réelle et méritent d'être si soigneusement relevés. Certes, il y a dans ces Tableaux nombre de symptômes qui ne présentent rien de particulier on qui se produisent également sous l'influence d'autres agents médicamenteux. Mais tel symptôme qui, isolé, semble insignifiant, peut emprunter une expression caractéristique, soit à son moment d'invasion, soit à son mode de développement, soit à d'autres manifestations morbides qui l'accompagnent. N'en est-il pas de même de certains symptômes de maladies naturelles? N'observons-nous pas tous les jours la fièvre dans les états pathologiques les plus différents? La fièvre par soi-même présente souvent peu d'intérêt et quelquefois bien peu d'importance; mais ce symptôme communique toujours à la maladie un caractère particulier de forme et de gravité.

Des circonstances nombreuses peuvent donner ainsi une physionomie caractéristique à une manifestation morbide commune d'ailleurs à plusieurs méd caments. Bien des substances sont, par exemple, paralysigènes : un renseignement pathogénétique aussi vague ne sera d'aucun secours pour les applications thérapeutiques d'un remède, tant que les caractères propres de la paralysie et les troubles concomittants ne seront pas déterminés nettement et suivant leur ordre de succession. La paralysie arsonicale peut, dès le début, être accompagnée ou non de phénomènes d'excitation (1). Ici l'excitation n'aura pas, par elle-même, très-grande valeur, mais la présence ou l'absence de cette excitation accusera le caractère particulier de la paralysie. L'invasion brusque ou lente, hâtive ou tardive de la paralysie, peut également imprimer à ce symptôme un cachet tout à fait propre, pathognomonique en quelque sorte : ainsi le début brusque de la paralysie arsenicale, plusieurs jours après la disparition complète de tout phénomène d'intoxication (2), est une particularité très-remarquable, analogue, sous ce rapport, aux phénomènes de la paralysie diphthéritique.

L'expérience a seule autorité pour distinguer les symptômes qui sont importants de ceux qui ne le sont pas. A priori, nul ne saurait établir rien de sérieux sous ce rapport. La valeur d'un symptôme observé dans un cas d'intoxication ne pourra être nettement déterminée qu'après une étude analytique, synthétique et comparative très-complète de ce cas. On prend vraiment en piété les « pauvres d'esprit » qui voudraient à ce propos appliquer à Halmemann le Turpe est difficiles habere nugas de Martial. Vrais myopes intellectuels, ils prennent les limites de leur étroit cerveau pour les confins de la science.

On dit que certains troubles pathogénétiques ont été notés et énoncés par notre Maître avec une minutie poussée jusqu'à une sorte de naïveté. Avant de rappeler le Quandoque bonus dormitat Homerus, que ces fiers censeurs nous tracent les bornes du naïf dans les descriptions scientifiques. Hahnemann a exprimé la symptomatologie des médicaments avec

(2) Ibid, symptôme nº 90.

⁽¹⁾ Voir Tubleau pathogénétique nº II, symptômes 91, 92, 93.

une simplicité naturelle, mais toute scientifique. Et la naïveté entendue de cette manière est encore une qualité propre aux intelligences d'élite. On l'a dit : « La naïveté est le langage du beau génie et de la simplicité » pleine de lumière! »

La légère somnolence, qui fut la seule manifestation morbide observée par le médecin allopathe Laborde chez une jeune fille empoisonnée par l'arsenic (1), doit être considérée par ces critiques comme une expression symptomatique naïve; mais il y a un revers: à l'autopsie, on découvrit des lésions très-graves de l'estomac.

Des troubles morbides naïfs! Ce sont souvent de ces malaises — de ces riens, comme disent nos censeurs ennemis de la naïveté, — dont se plaignent les personnes qui.... un jour meurent subitement et à la nécropsie desquelles on trouve des lésions organiques extrêmement graves, presque toujours anciennes et absolument méconnues; telles sont aussi ces lésions anatomo-pathologiques nulles ou à peu près, qu'on observe sur les cadavres de personnes qui, vraies martyres, sont mortes après d'horribles souffrances.

Ces nombreux troubles pathogénétiques appartiennent-ils tous en propre à l'action des substances médicamenteuses et ne dépendent-ils jamais d'affections intercurrentes, de coïncidences en un mot?

L'homme sait qu'il vit; il ne se sent pas vivre.

Dans l'état de santé parfaite, nos organes sont muets; il règne dans notre économie un silence absolu; les moindres bruits sont significatifs et indiquent un trouble quelconque de notre organisme.

L'homme qui se sent penser, digérer, respirer, dormir, marcher, n'est pas dans son état normal; il est malade.

Tout trouble fonctionnel ou anatomique, ne durât-il qu'un instant, est

D'après l'intensité, la durée, la terminaison de ces troubles, on recourra à des appellations différentes; la maladie sera un malaise, une indisposition, une affection légère, sérieuse, grave, mortelle.

Pas d'effets sans cause.

Pas de maladies sans cause pathogénétique.

Les causes des maladies sont extrêmement nombreuses: les causes morales, atmosphériques, climatériques, les *ingesta*, les *applicata*, etc.

Les principes morbigènes agissent dès l'instant de leur application.

Tous les troubles physiologiques et anatomiques qui surgissent depuis l'instant de l'application, doivent être rangés parmi les suites de cette action morbigène.

Ainsi toutes les manifestations morbides qui se produisent pendant les périodes d'incubation, d'invasion, d'état, de terminaison et de convalescence de la scarlatine, sont des phénomènes propres à l'action du contagium scarlatineux. Ainsi encore toutes les manifestations morbides qui se

⁽¹⁾ Voir plus haut, page 25.

produisent pendant les périodes d'incubation, d'invasion, d'état, de terminaison et de convalescence de l'intoxication arsenicale ou phosphorée, sont des phénomènes propres à l'action de l'arsenic ou du phosphore.

Pourtant les maladies médicamenteuses, aussi bien que les maladies naturelles, peuvent se compliquer sous l'influence de causes morbides intercurrentes. Tous les troubles physiologiques et anatomiques qui s'observent depuis ce moment sont des symptômes douteux et qu'on ne peut attribuer à la maladie principale que sous la réserve d'un examen toujours en éveil. Ainsi, dans une intoxication arsenicale ou phosphorée, on rangera parmi les symptômes douteux les symptômes qui s'observent consécutivement à l'administration des antidotes.

Mais, dans une maladie naturelle, il se produit souvent des complications dont les causes échappent à l'observateur le plus attentif. Les symptômes qui appartiennent en propre à la maladie intercurrente ne peuvent évidemment ètre compris dans le tableau symptomatique de la maladie principale. C'est l'expérience, fruit d'une très-longue et très-minutieuse observation, qui a permis aux médecins de tracer la description exacte et classique des diverses formes et variétés d'une maladie et d'élaguer les symptômes des affections intercurrentes. De même dans les divers degrés des maladies médicamenteuses - malaise, indisposition, intoxication légère, sérieuse, grave, mortelle - il peut survenir, à l'insu de l'observateur le plus instruit et le plus consciencieux, des troubles physiologiques et anatomiques dépendant d'une cause morbide intercurrente. Ici, également, les symptômes qui appartiennent en propre à la maladie intercurrente ne pourront être compris dans le tableau pathogénétique du médicament. C'est encore l'expérience, fruit de l'étude analytique, synthétique et comparative des nombreux cas d'intoxication parfaitement observés et minutieusement décrits, qui permettra aux médecins de tracer la description exacte et classique des diverses formes et variétés de maladies médicamentenses et d'élaguer les symptômes des affections intercurrentes.

Peut-on, dès aujourd'hui, distinguer, séparer et classer les symptômes douteux? Peut-on faire la description exacte, classique des diverses formes et variétés des maladies médicamenteuses? Hélas! non. Ars longa, vita brevis, a dit Hippocrate. Mais il est incontestable que si des médecins instruits et consciencieux continuent de suivre la voie si sagement et si brillamment inaugurée par Hahnemann, on arrivera à décrire exactement les diverses formes et variétés d'intexication et à élaguer les symptômes qui sont douteux, ceux qui n'ont rien de caractéristique et ceux qui sont absolument étrangers à l'action de la substance médicamenteuse. C'est ainsi que les symptômes d'apoplexie (1) et d'hémiplégie (2) disparaîtront probablement du cadre pathogénétique de l'arsenic. L'apoplexie n'a été renseignée que par Hahnemann et nous ne connaissons pas l'observation qui lui a fourni cette indication; l'hémiplégie n'a été observée que par Stachow. Ces deux symptômes n'ont été confirmés, à ma connaissance, dans aucun autre cas

⁽¹⁾ Voir Tableau pathogénétique nº 1, symptôme 30.

⁽²⁾ Voir Tableau pathogénétique nº 11, symptôme 43

d'intoxication arsenicale. Si l'observation ultérieure ne vient pas en confirmer la portée significative, il y aura lieu de les considérer comme de simples coïncidences se rapportant à des complications méconnues.

Il ne coûtera pas aux homœopathes de redresser et de corriger l'œuvre du Maître. Amicus Plato, sed magis amica veritas. Hahnemann lui-même ne considérait pas son œuvre comme parfaite; il corrigeait et développait sans cesse ses travaux : ce n'est pas lui qui aurait appliqué à sa Matière médicale les titres fastueux qu'Horace prodiguait à ses poésies : Exegi monumentum. Il avait adopté cette autre devise : « Quand il s'agit de l'art sauveur de la vie, négliger d'apprendre est un crime. » Selon lui, le devoir du médecin et du savant est d'étudier et d'observer toujours, de ne se rebuter ni décourager jamais. Sa tâche n'est jamais remplie, elle rappelle le supplice infligé par Virgile à un damné de l'enfer païen :

Sedet, æternumque sedebit Infelix Theseus....

Peut-on expliquer cette multiplicité de troubles morbides engendrés par l'arsenic et le phosphore? On ne le peut pas aujourd'hui et je ne pense pas qu'on y parvienne jamais, parce que, comme je l'ai dit plus haut (page 17), il y a dans l'acte médicamenteux deux agents : l'un, le médicament toujours identique, sauf la dose; l'autre, l'individu, facteur se décomposant en une foule de moments ou circonstances qui sont autant d'éléments de combinaisons multiples. M. le professeur Gubler qui cependant use volontiers et largement des hypothèses et qui ne me paraît pas toujours difficile sur le choix de celles qu'il adopte, avoue « qu'il est impossible » d'établir aujourd'hui une théorie de l'action physiologique de l'arsenic » répondant à toutes les exigences des faits connus, et il reconnaît que » les faits eux-mêmes n'ont pas toujours été observés avec assez de rigueur » pour fournir des données certaines à l'édification d'une doctrine scienti» fique. »

Quelqu'intéressant qu'il soit de pénétrer les causes secrètes des choses, nous pensons qu'en Matière médicale les hypothèses doivent être repoussées et que l'on ne doit raisonner que d'après des faits expérimentalement démontrés. Dans l'étude des phénomènes pathogénétiques, plus encore que dans les autres applications de la science, on ne doit pas dépasser les limites de la réalité. Tout au plus l'hypothèse peut-elle être admise comme point de départ de certaines expériences physiologiques sur les animaux, expériences qui bien conçues, bien dirigées et bien exécutées, peuvent mettre en lumière la nature intime de certaines manifestations morbides.

Mais autant nous devons repousser les hypothèses mal assises qui encombrent la science et qui sont des pierres d'achoppement sur la route du progrès, autant nous devons nous appliquer à analyser rigoureusement et scrupuleusement les faits offerts à notre observation pour dégager les causes physiques, matérielles, des phénomènes psycho-physiologiques.

Les modes d'investigation mis à cette fin à notre portée, sont les analyses chimiques et les analyses microscopiques.

Or, que nous apprennent ces recherches analytiques sur la cause intime des accidents morbides si multiples produits par l'arsenic et le phosphore ?

Elles nous apprennent que l'agent médicamenteux fait élection dans un cas sur tel organe ou tel appareil, dans d'autres cas sur tels autres organes ou tels autres appareils; elles nous apprennent à découvrir les lésions histologiques qui accompagnent les phénomènes morbides; elles nous apprennent à isoler, à mettre à nu l'agent morbigène qui, par son action locale, produit hic et nunc le phénomène morbide.

Quand nous ne découvrons pas la présence de l'agent morbigène dans les organes siéges des lésions et des symptômes morbides, n'en accusons souvent que notre inattention, notre impatience, notre inhabileté ou la défectuosité et la grossièreté de nos procédés d'analyse et de nos autres movens d'investigation. Quelle plus belle preuve que l'observation de MM. Grohe et Mosler, rapportée sous le numéro 197 de mon Cahier d'Observations d'intoxication arsenicale sur l'homme sain? Il y est question d'un enfant de deux ans, vigoureux, bien constitué, qui meurt seize heures après l'ingestion d'une certaine quantité de substance arsenicale. Quoique l'enfant ait à plusieurs reprises rendu des fragments d'arsenic, l'analyse chimique du contenu de l'estomac et de l'intestin, du foie, de la rate et des reins, n'a donné qu'un résultat négatif. Et pourtant cet enfant a présenté jusqu'à sa mort des troubles physiologiques très-remarquables de la plupart des fonctions et l'autopsie a fait reconnaître des lésions extrêmement graves et nombreuses dans les organes dont la substance a été analysée.

Dans l'espèce, il y a cu empoisonnement par l'arsenic, puisqu'on a recucilli ce poison dans les déjections; il y a cu absorption de l'arsenic, puisqu'il y a cu des troubles physiologiques et des lésions anatomo-pathologiques; il n'y a pas cu élimination complète de l'arsenic puisque la mort est survenue seize heures après l'ingestion. L'arsenic existait donc encore dans l'économie, mais l'analyse chimique telle qu'elle a été faite n'a pu ni découvrir ni isoler l'agent d'intoxication.

Ce qui est impossible aujourd'hui peut être réalisable demain. Dans le travail progressif de l'enfantement scientifique, chaque époque apporte son tribut de découvertes. Il y a bien longtemps que la science a effacé des Colonnes d'Hercule cette sentence ambitieuse : *Hic deficit orbis!*

En attendant que ces progrès éminemment désirables s'accomplissent, voici ce que les données actuelles de la science permettent d'établir d'une manière absolument certaine.

L'arsenic a été découvert par les procédés ordinaires de l'analyse chimique :

1° Dans le cerveau (1), après des intoxications : aiguë par voie gastrique (2)

^{1.} H. Huchard: « Revue des Sc. médic. », Paris, 1876, t. vn, p. 551. — Renvoi 19, Orfila. — Obs. 79, Dieu (L'arsenic a été découvert trois ans après la mort). — 2 Scolo-

- et chronique par voie gastrique (3), et chez les animaux après des expérimentations par voies : gastrique (4) et veineuse (5);
- 2º Dans la moelle épinière (6), après des intoxications: aiguë par voie gastrique (7) et chronique par voie gastrique (8), et chez les animaux après des expérimentations par voies: gastrique (9) et veineuse (40);
- 3º Dans les muscles (11), après des intoxications : aiguë par voie gastrique (12) et chronique par voie gastrique (13), et chez les animaux après des expérimentations par voies : gastrique (14), veineuse (15) et cutanée (16);
- 4º Dans les os, après des intoxications : aiguë par voie gastrique (17) et chronique par voie gastrique (18);
- 5° Dans le sang (19), après des intoxications: aiguë par voie gastrique (20) et par voies respiratoires (21), et chez les animaux après des expérimentations par voies: gastrique (22), veineuse (23), cutanée (24) et respiratoires (25;
- 6° Dans le cœur (26), après des intoxications : aignë par voie gastrique (27), chronique par voie gastrique (28), par voies : rectale (29) et cutanée (30), et chez les animaux par voies : gastrique (31), veineuse (32), cutanée (33) et respiratoires (34);
- 7º Dans la sérosité péricardique, après une intoxication par voie cutanée (35);
 8º Dans les poumons (36), après des intoxications: aiguë par voie gastrique (37), chronique par voie gastrique (38), par voie rectale (39), et chez les

SUBOFF in « Archiv. de Physiol, norm et pathol. » 1875; « Annales d'hyg publ. » 1876, t. xlv, p. 158. - Devergie, Lesbeth et Flandin in Obs. 79, Dieu. - 3 Scolosuboff, ibid, pag. 153. - 4. Obs. animaux 1 A. Gautier et Scolosuboff - Obs. anim. 2, Scolo-SUBOFF. - Obs. anim. 3!, Apoiger. - Obs. anim. 84, Beissenhirtz - 5. H. Huchard, ibid., p. 531. - Obs. anim. 4 Scolosuboff. - Obs. anim., 5 Scolosuboff. - 6. Scolo-SUBOFF, ibid p. 153. - 11 HUCHARD, ibid., p. 5 1. - 7. NCOLOSUBOFF, ibid. p. 158. -8. Scolosuboff, ibid., p. 153. - 9. Obs. anim 1, A. Gautier et Scolisubiff. - Obs. anim 2 Scolosuboff. - 10. Obs anim. 4, Scolosuboff. - Obs. anim. 5, Scolosuboff. -11. Renv 26, Geoghegan (après sept heures). — H Huchard, ibid., p. 55. — 12 Sco-LOSUBOFF, ibid., p. 153, 158. — Obs. 15. — 13 Scolosuboff, ibid., p. 153. — Obs. 15. — 14. Obs. anim. 1, A. Gautier et Scolosuboff, -Obs. anim. 2, Scolosuboff, -Renv. 54, Orfila. Renv. 53. Danger et Flandin. - 15 Obs. anim. 4, Scolosuboff. - Obs. anim. 5, Scolosuboff. -Renv. 34, Orfila. — 16. Renv. 34, Orfila. — 17. Renv. 173, Naunyn. — 18. Obs. malad. 52, Gibb (les vertèbres présentent des traces d'arsenic, ainsi que le foie). 19. Renv. 14, CAUVET -Renv. 19, CREDA -Renv. 26, Geoghegan (après 9 heures). - Renv. 34, Orfila. - Renv. 35, LASSVIGNE. — Renv. 271, WURTZ et WILLM. — 20. Obs. 74, C. JAMES. — Obs. 182, BUCHNER. — Obs. 375, Orfila et Coqueret. — 21 Obs. 90, Bayard et Chevallier. — 22. Obs. anim. 44 et 45, Orfila. - Obs. anim. 82, Beissenhirtz. - Obs. anim 83, Fourcade-BRUNET. - Obs. anim. 7, Flandin et Danger. - Obs. anim. 31, Apoiger. - Obs. anim. 60, ESPEZEL. -Obs. anim. 65, BOUCHARDAY et SANDRAZ.-Renv. 35, LASSAIGNE. - Renv 60, BONJEAN. - Renv. 61, GIANNELLI - 23. Obs. anim. 60, Espezel. - Renv. 232, Chatin. 24. Obs. anim. 60, Espezel. -25. Obs. anim. 60, Espezel. - 23. Renv. 19, Onfila. -27. Obs. 53, ORFILA. - 23. Obs. 15. - 29. Obs. 175, HENZELL of TAYLOR. - 30 Obs. 90, BAYAPD et CHEVALLIER. -31. Obs. anim. 82, Beissenhertz. -Obs. anim 60, Espezel. -Renvoi 61, Giannelli. -32. Obs. anim. 7, Flandin et Danger. - Obs. anim. 60, Espezel. -33. Obs. anim. 60, Espezel. - 34. Obs. anim. 60, Espezel. - 35 Obs. 90, Bayard et CHEVALLIER - 33. Renv. 19 et 22, Orfila - 37. Obs. 74, C. James. - Obs. 15. -Obs. 98, BAYARD. — Obs. 182, BUCHNER. — Renv. 19, ORFILA. — 38. Obs. 15. — 39. Obs. 173, Henzell et Taylor. -40. Obs. anim. 82, Beissenhirtz. - Obs. anim. 60, Espe-

- animaux après des expérimentations par voies : gastrique (40), veineuse (44), cutanée (42) et respiratoires (43);
- 9° Dans l'épanchement pleurétique, chez un animal, après une expérimentation par voie veineuse (44);
- 40° Dans la salive (45);
- 11° Dans l'épaisseur des parois de l'estomac (46), après des intoxications : aiguë par voie gastrique (47), chronique par voie gastrique (48), par voie vaginale (49), et chez les animaux après des expérimentations par voies : gastrique (50), veineuse (51), cutanée (52) et respiratoires (53);
- 12º Dans les liquides sécrétés par l'estomac, après une intoxication par voie vaginale (54), et chez les animaux après des expérimentations par voie veineuse (55);
- 43° Dens l'épaisseur des parois de l'intestin, après des intoxications: aiguë par voie gastrique (56), chronique par voie gastrique (57), par voies: rectale (58), vaginale 59) et cutanée (60);
- 14° Dans les liquides sécrétés par l'intestin (61), après une intoxication par voie rectale (62), et chez les animaux après des expérimentations par voies : gastrique (63) et veineuse (64);
- 15° Dans les liquides abdominaux, après des intoxications : aiguë par voie gastrique (65) et par voie cutanée (66);
- 16° Dans les matières intestinales, après des intoxications par voi s: rectale (67), vaginale (68), cutanée (69), et chez les animaux, après des expérimentations par voie veineuse (70);
- 47° Dans les matières fécales (71), chez les animaux après des expérimentations par voies : gastrique (72) et veineuse (73);
- 18° Dans le foie (74), après des intoxications : aiguë par voie gastrique (75),

ZEL. - Renv. 61, Giannelli. -41. Obs. anim. 60, Espezel. 42. Obs. anim. 60, Espezel. -43. Obs. anim. 60, Espezel -44. Obs. anim. 7, Flandin et Danger. -45. Renv. 213, Delioux DE SAVIGNAC. - CHATIN, « Journal de chimie médic. » 1847. - Renv. 159. - 46. WAGNER, METZGER, LABORDE, ORFILA in Renv. 280. - 47. Obs. 418, Tardieu (après 9 jours). - Obs. 45 - Obs. 59, Mantineau et Crié. - Obs. 202, Caussé et Orfila. - 48. Obs. 15. -49. Obs. 81, Brisken. - 50. Obs. anim. 60, Espezel. - Renv. 61, Giannelli. -51. Obs anim. 60, ESPEZEL. - 52. Obs. anim. 60, ESPEZEL - 53. Obs anim. 60, ESPEZEL. — 54. Obs. 81, Brisken. — 55. Renv. 175, Naunyn. — 56. Obs. 15. — Obs. 99, BAYARD. - Obs. 237, KEBER. - 57. Obs. 15. - 58. Obs. 173, HENZELL et TAYLOR. -59. Obs. 81, Brisken. - 60. Obs. 90, Bayard et Chevallier. - 61. Chatin, « Journ. de chim. médic., » Juin, 1847. — Renv. 22, Orfila; « Tr. de Toxicol. » 1852, t. I, p. 378. — Renv. 135, Sistach. — Renv. 217, L. Orfila. — Renv. 213, Delioux de Savignac. — 62. Obs. 1-3, Henzell et Taylor. -63. Obs. anim. 21, Orfila. -64 Renv. 81, Böhm et UNTERBERGER. - Renv. 135, Chatin in Sistach. - Renv. 175, Naunyn. - 65. Obs. 15. -66. Obs. 90, BAYARD et CHEVALLIER. - 67. Obs. 175, HENZELL et TAYLOR. - 68. Obs. 81, Brisken. -69. Obs. 90, Bayard et Chevallier. - 70. Renv. 147, Hermann. - 71. Renv. 26, Geoghegan. - Renv. 135, Chevallier in Sistach. - 72. Renv. 58, Danger et Flandin. — Renv. 60, Bonjean. — 73. Renv. 1. Böhm et Unterberger. — 74. Renv. 14, CAUVET. - Renv. 19 et 22, Orfila. - Dumas, Boussingault et Regnau T, in Renv. 22. -FLANDIN, in Renv. 22. - Renv. 25, Cahen. - Renv. 26, Geoghegan. - Taylor, in Renv. 26. — 75. Scolosuboff, ibid., 155, 158. — Obs. malad. 52, Gibb. — Obs. Tetrel et Obs. Griffon, in Obs. 381, Orfila et Devergie. - Obs. 74, C. James. - Renv. 19, Orfila. -Obs. 418, TARDIEU. -- Obs. 15. -- Obs. 59, MARTINEAU et CRIÉ. -- Obs. 98 et 99, BAYARD.

chronique par voie gastrique (76), par voie rectale (77), et chez les animaux, après des expérimentations par voies: gastrique (78), veineuse (79), cutanée (80) et respiratoires (81);

19º Dans la bile (82);

20º Dans la rate (83), après une intoxication aiguë par voie gastrique (84), et chez les animaux après des expérimentations par voies : gastrique (85), veineuse (86), cutanée (87) et respiratoires (88);

21º Dans les reins (89), après une intoxication aiguë par voie gastrique (90), et chez les animaux après des expérimentations par voies : gas-

trique (91), veineuse (92), cutanée (93) et respiratoires (94);

22º Dans les urines (95), après des intoxications : aiguë par voie gastrique (96), chronique par voie gastrique (97), par voies : rectale (98), veineuse (99) et cutanée (100), et chez les animaux après des expérimentations par voies: gastrique (101), veineuse (102), cutanée (103), et respiratoires (104);

-Obs. 210, Merbach. - Obs. 227, Keber. - Obs. 232, Walther. - 76. Obs. 15. -77. Obs. 175, Henzell et Taylor .- 78. Obs. anim. 1 et 2, A. Gautier et Scolosuboff .-Obs. anim. 82, Beissenhirtz - Obs. anim. 60, Espezel .- Obs. anim. 65, Bouchardat et SANDRAS. - Renv. 19, ORFILA. - Renv. 35, LASSAIGNE (après une 1 1/2, heure, le foie contenait déjà le tiers de la dose d'arsenic ingéré). - Renv. 61, GIANNELLI. - Obs. anim. 100, Siedamgrotzky. - 79 Obs. anim. 4 et 5, Scolosuboff. - Obs. anim. 60, Espezel. - Renv. 57, Chatin. - Orfila, in Renv. 57. - 80. Obs. anim. 4 et 5, Scolosuboff. - Obs. anim. 60, ESPEZEL. - Renv. 57, CHATIN. - ORFILA, in Renv. 57. - 81. Obs. anim. 4 et 5, Scolosuboff. — Obs. anim. 60, Espezel. — Renv. 57, Chatin. — Orfila, in Renv. 57. — 82. Renv. 159, (quelquefois des quantités considérables) — Renv. 22. — Renv. 25, Cl. Bernard, in Cahen. — Renv. 173, Naunyn. — 83. Renv. 14, Cauvet. — Renv. 19, Orfila. — 84. Reny. 14, CAUVET. - Obs. 74, C. JAMES. - Obs. 418, TARDIEU. - Obs. 15. - Obs. 210, Merbach. - Obs. 227, Keber. - 85. Obs. anim. 60, Espezel. - Obs. anim. 65, Bouchar-DAT et SANDRAS. - Renv. 19, ORFILA. - Renv. 61, GIANNELLI. - 86. Obs. anim. 60, ESPEZEL. - 87. Obs. anim. 60, ESPEZEL. - 88. Obs. anim. 60, ESPEZEL. - 89. Renv. 14, CAUVET. - Renv. 19 et 22, ORFILA. - 90. Obs. 15. - Obs. 210, MERBACH. - 91. Obs. anim. 60, Espezel. - Renv. 35, Lassaigne (après 1 1/2, heure). Renv. 61, Giannelli. -92. Obs. anim. 60, Espezel. — 93. Obs. anim. 60, Espezel. — 94. Obs. anim. 60, ESPEZEL. - 95. CHATIN, « Journ. de Chim. médic. » Juin. 1847. - Renv. 213, Delioux DE SAVIGNAC. - Renv. 14, CAUVET. - Renv. 15, GAILLARD. - Renv. 22, ORFILA et CHATIN. Renv. 14, Mayençon et Bergeret in Cauvet. - Renv. 26, Geoghegan. - Renv. 28, Schäffer in Casper. — Renv. 27, Orfila. -- Renv. 159. — Renv. 256, Maillot. — Renv. 259, DUPUY. - Renv. 271, WURTZ et WILLM. - 96. TROUSSEAU, PIDOUX et C. PAUL, « Tr. de Thérapeut. » 1876, 1, 391 et 395.—Obs. 382, Augouard. — Obs. 383, Orfila et Barreswil. -Obs. 587, Orfila et Devergie. - Renv. 84, Gouffier. - Renv. 254, Chappuis. - 97. (six semaines après la prise de l'arsenic) Obs. malad 2, Gaillard et Lamousky. - (Après un mois) Renv. 17, Bonjean. - Renv. 144, Wahu et Devergie. - Obs. 225, Knapp. -98. Obs. 175, HENZELL et TAYLOR. - 99. Renv. 27, OBFILA. - 100. Obs. 101, BAYARD et CHEVALLIER. - Renv. 18, SERRÉ. - Renv. 27, ORFILA. - Renv. 28, SCHÄFFER in CASPER (après quelques heures). — Renv. 259, Dupuy. — 101. Obs. anim. 45, Orfila. — Obs. anim. 3, Scolosupoff.—Obs. anim. 8, Danger et Flandin. — Obs. anim. 26, Delafond. — Obs. anim. 27, 28 et 29, Delafond et Bouley. - Obs. anim. 34, Flandin et Danger. -Obs. anim. 60, ESPEZEL. - Renv. 34, ORFILA. - Renv. 35, LASSAIGNE (après 1 1/2, heure). -Renv. 57. Orfila et Chatin. - Cambessedes, Lassaigne, Renault, Flandin, Danger in Renv. 57, Chatin. - Renv. 58, Danger et Flandin. - Renv. 60, Bonjean - Renv. 61, Giannelli. — Renv. 147, Hermann. — 102. Obs. anim. 16, 38, 59, 40 et 47, Orfila. — Renv. 232, Chatin. - Obs. anim. 7 et 33, Flanden et Danger. - Obs. anim. 63, Espezel. -Renv. 34, Orfila. - Renv. 57, Chatin. - 103. Obs. anim. 64, Espezel. - Renv. 34, 23º Dans l'épaisseur des parois de la vessie, après une intoxication aiguë par voie gastrique (405);

24° Dans la matrice, après une intoxication aiguë par voie gastrique (106);

25° Dans le placenta (107), après une intoxication aiguë par voie gastrique (108);

26° Dans le fœtus (109), après une intoxication aiguë par voie gastrique (110);

27° Dans les eaux de l'amnios (†11) et chez un animal, après une expérimentation par voie gastrique (112);

28° Dans le lait, chez des animaux, après des expérimentations par voie

gastrique (113);

29° Dans les os des petits nourris au moyen du lait des animaux soumis à des expérimentations par voie gastrique (114);

30° Dans l'épaisseur de la peau (115), après une intoxication aiguë par voie gastrique (116);

31° Dans les sueurs (117) et

32º Dans les diverses sécrétions dont la peau est le siége (118).

Nous aurions pu dresser également des Tableaux synoptiques des nombreuses variétés qui s'observent :

A. Quant au moment de l'apparition de l'arsenic dans les organes et les

liquides sécrétés ou excrétés; B. Quant au séjour de l'arsenic dans les organes et les liquides sécrétés

ou excrétés, et C. Quant à la quantité d'arsenic qui se rencontre dans les organes et les liquides sécrétés ou excrétés.

Toutes ces conditions doivent inévitablement exercer une action trèsmarquée sur l'évolution, la diversité, la combinaison, l'intensité, la persistance et la terminaison des troubles physiologiques et anatomiques des substances médicamenteuses.

Comment se graver dans la mémoire cette immense série de symptômes avec toutes les particularités qui se rattachent à leur mode de développement, de succession, de durée et de terminaison?

En achevant mon travail sur l'étude analytique, synthétique et comparative de l'action physiologique de l'arsenic et du phosphore et sur les nombreuses applications thérapeutiques internes et externes de ces substances, j'établirai les enseignements qui découlent des faits nombreux et

Orfila. — Renv. 57, Chatin. — Renv. 259, Dupuy. — **104**. Obs. anim. 60, Espezel. — Renv. 57, Chatin. — **105**. Obs. 45. — **106**. Obs. 394, Mareska et Lados. — **107**. Audouard. in Obs. 257, Keber. — **108**. Obs. 394, Mareska et Lados. — **109**. Renv. 259, V. Dupuy. — Audouard, in Obs. 237, Keber. — **110** Obs. 594, Mareska et Lados. — Obs. 162, Benoist.—**111**. Renv. 259, V. Dupuy. — **112** Renv. 259, V. Dupuy. — **113**. Roussin in Renv. 447, Hermann. — **114** Roussin in Renv. 147, Hermann. — **115**. Chatin, «Journ. de Chim. médic. » Juin, 1847. — Renv. 213, Delioux de Savignac. — Renv. 22, Orfila. — Renv. 155, Chatin in Sistach. — Renv. 159. — **116**. Renv. 155, Chatin in Sistach. — Renv. 159, Bergeron et Lemaitre. — **117**. Renv. 173 et 175, Naunyn. — Renv. 159, Bergeron et Lemaitre. — **118**. Renv. 159, Chatin.

irrécusables sur lesquels je me suis appuyé. Les propositions qui seront le résumé et la conclusion de ce travail, n'occuperont certes pas un espace plus long que les notices sur l'arsenic et le phosphore dans le *Traité de thérapeutique et de matière médicale* de MM. Trousseau et Pidoux. Les praticiens et les élèves auront intérêt à les connaître pour les besoins ordinaires de l'application au lit des malades. Ceux qui voudront discuter l'essence de ces propositions et scruter les faits sur lesquels elles s'appuient, ceux qui voudront préciser et approfondir davantage encore, et établir des comparaisons avec des faits nouvellement observés ou non relatés, ceux-là trouveront ces éléments d'étude dans mon travail même.

Il sera plus facile, croyons-nous, de se graver dans l'esprit une série de propositions absolues et vraies, résumées et indiquées suivant un ordre anatomo-psycho-physiologique naturel, que de retenir les nombreuses hypothèses au milieu desquelles quelques rares faits sont comme noyés dans les vingt-cinq pages gr. in-8° qu'occupe l'article sur l'arsenic, dans le traité classique de MM. Trousseau et Pidoux.

C'est sur ces bases que j'ai voulu établir la justification de la Matière Médicale de Halinemann.

TOUT CE QUE NOTRE MAITRE A AFFIRMÉ RESTE DEBOUT : Quod scripsit, scripsit!

Cette œuvre à peine échafaudée malgré les quarante années d'études constantes et ardues qu'il y consacra, cette œuvre si philosophique qui offre à chaque page les traces de ses veilles et de ses souffrances, et qui porte partout l'empreinte si profonde de son puissant génie et de son absolue originalité, *ex ungue leonem*, cette œuvre, disons-nous, n'a été entamée ni par les données de la toxicologie ni par les judicienses recherches des expérimentateurs de l'école physiologique.

Quod erat demonstrandum.

A vous, M. Crocq, à démontrer maintenant la sincérité de vos audacieuses négations.

Ne pas produire cette démonstration, serait une défaite.

Ainsi jugera tout esprit impartial et droit.

2º ÉTUDE SYNTHÉTIQUE DE L'ACTION PHYSIOLOGIQUE DE L'ARSENIC ET DU PHOSPHORE

Un praticien célèbre, qui s'est appliqué depuis plus de trente ans à établir les symptômes caractéristiques des médicaments hahnemanniens, qui est parvenu à saisir la physionomie propre, particulière, d'un grand nombre de remèdes, et qui, nous devons l'espérer, publiera un jour les fruits de son immense et pénétrante observation, le docteur Rayé (de Vilvorde), nous a souvent dit que chaque remède a non-seulement ses symptômes propres et caractéristiques, mais même présente ces symptômes suivant un groupement déterminé, absolument caractéristique lui aussi, au point que tel remède est essentiellement homœopathique à telle variété

d'une maladie, tandis que tel autre l'est à une autre variété de la même maladie. Je suis en mesure d'établir combien cette thèse est vraie pour l'arsenic et le phosphore, et je le ferai; mais poussant plus loin dans cette voie et, comme conséquence en quelque sorte des principes énoncés par le docteur Rayé, j'établirai que les médicaments sont morbigènes, qu'ils engendrent des maladies de toute pièce, semblables aux maladies naturelles par leur mode d'incubation et d'invasion, leur symptomatologie des périodes prodromiques, d'état et de terminaison, leurs lésions anatomo-pathologiques des organes, leurs altérations des liquides sécrétés ou excrétés, leur marche, leur durée, leurs complications et leurs conséquences. Ainsi le phosphore produit la nécrose et l'hépatite atrophique suraiguë; ainsi l'arsenic produit l'hypertrophie cardiaque et le choléra. Le choléra arsenical peut présenter avec le choléra indien une similitude de symptômes et de lésions telle que dans un cas d'empoisonnement (1), malgré les aveux des coupables et la constatation médico-légale du poison dans les organes, le médecin légiste Keber n'osa affirmer que la mort fût réellement le résultat de l'empoisonnement.

Ce doute n'est-il pas l'affirmation la plus éloquente des principes que je soutiendrai : les médicaments sont morbigènes ; il n'y a que la nature de la cause occasionnelle qui différencie l'essence des maladies naturelles de l'essence des maladies médicamenteuses accidentelles provoquées ou professionnelles.

3º ÉTUDE COMPARATIVE DE L'ACTION PHYSIOLOGIQUE DE L'ARSENIC ET DU PHOSPHORE.

Je montrerai, dans la troisième partie de mon travail, les caractères qui servent à distinguer une maladie médicamenteuse des maladies semblables médicamenteuses ou naturelles.

Il ne suffit pas de savoir que l'arsenic produit des ulcérations gastriques; il faut saisir ce qui caractérise la portée symptomatique, la genèse, le développement, la forme, l'intensité, la durée, les conséquences de ces ulcérations, ce qui les différencie, par exemple, de l'ulcère gastrique simple, de l'ulcère gastrique chlorotique, de l'ulcère gastrique phosphorique. Il ne suffit pas de constater que l'arsenic est stéatogène, il faut pouvoir reconnaître ce qui distingue la stéatose générale arsenicale de la stéatose générale alcoolique, de la stéatose générale phosphorique.

Et de même pour les paralysies. Il faut pouvoir discerner les symptômes propres à la paralysie arsenicale, des symptômes propres aux paralysies hyperémique, ischémique, dyshémique, adynamique, sympathique, traumatique, rhumatismale, goutteuse, syphilitique, dartreuse, diphthéritique, organopathique, endémique, ergotique, saturnine, phosphorique, etc., etc.

⁽¹⁾ Voir mon « Cahier d'Observations d'intoxication arsenicale, » obs. nº 248.

4º APPLICATIONS THÉRAPEUTIQUES DE L'ARSENIC ET DU PHOSPHORE.

Après avoir dégagé ainsi, en ne me basant que sur des faits empruntés aux annales des adversaires de notre école les données précises, positives et certaines que la science fournit sur l'action physiologique de l'arsenic et du phosphore, il me sera facile de prouver que les cures attribuées à juste titre par les allopathes à l'action de l'arsenic et du phosphore trouvent leur explication dans la loi des semblables, si heureusement entrevue par Hippocrate et si magistralement enseignée par Hahnemann. Il me sera aussi facile de démontrer — toujours en ne recourant qu'aux archives scientifiques et à la pratique journalière de nos confrères allopathes — que là où l'action de l'arsenic ou du phosphore a été reconnue insuffisante ou inopérante, il y avait ou une similitude trop incomplète ou une absence de similitude entre les symptômes de la maladie naturelle et les symptômes de la maladie médicamenteuse.

De là à conclure à la nécessité de l'application thérapeutique de l'arsenic et du phosphore d'après le principe *Similia similibus curantur*, il n'y a qu'un pas.

Voilà, mon illustre confrère, comment je répondrai au défi que vous avez lancé à notre école.

C'est à une réponse loyale et sûre d'elle-même que vous aurez affaire.

Elle est modérée : le calme, qui est l'apanage de la force, n'excluant ni la ténacité, ni l'énergie de la conviction;

Elle est respectueuse pour vous, mon ancien maître, et pour les allopathes des écoles les plus opposées;

Elle est tolérante : la vérité, n'ayant rien à craindre de l'erreur, n'est intolérante pour personne.

C'est ainsi que nous comprenons les luttes scientifiques.

Agréez, etc.

Docteur Gailliard.

Bruxelles, le 30 août 1877.





















